16

Serotonin

25 سؤال	15 أساسي
10 للمراجعة	15 امتحان

الأسئلة 15

Gastroparezide kullanılan, hem dopamin D2 antagonisti hem 5-HT4 agonisti olan ilaç hangisidir?	K5-26 · 35	01
Buspironun benzodiazepinlerden farklı olarak sedatif etkisinin düşük olmasının temel nedeni hangisidir?	K4-26 · 7	02
Sumatriptan dahil triptanlar hangi reseptörlere seçici agonistik etki göstererek migren tedavisinde kullanılır?	K4-26 · 11	03
Kemoterapiye bağlı emeziste kullanılan 5-HT3 ilacı hangisidir? (soruda “agonisti” yazıyor; doğrusu antagonist)	K26 · 19	04
Anksiyete, depresyon tedavisinde kullanılan 5-HT1A parsiyel agonisti ilaç hangisidir?	K26 · 20	05
Akut migren krizinde kullanılan sumatriptan vb. triptanların etkilediği reseptör hangisidir?	K26 · 21	06
KTB'deki dopamin reseptörlerini bloke eden, yüksek dozda 5-HT3 reseptörlerini de bloke eden ve prokinetik etkili antiemetik hangisidir?	K5-25 · 62	07
Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin neden olduğu emesise karşı kullanılan 5-HT3 antagonistidir?	K4-25 · 7	08
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi migren kriz tedavisinde kullanılan 5-HT1D agonistidir?	K4-25 · 20	09
Antiemetikler için hangisi yanlıştır? (Metoklopramid seçici D2 antagonistidir, başka reseptöre etkisi yoktur)	K5-24 · 59	10
Aşağıdakilerden hangisi migren krizinde kullanılan ergot türevidir?	B21-2 · 77	11
Serotonin ilaçlarıyla ilgili tanımlamalardan hangisi yanlıştır? (Ondansetron, Buspiron, Metoklopramid, Proglimid, Sisaprid)	K4-21 · 64	12
İlaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz. (Ergotamin, Dihidroergotamin, Skopolamin, Alfa+Beta blokör, Sumatriptan)	K1-20 · 18	13
Serotoninerjik sistemle ilgili eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Buspiron, Sumatriptan, Metiserjit, Ondansetron)	K1-20 · 32	14
Hidroksitriptamin (serotonin) aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde önemlidir?	K1-19 · 2	15

للمراجعة · آخر الملف 10

Hipertansiyon + migren profilaksisi ihtiyacı olan hastada uygun ilaç hangisidir?	K3-26 · 16	16
Aşağıdaki klinik kullanımlardan hangisi doğrudur? (Alosetron, Setirizin, Ergonovin, Ondansetron, Ranitidin)	B21-2 · 78	17
Hipertansiyon ilaçları ve ek hastalıkta ikili yarar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Prazosin, Furosemid, Metildopa, Propranolol, Sumatriptan)	K3-21 · 64	18

فهرس الأسئلة

İlaç – kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon)	**K3-21 · 65**	19
İlaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz. (Beta blokör, Dihidroergotamin, Skopolamin, Sumatriptan)	**F20 · 91**	20
Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılmaz?	**K5-19 · 15**	21
Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılmaz?	**F19 · 17**	22
İlaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (Pizotifen, Dihidroergotamin, Skopolamin, Alfa+Beta blokör, Sumatriptan)	**F19 · 5**	23
Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan yanlış olanı işaretleyiniz. (Nifedipin, Ergotamin, İloprost, Bosentan, Sildenafil)	**K1-19 · 24**	24
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi akut migren krizinin tedavisinde kullanılmaz? (Ergonovin, Ergotamin, Dihidroergotamin, Sumatriptan, Zolmitriptan)	**K1-19 · 27**	25

35. **Gastroparezi tanısı alan bir hastada kullanılan bir ilaç, hem dopamin D2 reseptör antagonisti hem de 5-HT4 reseptör agonisti olarak etki gösterir.**
Bu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metoklopramid ✓
B) Atropin
C) Ondansetron
D) Loperamid
E) Skopolamin

K5-26 Kurul 2025–2026 • Soru 35

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** **Metoklopramid**

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 23**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron**; Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid:: 5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR; MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

7. **Buspironun benzodiazepinlerden farklı olarak sedatif etkisinin düşük olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?**

A) 5-HT1A reseptör parsiyel agonisti olması ✓
B) Dopamin reseptör antagonisti olması
C) GABA-A reseptör agonisti olması
D) NMDA reseptör antagonisti olması
E) Alfa-2 agonisti olması

K4-26 Kurul 2025–2026 • Soru 7

الإجابة

A **5-HT1A reseptör parsiyel agonisti olması**

من الدرس **سلايد 30** Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a...

Table 13–5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT_{1A}	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT_{1D}	Agonist	Sumatriptan	Migraine
$5\text{-HT}_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT_{3}	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT_{4}	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

من الدرس **سلايد 23** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar;**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron:** Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid;**; **5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR. MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

11. **Sumatriptan da dahil triptanlar aşağıdaki reseptörlerden hangilerine seçici olarak agonistik etki göstererek migren tedavisinde kullanılırlar?**

A) 5-HT_{1B} ve 5-HT_{1D} ✓
B) 5-HT_{2aA} ve 5-HT_{3}
C) D_2 ve D_3
D) $Alfa_2$ ve $Beta_2$
E) M_1 ve M_4

K4-26 · Kurul 2025–2026 · Soru 11

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A** 5-HT1B ve 5-HT1D

من الدرس **سلايد 34**

- 5-HT-1B ve 1D reseptör agonistidir. Bu reseptörleri aktive ederek beyindeki arteriyovenöz şantları kapatırlar
- **SUMATRİPTAN** .....
- Nörojenik inflamasyonu (protein ekstravazasyonunu) suprese eder.
- Migren **nörojenik teoriye göre**: beyinde monoamin nöronlarının aşırı etkinliğinin beyin damarları çevresinde steril nörojenik bir inflamasyonu tetiklemesine ve trigeminus aferentlerinin stimule edilmesine bağlıdır.
- Migren patogenezinin **vasküler teorisi**:

nöbet başlangıcında serotonin düzeyi azalmakta ve sözkonusu şantların açılması sonucu beyinde geçici iskemi oluşmaktadır

من الدرس **سلايد 18** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- Sumatriptan süksinat ve diğer triptanlar (Naratriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan, Eletriptan, Almotriptan, Frovatriptan)
- Serotonin **5-HT1B/D** agonistidirler.
- **Akut migren krizinin** tedavisinde kullanılırlar.
- Kan basıncını yükseltebilir ve koroner damarları kasar.

19. Kemoterapiye bağlı emezis tedavisinde kullanılan 5HT3 agonisti ilacı işaretleyiniz.

A) Ondansetron ✓
B) Ketanserin
C) Buspiron
D) Metoklopramid
E) Sumatriptan

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 19

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A** Ondansetron

من الدرس Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a... **سلايد 30**

Table 13–5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT_{1A}	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT_{1D}	Agonist	Sumatriptan	Migraine
$5\text{-HT}_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT_{3}	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT_{4}	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri **سلايد 29**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

- Diğerleri
  - Ondansetron / Granisetron / Dolasetron /Tropisetron / Alosetron / Silansetron
  - Area postremadaki 5-HT3 reseptörlerinin antagonistidirler
  - Antineoplastik ilaçların yaptığı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır.
  - 5-HT2B antagonistleri pulmoner hipertansiyon ted. İçin araştırılmakta.

20. Anksiyete, depresyon tedavisinde kullanılan 5HT1A parsiyel agonisti ilacı işaretleyiniz.

A) Buspiron ✓
B) Sumatriptan
C) Risperidon
D) Ondansetron
E) Fluoksetin

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 20

الإجابة **A** **Buspiron**

من الدرس Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a... **سلايد 30**

Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT_{1A}	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT_{1D}	Agonist	Sumatriptan	Migraine
$5\text{-HT}_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT_{3}	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT_{4}	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 23**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron:** Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid;**; **5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR. MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

21. Akut migren krizlerinin tedavisinde kullanılan Sumatriptan vb. triptan grubu ilaçların etkilediği reseptörü işaretleyiniz.

A) Serotonin 5HT1 B/D reseptörü ✓
B) Histamin H2 reseptörü
C) Histamin H1 reseptörü
D) Lökotrien B4 reseptörü
E) Anjiyotensin2 reseptörü

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 21

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

A **Serotonin 5-HT1B/D reseptörü**

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 18**



62

Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hagisi kemoreseptör tetikleyici bölge (KTB)'deki dopamin reseptörlerini bloke etmenin yanında yüksek dozlarda serotonin 5-HT3 reseptörlerini de bloke edebilir ve prokinetik etkinliği bulunmaktadır?

- **A)** Metoklopramid ✓
- **B)** Difenhidramin
- **C)** Ondansetron
- **D)** Prometazin
- **E)** Netupitant

K5-25 Kurul 2024–2025 • Soru 62

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Metoklopramid

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 23**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron;** Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid:: 5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR; MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid;** 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

7. **Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin neden olduğu emesise karşı kullanılan 5-HT$_3$ antagonistidir?**

A) Ondansetron ✓
B) Sumatriptan
C) Cisaprid
D) Fluoksetin
E) Buspirone

K4-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة **A** **Ondansetron**

من الدرس **سلايد 30** Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a...

Table 13–5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT$_{1A}$	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT$_{1D}$	Agonist	Sumatriptan	Migraine
5-HT$_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT$_3$	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT$_4$	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

من الدرس **سلايد 29** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

- Diğerleri
  - Ondansetron / Granisetron / Dolasetron /Tropisetron / Alosetron / Silansetron
  - Area postremadaki 5-HT3 reseptörlerinin antagonistidirler.
  - Antineoplastik ilaçların yaptığı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır.
  - 5-HT2B antagonistleri pulmoner hipertansiyon ted. İçin araştırılmakta.

20. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi migren kriz tedavisinde kullanılan 5-HT_{1D} agonistidir?**

A) Sumatriptan ✓
B) Risperidon
C) Ketanserin
D) Buspirone
E) Fluoksetin

K4-25 · Kurul 2024–2025 · Soru 20

الإجابة **A** Sumatriptan

من الدرس **سلايد 30** Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a...

Table 13–5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT_{1A}	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT_{1D}	Agonist	Sumatriptan	Migraine
$5\text{-HT}_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT_{3}	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT_{4}	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

من الدرس **سلايد 18** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- Sumatriptan süksinat ve diğer triptanlar (Naratriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan, Eletriptan, Almotriptan, Frovatriptan)
  - Serotonin **5-HT1B/D** agonistidirler.
  - **Akut migren krizinin** tedavisinde kullanılırlar.
  - Kan basıncını yükseltebilir ve koroner damarları kasar.

59. Aşağıdakilerden hangisi antiemetikler için yanlıştır?

A) Metoklopramid seçici bir dopaminerjik D2 reseptör antagonistidir ve diğer reseptörler üzerine etkinliği yoktur

B) 5-HT3 reseptör antagonistleri kemoterapiye bağlı emezisde kullanılan başlıca ilaçlardır

C) Kortikosteroidler kemoterapiye bağlı emeziste 5-HT3 reseptör antagonistlerinin etkinliğini arttırırlar

D) NK1 antagonistleri yüksek derecede emetojenik kemoterapiden kaynaklanan akut ve geç dönemdeki bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılırlar

E) Histamin H1 antagonistleri (H1 antihistaminikler) hareket hastalığının tedavisinde kullanılırlar

K5-24 Kurul 2023–2024 • Soru 59

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 6 (مضادات القيء). سلايد 23 بيقول إن الميتوكلوبراميد agonist على 5-HT4 وantagonist على 5-HT3، يعني مش بيأثر على D2 بس. فالجملة A هي الغلط.

الإجابة

A **Metoklopramid seçici bir D2 antagonistidir, diğer reseptörlere etkisi yoktur**

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 23**



Soru 77 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisi migren krizinde kullanılan ergot türevidir?

En az bir doğru yanıt seçin

- A Dihidroergotoksin
- B Ergonovin
- C Sumatriptan
- D Ergotamin ✓ *Doğru yanıt*
- E Metiserjid

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 77

الإجابة **D Ergotamin**

من الدرس Migren Tedavisi **سلايد 22**

Migren Tedavisi

- **Proflaktik tedavi**
  - Pizotifen,metiserjid,siproheptadin,antiepiletik
  - -blokörler,Ca kanal blokörleri….
- **Akut kriz tedavisi**
  - Sumatriptan
  - Ergot alkaloidleri

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri **سلايد 27**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

- **Metizerjid**
  - Parsiyel agonist niteliğinde 5-HT1 ve 5-HT2 reseptör blokörüdür.
  - Düz kaslar üzerindeki serotonin etkilerini güçlü ve kompetetif şekilde bloke eder.
  - Zayıf vazokonstriktör ve oksitoksik etkileri vardır.
  - **Migren profilaksisinde kullanılır**, akut atakta kullanılırsa nöbeti şiddetlendirir.
  - Kronik kullanımda **retroperitoneal fibrozis** yapabilir.

Aşağıdaki tanımlamalaradan hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

A. Ondansetron: Area postremadaki 5-HT3 reseptörlerinin antagonistidir: Antineoplastik ilaçların yaptığı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır

B. Buspiron: Beyinde limbik sistemde 5-HT1A reseptörlerini aktive eder: Anksiyolitik etki gösterir

C. Metoklopramid: 5-HT4 reseptör agonisti ve 5-HT3 reseptör antagonistidir: Antiemetik etkilidir

D. Proglimid: 5-HT1D reseptör antagonisti: Kabızlıkla beraber olan irritabl barsak sendromun tedavisinde kullanılır ✓ *Doğru yanıt*

E. Sisaprid: 5-HT4 reseptör agonisti: GİS reflü ve motilite bozukluklarında prokinetik olarak kullanılır

K4-21 Kurul 2020–2021 • Soru 64

الإجابة

D **Proglimid: 5-HT1D reseptör antagonisti – kabızlıklı irritabl barsak sendromu**

من الدرس Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri **سلايد 23**

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron**; Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid;; 5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR. MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kul

18. Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Ergotamin – Migren proflaksisi
b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) Skopolamin – taşıt tutması
d) Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
e) Sumatriptan – Akut migren krizi

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 18

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

الإجابة

A **Ergotamin – Migren proflaksisi**

من الدرس Migren Tedavisi **سلايد 22**



32. Seratoninerjik sistemle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Buspirone (5-HT1A) → Anksiyete
b) Sumatriptan (5-HT1D) → Migren
c) **Metiserjit (5-HT2A/2C) → Myastenia gravis** ✓
d) Ondansetron (5-HT1A) → Kemoterapiye bağlı emezis

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 32

الإجابة

C Metiserjit (5-HT2A/2C) → Myastenia gravis

من الدرس **سلايد 27** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Antagonistleri

- **Metizerjid**
  - Parsiyel agonist niteliğinde 5-HT1 ve 5-HT2 reseptör blokörüdür.
  - Düz kaslar üzerindeki serotonin etkilerini güçlü ve kompetetif şekilde bloke eder.
  - Zayıf vazokonstriktör ve oksitoksik etkileri vardır.
  - **Migren profilaksisinde kullanılır**, akut atakta kullanılırsa nöbeti şiddetlendirir.
  - Kronik kullanımda **retroperitoneal fibrozis** yapabilir.

من الدرس **سلايد 30** Table 13-5 Serotonergic Drugs: Primary Actions a...

Table 13–5 Serotonergic Drugs: Primary Actions and Clinical Indications

RECEPTOR	ACTION	DRUG EXAMPLES	CLINICAL DISORDER
5-HT_{1A}	Partial agonist	Buspirone, ipsaperone	Anxiety, depression
5-HT_{1D}	Agonist	Sumatriptan	Migraine
$5\text{-HT}_{2A/2C}$	Antagonist	Methysergide, risperidone, ketanserin	Migraine, depression, schizophrenia
5-HT_{3}	Antagonist	Ondansetron	Chemotherapy-induced emesis
5-HT_{4}	Agonist	Cisapride	GI disorders
SERT (5-HT transporter)	Inhibitor	Fluoxetine, sertraline	Depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia, post-traumatic stress disorder

2. Hidroksitriptamin aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde önemlidir?

a) Depresyon
b) Menenjit
c) Kalp Yetmezliği
d) Aritmi
e) Astım

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 2

الإجابة **A** Depresyon

من الدرس **سلايد 11** SEROTONİN Farmakolojik Etkileri

SEROTONİN
Farmakolojik Etkileri

- Primer aferent sinir uçlarını 5-HT3 reseptörleri aracılığıyla uyarır. Histamin gibi **ağrı ve kaşıntı** yapar.
- **Trombositler** içinde bulunan serotonin bu hücrelerin agregasyonu ve yapışması sırasında salıverilir. İntakt trombositleri aktive ederek **agregasyonunu kolaylaştırır**.
- ***SSS'de*** paraventriküler nükleustaki serotonerjik nöronların en önemli fonksiyonlarından birisi **iştah kontrolüdür**.**Ayrıca**
- **Duygudurum,uyku,vücut ısısı,depresyon,anksiyete,migren**

آخر الملف

للمراجعة

10 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

16. **Hipertansiyon + migren profilaksisi ihtiyacı olan hastada uygun ilacı işaretleyiniz.**

A) Propranolol ✓
B) Amlodipin
C) Doksazosin
D) Metildopa
E) Minoksidil

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 16

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية الضغط، بس سلايد 22 في الدرس ده بيعدّ أدوية الوقاية من الصداع النصفي ومنها β-blokörler (زي البروبرانولول)، فالبروبرانولول بيعالج الضغط وبيمنع الصداع في نفس الوقت. السلايد كاتب كمان Ca kanal blokörleri، بس اللي بيتستخدم منهم للوقاية فلوناريزين/فيراباميل مش الأملوديبين، والإجابة في المفتاح A.

الإجابة **A Propranolol**

من الدرس Migren Tedavisi **سلايد 22**



Soru 78 — 0,5 puan

Aşağıdaki klinik kullanımlardan hangisi doğrudur?

En az bir doğru yanıt seçin

- A) Alosetron---Postpartum kanama
- B) Setirizin---Saman nezlesi — *Doğru yanıt*
- C) Ergonovin---Kemoterapiye bağlı bulantı-kusma
- D) Ondansetron---Akut migren baş ağrısı
- E) Ranitidin---Sedasyon

B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 78

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

تلات اختيارات من الخمسة أدوية من الدرس ده: سلايد 29 بيقول إن الأوندانسيترون (والألوسيترون من نفس المجموعة) مضادات HT3-5 بتمنع قيء أدوية الكيماوي. يعني الأوندانسيترون مش لنوبة الصداع النصفي (علاجها السوماتريبتان والإرجوت، سلايد 22). الإجابة في المفتاح B (Setirizin – Saman nezlesi) ودي من درس الهيستامين، مش في الملف ده. السؤال ده موجود كمان في درس 15.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

64 - Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hipertansiyonla birlikte ek hastalık varlığında kullanımlarının ikili yarar sağladığı durum eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

a) Prazosin–Benign prostat hipertrofisi
b) Furosemid–Konjestif kalp yetmezliği, ödem
c) Metildopa–Gebelik
d) Propranolol–Supraventriküler taşikardi
e) Sumatriptan–Koroner yetmezlik ✓

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 64

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة أدوية الضغط، بس سلايد 21 في الدرس ده بيقول إن التريبتانات (زي السوماتريبتان) ممنوعة في مرضى الشرايين التاجية والضغط لأنها بتقبّض الأوعية، وسلايد 18 بيقول إنها بتقبّض الشرايين التاجية، فـ«Sumatriptan – Koroner yetmezlik» هو الغلط.

الإجابة

E **Sumatriptan – Koroner yetmezlik**

من الدرس **سلايد 21** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **Sumatriptan süksinat ve diğer triptanlar**
  - Bu ilaçlar vazokonstriktör etkileri nedeniyle, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyonu olanlarda serebrovasküler olay veya geçici iskemik atak geçirenlerde, periferik damar hastalığı olanlarda ve gebelerde **kontrendikedir.**
  - Başlıca yan tesirleri ciltaltına injeksiyon yerinde ağrı, kafa veya göğüste basınç veya sıkışma duyumsama, kızarma ve baş dönmesidir.

من الدرس **سلايد 18** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- Sumatriptan süksinat ve diğer triptanlar (Naratriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan, Eletriptan, Almotriptan, Frovatriptan)
  - Serotonin **5-HT1B/D** agonistidirler.
  - **Akut migren krizinin** tedavisinde kullanılırlar.
  - Kan basıncını yükseltebilir ve koroner damarları kasar.

65 - Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

a) ◯ Pizotifen – Migren proflaksisi
b) ◯ Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) ◯ Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
d) ◯ Sumatriptan – Akut migren krizi
e) ◉ Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 65

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

نسخة تانية من سؤال K1-20-18. سلايد 22 بيقول إن البيزوتيفين للوقاية من الصداع النصفي، والسوماتريبتان وقلويدات الإرجوت (الديهيدروإرجوتامين) لعلاج النوبة، يعني a وb وd صح. الإجابة في مفتاح الامتحان E (Sodyum nitroprusiyat – Akut hipotansiyon) ومش في الملف ده:
النيتروبروسيد بيوسّع الأوعية وبيتستخدم في الضغط العالي الطارئ، مش في هبوط الضغط (درس 19 سلايد 11). السؤال ده موجود كمان في درس 19.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

91 - Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Beta Blokör – Feokromositoma (Doğru)

b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi

c) Skopolamin – taşıt tutması

d) Sumatriptan – Akut migren krizi

F20 Final 2019–2020 · Soru 91

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

نسخة تانية من سؤال K1-20-18. سلايد 22 بيقول إن السوماتريبتان وقلويدات الإرجوت (الديهيدروإرجوتامين) لعلاج نوبة الصداع النصفي، يعني b و d صح، والسكوبولامين لدوار الحركة صح كمان (درس 15 سلايد 35). الإجابة المكتوب جنبها (Doğru) في الامتحان هي a: الـBeta blokör لوحده غلط في الـFeokromositoma، لازم Alfa + Beta مع بعض (زي ما جه في F19-5 وK3-21-65)، وده مش مشروح في الملف ده.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

15. Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılmaz?
a) Migren
b) Hiperprolaktinemi
c) Postpartum hemoraji
d) Senil serebral yetersizlik
e) Periferik vasküler vazospazm

K5-19 Kurul 2018–2019 • Soru 15

جه كمان في Soru 17 · Final 2018–2019 **F19**

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس (الإرجوت)، بس ملف الشرح كل اللي فيه إن Ergot alkaloidleri بتستخدم في نوبة الصداع النصفي (سلايد 22)، ومفيش كلام عن البرولاكتين ولا نزيف ما بعد الولادة ولا الأوعية الطرفية. في نسخة F19 الاختيار المظلل بالأصفر هو Periferik vasküler vazospazm، وده منطقي لأن الإرجوت بيقبّض الأوعية، زي التريبتانات اللي ممنوعة في أمراض الأوعية الطرفية (سلايد 21). ونفس السؤال بالظبط جه كمان في F19 سؤال 17.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

17) Ergot alkaloidleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılmaz?

a) Migren
b) Hiperprolaktinemi
c) Postpartum hemoraji
d) Senil serebral yetersizlik
e) Periferik vasküler vazospazm

F19 Final 2018–2019 • Soru 17

جه كمان في Soru · Kurul 2018–2019 **K5-19** 15

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس (الإرجوت)، بس ملف الشرح كل اللي فيه إن Ergot alkaloidleri بتستخدم في نوبة الصداع النصفي (سلايد 22)، ومفيش كلام عن البرولاكتين ولا نزيف ما بعد الولادة ولا الأوعية الطرفية. الاختيار المظلل بالأصفر في ورقة الامتحان (Periferik vasküler vazospazm) منطقي لأن الإرجوت بيقبّض الأوعية، زي التريبتانات اللي ممنوعة في أمراض الأوعية الطرفية (سلايد 21). ونفس السؤال بالظبط (نفس الاختيارات) جه كمان في K5-19 سؤال 15.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

5) Aşağıdaki ilaç ve kullanım yeri eşleştirmelerinden **yanlış** olanı işaretleyiniz.

a) Pizotifen – Migren proflaksisi
b) Dihidroergotamin – Akut migren krizi
c) Skopolamin – Hiperprolaktinemi
d) Alfa + Beta Blokör – Feokromositoma
e) Sumatriptan – Akut migren krizi

F19 Final 2018–2019 • Soru 5

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
نسخة تانية من سؤال K1-20-18 (أدوية الصداع النصفي). سلايد 22 بيقول إن البيزوتيفين للوقاية، والسوماتريبتان وقلويدات الإرجوت (زي الديهيدروإرجوتامين) لعلاج النوبة، يعني a وb وe صح. الإجابة المظللة في الامتحان – C (Skopolamin Hiperprolaktinemi) ومش في الملف ده: السكوبولامين بيتستخدم لدوار الحركة (درس 6 سلايد 21، ودرس 15 سلايد 35). السؤال ده موجود كمان في درس 6 و15.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

24. Primer Pulmoner Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Nifedipin – Vazoselektif Kalsiyum Kanal Blokörü
b) Ergotamin – Ergot Alkaloidi
c) İlioprost – PGI2
d) Bosentan – Endotelin Reseptör Antagonisti
e) Sildenafil – Fosfodiesteraz V inhibitörü

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 24

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن أدوية ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، والاختيار الغلط فيه دوا من الدرس ده (الإرجوتامين). سلايد 22 بيقول إن قلويدات الإرجوت (Ergot alkaloidleri) بتستخدم في علاج نوبة الصداع النصفي الحادة، بس الملف مش بيقول في أي حتة إن الإرجوتامين مش بيتستخدم في ضغط الشريان الرئوي. الإجابة المظللة في الامتحان b (Ergotamin – Ergot Alkaloidi). السؤال ده موجود كمان في درس 18 و19.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

27. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi akut migren krizinin tedavisinde kullanılmaz.

a) Ergonovin
b) Ergotamin
c) Dihidroergotamin
d) Sumatriptan
e) Zolmitriptan

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 27

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس (علاج نوبة الصداع النصفي). سلايد 22 بيقول إن النوبة بتتعالج بالسوماتريبتان وقلويدات الإرجوت، وسلايد 18 بيعدّ الزولميتريبتان مع التريبتانات، بس الإرجونوفين مش مذكور في الملف خالص. الإجابة المظللة في مفتاح الامتحان A Ergonovin: ده إرجوت بيقبّض الرحم وبيتستخدم في نزيف ما بعد الولادة، مش للصداع.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**