

IL SUPERVISORE IN TASCA™

Quando Fermarsi

I segnali per interrompere la seduta, quando rimandare al medico e come dirlo alla famiglia.

PRIMA DI TUTTO

Chiama subito il 112

Interrompi l'attività, fai sedere o sdraiare la persona e chiama il Numero Unico di Emergenza.

- ☐ Dolore o oppressione al petto, che può arrivare al braccio, al collo o alla mandibola
- ☐ Grave difficoltà a respirare, labbra o viso bluastri
- ☐ Segni di ictus: viso storto da un lato, un braccio che non si alza, parole confuse o impastate (si ricordano con la sigla inglese **FAST**: Face, Arm, Speech, Time)
- ☐ Perdita di coscienza o la persona non risponde
- ☐ Caduta con dolore forte, impossibilità di muovere una gamba o un braccio, colpo alla testa

INTERROMPI LA SEDUTA

Ferma e avvisa

Fai sedere la persona, osservalo, e avvisa la famiglia. Consiglia di parlarne con il medico prima della seduta successiva.

SEGNALE	COSA FAI
Capogiro o sensazione di svenimento	Siedi subito, acqua, riprendi solo se passa del tutto e con esercizi da seduti
Fiato corto insolito (non riesce a parlare)	Pausa da seduti; se non passa in pochi minuti, chiudi la seduta
Cuore che batte forte o irregolare	Chiudi la seduta e avvisa
Dolore nuovo, forte o diverso dal solito	Stop all'esercizio e alla seduta
Confusione nuova, sonnolenza insolita	Stop e avvisa la famiglia oggi stesso
Nausea, sudore freddo, pallore	Stop; se compare con dolore al petto, chiama il 112
Gonfiore improvviso di una gamba, con dolore o calore	Stop e consiglia il medico subito

RIMANDA

Quando non fare la seduta

Meglio una seduta in meno che una seduta nel giorno sbagliato.

- Febbre, influenza o malessere generale
- Una caduta nelle ultime 24-48 ore, finché il medico non ha dato indicazioni
- Dopo un ricovero o una visita al pronto soccorso, senza il via libera del medico
- Dolore che è peggiorato rispetto all'ultima seduta
- Cambio recente di terapia che dà capogiri o stanchezza (finché la persona non si è assestata)

RIMANDA AL MEDICO

Quando consigliare una visita

Non sono emergenze, ma meritano un parere.

- Cadute, anche senza conseguenze
- Capogiri frequenti quando si alza
- Il Timed Up and Go è di 12 secondi o più, o il test della sedia è sotto la media (vedi Test di Partenza)
- Peggioramento dei test da una misurazione all'altra
- Dolore che non passa tra una seduta e l'altra
- Perdita di peso, stanchezza o confusione che la famiglia nota da poco

Il tuo ruolo

Non fai diagnosi e non dici che cosa ha la persona. Osservi, ti fermi quando serve e consigli di sentire il medico.

Come dirlo alla famiglia

- «Oggi durante gli esercizi la mamma ha avuto un capogiro. Ci siamo fermati e poi stava bene. Vi consiglio di parlarne con il medico prima della prossima seduta.»
- «Non posso dire da cosa dipende: non è il mio ruolo. Posso dirvi cosa ho visto, così il medico ha tutte le informazioni.»
- «Per sicurezza, finché il medico non vi dà indicazioni, facciamo solo esercizi da seduti.»

Indicazioni di sicurezza generali, basate sulle raccomandazioni pubbliche per l'attività fisica delle persone anziane (Organizzazione Mondiale della Sanità, «Linee guida su attività fisica e comportamenti sedentari», 2020) e sui segnali di emergenza comunemente diffusi. Non sostituiscono il parere del medico. In Italia il numero di emergenza è il 112.

Prossimo passo

Stampa la pagina «Chiama subito il 112» e la tabella «Ferma e avvisa»
e tienile nella cartellina che porti in seduta.