

1.

由题意得,  $f_X(x) = \frac{1}{2}$ , 所以  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{|X|} \leq y) = P(|X| \leq y^2)$ 。

$$F_Y(y) = \begin{cases} y^2 & y \in [0, 1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

求导后即可得到:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y & y \in [0, 1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

因为  $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(-\ln|X| \leq z) = P(|X| \geq e^{-z})$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} & z \in [0, \infty] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} & z \in [0, \infty] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

2.

令  $Y = e^X$ , 则  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y)$ , 所以  $F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\ln y} f_X(x) dx$ , 求导后  $f_Y(y) = \frac{f_X(\ln y)}{y}$ 。

当  $X$  服从  $[0, 1]$  上的均匀分布时:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y} & y \in [1, e] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

3.

令  $Y = |X|^{\frac{1}{3}}, Z = |X|^{\frac{1}{4}}$ , 则:  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X|^{\frac{1}{3}} \leq y) = P(|X| \leq y^3) = \int_0^{y^3} f_{|X|}(x) dx$ , 所以  $f_Y(y) = 3y^2 f_{|X|}(y^3)$ , 同理  $f_Z(z) = 4z^3 f_{|X|}(z^4)$ 。

4.

因为  $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ , 当  $0 \leq y \leq 5$  时, 由全概率公式,  $P(Y \leq y) = \frac{1}{4}P(X \leq y) + \frac{3}{4}P(X - 5 \leq y) = \frac{1}{4}P(X \leq y) + \frac{3}{4}P(X \leq y + 5)$ , 所以  $P(Y \leq y) = \frac{1}{4}(\int_0^y f_{X_A}(x)dx + 3 \int_0^{y+5} f_{X_B}(x)dx) = \frac{y}{10} + \frac{1}{4}$ , 故  $f_Y(y) = \frac{1}{10}$ ; 同理当  $5 < y \leq 15$  时,  $P(Y \leq y) = \frac{3}{4} \int_0^{y+5} f_{X_B}(x)dx = \frac{y+5}{20}$ , 所以  $f_Y(y) = \frac{1}{20}$ 。

5.




图 1:  $|z| = 0.5$  的情况

由于  $X, Y$  均服从均匀分布, 两个随机变量的联合概率可以用以上的正方形区域面积表示。考虑  $|X - Y| \leq z$ , 这个式子可以被拆开为两个式子  $X - Y \leq z$  和  $Y - X \leq z$ , 在图中做出这两个函数的图像。不难发现  $P(Z \leq z)$  就是两条平行线与正方形所包围的图形的面积, 即  $P(Z \leq z) = 2z - z^2$ , 所以  $f_Z(z) = 2 - 2z$ 。

6.

使用和第五题类似的做法:  $P(Z \leq z) = P(|X - Y| \leq z) = \frac{\sqrt{2}z}{2}(\sqrt{2}z + \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - z) * 2) = \frac{z}{2}$ , 所以  $f_Z(z) = \frac{1}{2}$ 。

7.

不难看出这题的随机变量就是第五题中的Z。所以  $E[Z] = \int_0^1 2z^2 - z^3 dz = \frac{1}{3}$ 。  
证毕。

8.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

9.

当  $z \leq 0$ ,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X - Y \leq z) = 1 - P(X - Y > z) \\ &= 1 - \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} dy \int_{z+y}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= 1 - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-\lambda z} \end{aligned}$$

当  $z < 0$  时,  $-z \leq 0$ , 所以  $F_Z(z) = 1 - F_Z(-z) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{\lambda z}$ 。

10.

由离散卷积公式  $f_Z(z) = \sum f_X(x)f_Y(z-x)$  可以求得:

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6} & z = 1 \\ \frac{5}{18} & z = 2 \\ \frac{1}{3} & z = 3 \\ \frac{1}{6} & z = 4 \\ \frac{1}{18} & z = 5 \end{cases}$$

11.

设  $P_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ ,  $P_Y(k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}$ , 由卷积公式, 有  $P_Z(z) = \sum P_X(k)P_Y(z-k)$ , 因为  $C_z^k = \frac{z!}{k!(z-k)!}$ , 所以  $P_Z(z) = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{z!} \sum C_z^k \lambda^k \mu^{z-k} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^z}{z!}$ 。

证毕。

## 12.

先求  $W = X + Y$  的概率密度函数：

$$f_W(w) = \begin{cases} \int_0^w dx & = w & 0 \leq w \leq 1 \\ \int_{w-1}^1 dx & = 2 - w & 1 < w \leq 2 \\ 0 & & otherwise \end{cases}$$

再求  $R = W + Z$ ：

$$f_R(r) = \begin{cases} \int_0^r w dw & = \frac{r^2}{2} & 0 \leq r \leq 1 \\ \int_{r-1}^1 w dw + \int_1^r 2 - w dw & = 3r - r^2 - \frac{3}{2} & 1 < r \leq 2 \\ \int_{r-1}^2 2 - w dw & = \frac{r^2}{2} - 3r + \frac{9}{2} & 2 < r \leq 3 \\ 0 & & otherwise \end{cases}$$

## 13.

因为概率密度函数的周期为  $\frac{a+b}{2}$ ，所以有  $f(x) = f(a+b-x)$ ，而  $X+Y$  和  $X-Y$  的积分区间正好差着  $a+b$  的距离，所以只需要将  $f_{X+Y}$  平移即可。