ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC



BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CÁC MÔ HÌNH TOÁN ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOTKA–VOLTERRA MỞ RỘNG CHO HỆ SINH THÁI ATLANTIC MENHADEN – STRIPED BASS

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hiếu

Sinh viên thực hiện: Tạ Tiến Nam **MSV:** 23000143
Tạ Văn Nghĩa **MSV:** 23000145
Trần Đức Kiên **MSV:** 23000131

Lớp: K68A2

Khoa: Toán – Cơ – Tin học

Hà Nội – 2026

TÓM TẮT NỘI DUNG

Việc khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh học biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế lâu dài, bởi việc khai thác quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến sự cạn kiệt trữ lượng sinh khối và đe dọa trực tiếp sự tồn vong của toàn bộ hệ sinh thái. Vịnh Chesapeake (Hoa Kỳ) là một trong những hệ sinh thái ven biển phức tạp và năng động nhất thế giới, nơi mà việc duy trì nghề cá bền vững là nhân tố then chốt cho cả sự thịnh vượng kinh tế lẫn an ninh sinh thái của toàn vùng duyên hải.

Báo cáo này nghiên cứu và tái hiện toàn diện bài báo khoa học *"Bioeconomic analysis of harvesting within a predator–prey system: A case study in the Chesapeake Bay fisheries"* của Iordanka N. Panayotova, John Herrmann và Nathan Kolling (công bố trên tạp chí *Ecological Modelling*, 2023). Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học dựa trên hệ sinh thái để phân tích động lực học quần thể có khai thác của hai loài cá trọng yếu trong vịnh Chesapeake: cá mòi dầu Đại Tây Dương (*Brevoortia tyrannus*) đóng vai trò là con mồi (*prey*) và cá vược sọc (*Morone saxatilis*) đóng vai trò là động vật săn mồi (*predator*).

Mô hình sử dụng hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát phi tuyến, được hiệu chỉnh và khớp tham số với chuỗi dữ liệu thực tế về độ phong phú cá thể từ năm 1995 đến năm 2017. Báo cáo phân tích tính đặt đúng về mặt sinh học của mô hình (tính dương và tính bị chặn của nghiệm trong miền bất biến Ω), thiết lập các điều kiện tồn tại và ổn định của các điểm cân bằng kinh tế sinh thái (bionomic equilibria). Đặc biệt, nghiên cứu đi sâu so sánh ba chiến lược quản lý khai thác chủ chốt:

1. **Sản lượng bền vững tối đa (MSY - Maximum Sustainable Yield):** Tối đa hóa sản lượng sinh khối bắt được trong điều kiện duy trì trữ lượng quần thể.
2. **Sản lượng kinh tế tối đa (MEY - Maximum Economic Yield):** Tối đa hóa lợi nhuận ròng (tô kinh tế) từ việc khai thác sau khi trừ chi phí.
3. **Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi sinh thái (RMY - Resilience Maximizing Yield):** Chiến lược quản lý ưu tiên khả năng tự phục hồi nhanh nhất của hệ thống về trạng thái cân bằng sau những nhiễu loạn môi trường.

Cuối cùng, phương pháp vi phân trực tiếp được áp dụng để phân tích độ nhạy cục bộ của các tham số động thái, qua đó xác định các yếu tố có tác động chi phối mạnh nhất đến trữ lượng hai loài cá. Các kết quả này cung cấp luận cứ toán học định lượng vững chắc giúp các nhà hoạch định chính sách cân bằng hài hòa giữa lợi ích kinh tế trước mắt và mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái bền vững trong dài hạn.

Từ khóa: Mô hình hóa toán học, Phương trình vi phân phi tuyến, Hệ động lực con mồi – kẻ săn mồi, Vịnh Chesapeake, Kinh tế sinh thái (Bioeconomics), Sản lượng bền vững tối đa (MSY), Sản lượng kinh tế tối đa (MEY), Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi (RMY), Phân tích độ nhạy.

ABSTRACT

Sustainable use of biological resources is very important as over-exploitation in the long run may lead to stock depletion, which in turn may threaten biodiversity. The Chesapeake Bay is an extremely complex ecosystem, and sustainable harvesting of its fisheries is essential both for the ecosystem's biodiversity and economic prosperity of the area. In this report, based on the research by Iordanka N. Panayotova, John Herrmann, and Nathan Kolling (published in *Ecological Modelling*, 2023), we investigate an ecosystem-based mathematical modeling framework to study the population dynamics with harvesting of two key fish species in the Chesapeake Bay: the Atlantic Menhaden (*Brevoortia tyrannus*) as prey and the Striped Bass (*Morone saxatilis*) as predator.

The study fits the generalized Lotka–Volterra model to actual time series abundance data of the two species obtained from fisheries in the Bay from 1995 to 2017. Conditions for the existence of bioeconomic equilibria are derived, and the stability and resilience of the biological system are comprehensively investigated. Three fundamental harvesting policies are analyzed and compared: Maximum Sustainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield (MEY), and Resilience Maximizing Yield (RMY), highlighting their long-term effects on fisheries sustainability. Furthermore, local sensitivity analysis using the direct differential method identifies the key biological parameters governing the population dynamics. This mathematical framework provides actionable insights for policymakers seeking to balance economic returns with ecosystem conservation in multi-species marine fisheries.

Keywords: Mathematical modeling, Differential equations, Predator–prey dynamics, Chesapeake Bay fisheries, Bioeconomics, Maximum sustainable yield, Maximum economic yield, Resilience maximizing yield, Sensitivity analysis.

MỤC LỤC

Danh mục hình vẽ **vi**

Danh mục ký hiệu và từ viết tắt **vii**

1 MỞ ĐẦU **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và hệ sinh thái vịnh Chesapeake 1

1.2 Đặc điểm sinh học và vai trò của các loài sinh vật nghiên cứu 2

1.2.1 Cá mòi dầu Đại Tây Dương (*Brevoortia tyrannus*) – Loài cá mồi nền tảng 2

1.2.2 Cá vược sọc (*Morone saxatilis*) – Kẻ săn mồi đầu bảng 3

1.3 Hiện trạng suy giảm và khủng hoảng khai thác nghề cá 4

1.3.1 Khủng hoảng suy giảm cá mòi dầu và xung đột hạn ngạch 4

1.3.2 Nguy cơ suy thoái và tình trạng đánh bắt quá mức của cá vược sọc . . . 5

1.4 Thách thức quản lý tài nguyên chung và sự chuyển dịch mô hình 5

1.4.1 Bi kịch của tài nguyên sở hữu chung (*Tragedy of the Commons*) 5

1.4.2 Hạn chế của phương pháp quản lý đơn loài và nhu cầu mô hình hóa đa loài 5

1.5 Phương pháp tiếp cận mô hình toán học trong đề tài 6

1.5.1 Hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra hai loài 6

1.5.2 Sơ đồ tương tác sinh thái – kinh tế 7

1.5.3 Tích hợp khai thác và mô hình kinh tế sinh thái (Bionomic model) . . . 7

1.5.4 Khảo sát và đối sánh ba chính sách khai thác chiến lược 8

1.5.5 Phân tích độ nhạy cục bộ (Sensitivity Analysis) 9

1.6 Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài 9

1.6.1 Mục tiêu cụ thể 9

1.6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 10

1.7 Bố cục của báo cáo 10

2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ DỮ LIỆU THỰC TẾ **12**

2.1 Hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát 12

2.1.1 Ý nghĩa sinh học của các tham số 12
2.1.2 Các giả thiết sinh học nền tảng 13
2.1.3 Ưu thế của mô hình 13
2.2 Dữ liệu thực nghiệm và phương pháp hiệu chỉnh tham số 14
2.2.1 Nguồn dữ liệu chuỗi thời gian 14
2.2.2 Chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp khớp bình phương tối thiểu phi tuyến 14
2.2.3 Bảng tham số tối ưu thu được 15
2.3 Kết quả khớp mô hình và phân tích dự báo đến năm 2100 15
2.3.1 Biểu đồ khớp mô hình giai đoạn 1995–2017 16
2.3.2 Dự báo động thái quần thể đến năm 2100 16
2.3.3 Tính toán điểm cân bằng dừng 17
2.4 Phân tích độ đàn hồi sinh thái (Resilience) của hệ thống 18
2.4.1 Khái niệm độ đàn hồi theo Pimm và Lawton (1978) 18
2.4.2 Thiết lập ma trận Jacobian và giá trị riêng của hệ thống 19
2.4.3 Tính toán giá trị số cụ thể 20
2.4.4 Ý nghĩa sinh thái của thời gian hồi phục 20

3 MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI VÀ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH 22
3.1 Mô hình kinh tế sinh thái (Bionomic Model) 22
3.2 Chứng minh tính dương và tính bị chặn của nghiệm 22
3.3 Điều kiện tồn tại các điểm cân bằng bionomic 22
3.4 Tác động của khai thác lên tính ổn định tiệm cận 23

4 PHÂN TÍCH CÁC CHÍNH SÁCH KHAI THÁC NGHỀ CÁ 24
4.1 Chính sách Sản lượng bền vững tối đa (MSY) 24
4.2 Chính sách Sản lượng kinh tế tối đa (MEY) 24
4.3 Chính sách Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi (RMY) 25

5 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỤC BỘ 26
5.1 Phương pháp vi phân trực tiếp (Direct Differential Method) 26
5.2 Chỉ số độ nhạy tương đối và xếp hạng tham số 26

6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27
6.1 Tổng kết các kết quả đạt được 27

6.2 Hàm ý chính sách quản lý cho vịnh Chesapeake 27
6.3 Đánh giá hạn chế và hướng phát triển tiếp theo 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO **29**

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1 Sơ đồ tương tác sinh thái – kinh tế trong hệ hai loài cá mòi dầu và cá vược sọc tại vịnh Chesapeake. 8

2.1 Đường cong khớp của mô hình Lotka–Volterra với chuỗi số liệu thực tế về độ phong phú cá thể của cá mòi dầu (đỏ) và cá vược sọc (xanh) từ 1995 đến 2017 (tái hiện Hình 1 từ bài báo gốc [18]). 16

2.2 Dự báo của mô hình về động thái quần thể cá mòi dầu và cá vược sọc đến năm 2100 (tái hiện Hình 2 từ bài báo gốc [18]). 17

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Ký hiệu toán học và biến trạng thái

Ký hiệu	Đơn vị / Miền giá trị	Ý nghĩa sinh học / toán học
t	Năm (Years)	Biến thời gian trong mô hình động thái quần thể
$x(t)$	10^9 cá thể	Sinh khối / Mật độ quần thể cá mòi dầu (*Atlantic menhaden* – con mồi)
$y(t)$	10^9 cá thể	Sinh khối / Mật độ quần thể cá vược sọc (*Striped bass* – động vật săn mồi)
r	năm^{-1}	Tốc độ tăng trưởng nội tại của quần thể con mồi
a	năm$^{-1} \times$ (tỷ con)$^{-1}$	Hệ số tự giới hạn (cạnh tranh nội bộ loài) của con mồi
b	năm$^{-1} \times$ (tỷ con)$^{-1}$	Tỷ lệ cá mòi dầu bị cá vược sọc săn bắt (tác động của kẻ săn mồi)
e	năm^{-1}	Tỷ lệ tử vong tự nhiên của cá vược sọc khi không có con mồi
c	năm$^{-1} \times$ (tỷ con)$^{-1}$	Hệ số tự giới hạn (cạnh tranh nội bộ loài) của kẻ săn mồi
d	năm$^{-1} \times$ (tỷ con)$^{-1}$	Hiệu suất chuyển đổi dinh dưỡng thức ăn thành sinh khối cá vược sọc
E_1, E_2	Không thứ nguyên	Nỗ lực khai thác đánh bắt đối với cá mòi dầu và cá vược sọc
q_1, q_2	$[0, 1]$	Hệ số khả năng đánh bắt (*catchability coefficients*) của từng loài
p_1, p_2	Đơn vị tiền tệ / sinh khối	Giá bán trên một đơn vị sinh khối của từng loài
c_1, c_2	Đơn vị tiền tệ / nỗ lực	Chi phí vận hành trên một đơn vị nỗ lực khai thác của từng loài
$\pi(E_1, E_2)$	Đơn vị tiền tệ / năm	Hàm tô kinh tế (lợi nhuận ròng hàng năm từ khai thác)
τ	Năm	Thời gian hồi phục của hệ sinh thái về trạng thái cân bằng
R	năm^{-1}	Độ đàn hồi / độ hồi phục sinh học (*Resilience*), $R = 1/\tau = -\mathrm{Re}(\lambda_m)$
Ω	Miền không gian pha	Miền bất biến dương sinh học của hệ phương trình vi phân
S	Không thứ nguyên	Sai số chuẩn phần dư trong quá trình hồi quy phi tuyến

2. Các từ viết tắt chuyên ngành

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
MSY	Maximum Sustainable Yield	Sản lượng bền vững tối đa
MEY	Maximum Economic Yield	Sản lượng kinh tế tối đa
RMY	Resilience Maximizing Yield	Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi sinh thái
CPUE	Catch Per Unit Effort	Sản lượng đánh bắt trên một đơn vị nỗ lực
EBFM	Ecosystem-Based Fisheries Management	Quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh thái
ERP	Ecological Reference Point	Điểm tham chiếu sinh thái
ASMFC	Atlantic States Marine Fisheries Commission	Ủy ban Nghề cá Biển các Bang Đại Tây Dương
SEDAR	Southeast Data, Assessment, and Review	Cơ quan Đánh giá Dữ liệu Trữ lượng Đông Nam Hoa Kỳ
NEFSC	Northeast Fisheries Science Center	Trung tâm Khoa học Nghề cá Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Admin.	Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ
CBF	Chesapeake Bay Foundation	Quỹ Bảo tồn Vịnh Chesapeake
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm quốc nội

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và hệ sinh thái vịnh Chesapeake

Việc khai thác và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản biển, hiện đang là một trong những thách thức liên ngành cấp bách nhất đối với toán học ứng dụng, sinh thái học và kinh tế học môi trường. Khi các hoạt động khai thác vượt quá ngưỡng chịu đựng tự nhiên của quần thể sinh vật, tình trạng cạn kiệt nguồn lợi sinh khối (*stock depletion*) sẽ xảy ra trong dài hạn, kéo theo sự đổ vỡ của chuỗi thức ăn tự nhiên và đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học toàn cầu.

Vịnh Chesapeake (nằm ở bờ biển phía Đông nước Mỹ, tiếp giáp các bang Virginia và Maryland) là vùng cửa sông (*estuary*) lớn nhất tại Bắc Mỹ và là một trong những hệ sinh thái biển ven bờ phong phú nhưng có độ nhạy cảm sinh thái cao bậc nhất trên thế giới. Vịnh đóng vai trò là môi trường sống thiết yếu cho hơn 3.600 loài thực vật và động vật, đồng thời là ngư trường truyền thống cung cấp sinh kế cho hàng triệu người dân duyên hải. Để duy trì sự thịnh vượng kinh tế song hành cùng việc bảo tồn tính toàn vẹn của hệ sinh thái, việc xây dựng các chính sách khai thác nghề cá có cơ sở khoa học định lượng vững chắc là nhiệm vụ mang tính sống còn đối với các nhà quản lý [18].

Trong các mô hình sinh thái học truyền thống, các quần thể sinh vật thường được xem xét dưới góc độ đơn loài (*single-species management*), bỏ qua các mối tương tác cạnh tranh và săn bắt đa chiều trong lưới thức ăn. Tuy nhiên, trong môi trường tự nhiên như vịnh Chesapeake, sự biến động số lượng của một loài mắt xích có thể gây ra những hiệu ứng dây chuyền (*trophic cascade*) làm đảo lộn cấu trúc của toàn bộ hệ sinh thái. Bài báo khoa học của Iordanka N. Panayotova, John Herrmann và Nathan Kolling (2023) [18] tập trung nghiên cứu mối quan hệ tương tác mật thiết giữa hai loài cá có tầm quan trọng kinh tế và sinh thái bậc nhất tại vịnh Chesapeake:

1. **Cá mòi dầu Đại Tây Dương** (*Brevoortia tyrannus* – Atlantic Menhaden): loài cá mồi (*prey*) chiếm sinh khối khổng lồ, đóng vai trò nền tảng dinh dưỡng của vịnh.

2. **Cá vược sọc** (*Morone saxatilis* – Striped Bass / Rockfish): loài cá ăn thịt hàng đầu (*predator*), là mục tiêu chính của các ngành kinh tế khai thác thương mại và câu cá giải

trí.

1.2 Đặc điểm sinh học và vai trò của các loài sinh vật nghiên cứu

1.2.1 Cá mòi dầu Đại Tây Dương (*Brevoortia tyrannus*) – Loài cá mồi nền tảng

Cá mòi dầu Đại Tây Dương (*Brevoortia tyrannus*) được đông đảo các nhà sinh học biển và quản lý môi trường công nhận là *"loài cá quan trọng nhất trong vịnh Chesapeake"* [5].

Đặc điểm sinh học và tập tính: Cá mòi dầu trưởng thành có thể đạt chiều dài khoảng 18 inch (xấp xỉ 45 cm), tuổi thọ dao động từ 10 đến 12 năm và cân nặng trung bình lên đến 1 pound (khoảng 0.45 kg) [1, 7]. Chúng có tập tính bơi thành những đàn khổng lồ (*schools*) với mật độ dày đặc tại các tầng nước mặt ven bờ và cửa sông. Hoạt động sinh sản diễn ra chủ yếu vào các tháng thời tiết mát mẻ hoặc lạnh trong năm, song trên thực tế chúng có khả năng sinh sản rải rác quanh năm tại các vùng nước biển ấm hơn [1, 2].

Cơ chế dinh dưỡng và vai trò làm sạch môi trường nước: Cá mòi dầu là sinh vật ăn lọc (*filter-feeder*). Cấu tạo mang của chúng có các lược mang (*gill rakers*) rất phát triển và mịn màng, hoạt động như một hệ thống lưới lọc cơ học hoàn hảo giúp chúng lọc các hạt thức ăn lơ lửng trong nước khi bơi mở miệng. Chế độ dinh dưỡng của cá mòi dầu bao gồm thực vật phù du (*phytoplankton*), động vật phù du (*zooplankton*) và các vụn bã thực vật hữu cơ [15]. Thông qua việc tiêu thụ khối lượng khổng lồ tảo và sinh vật phù du, cá mòi dầu đóng vai trò như những "nhà máy xử lý sinh học tự nhiên", giúp hạn chế hiện tượng phú dưỡng hóa (*eutrophication*), kiểm soát sự bùng phát của tảo độc và giữ cho làn nước vịnh Chesapeake luôn trong sạch và giàu dưỡng khí.

Mắt xích truyền tải năng lượng sinh khối: Về mặt chức năng sinh thái học, cá mòi dầu đóng vai trò cầu nối chuyển giao năng lượng và chất dinh dưỡng từ các bậc dinh dưỡng thấp (sinh vật sản xuất sơ cấp) lên các bậc dinh dưỡng cao hơn trong chuỗi thức ăn biển [3]. Chúng là nguồn thức ăn chính và giàu năng lượng cho hàng loạt loài sinh vật ăn thịt quan trọng trong vịnh:

- Các loài cá săn mồi thương mại: cá vược sọc (*Morone saxatilis*) [25], cá xanh (*Pomatomus saltatrix*) [13], cá yếu (*Cynoscion regalis*) [16].
- Động vật săn mồi biển lớn: các loài cá mập cát (*Carcharhinus plumbeus*) [10].
- Chim săn mồi ven biển: chim ưng biển (*Pandion haliaetus* – Osprey) [12], đại bàng đầu trắng.
- Các loài động vật có vú biển và chim di cư ven bờ.

Giá trị kinh tế và sức khỏe con người: Bên cạnh vai trò sinh thái, cá mòi dầu tạo ra nguồn lợi kinh tế khổng lồ. Mặc dù thịt của cá mòi dầu nhiều xương và dầu, không phù hợp để dùng trực tiếp làm thực phẩm trên bàn ăn thông thường, nhưng loài cá này lại là đối nguyên liệu hàng đầu cho ngành công nghiệp chế biến bột cá (dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản) cũng như làm mồi câu cho nghề đánh bắt cua xanh và tôm hùm. Đặc biệt, dầu ép từ cá mòi dầu rất giàu các axit béo không bão hòa đa chuỗi dài Omega-3 (đặc biệt là EPA và DHA). Các hợp chất này có giá trị y dược và dinh dưỡng cực kỳ cao, hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, viêm khớp và tăng cường chức năng não bộ ở con người.

1.2.2 Cá vược sọc (*Morone saxatilis*) – Kẻ săn mồi đầu bảng

Cá vược sọc (*Morone saxatilis*), thường được gọi dân dã là *Rockfish*, là một trong những loài cá biểu tượng và có giá trị cao nhất tại vùng vịnh Chesapeake cũng như toàn bộ vùng duyên hải Đại Tây Dương của Bắc Mỹ [8].

Đặc điểm sinh học và vòng đời: Cá vược sọc trưởng thành có kích thước lớn, chiều dài phổ biến từ 2 đến 3 feet (khoảng 60 đến 90 cm) và khối lượng dao động từ 10 đến 30 pounds (tương đương 4.5 đến 13.6 kg), đôi khi có những cá thể vượt quá 40–50 pounds. Đây là loài cá di cư sinh sản ngược dòng (*anadromous*): chúng sống phần lớn cuộc đời trưởng thành ở vùng nước lợ và biển, nhưng di cư ngược dòng vào vùng nước ngọt của các nhánh sông thuộc vịnh Chesapeake từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm để đẻ trứng. Cá con sau khi nở sẽ lưu trú và kiếm ăn ở các vùng cửa sông nông có độ mặn thấp trong vài năm đầu trước khi gia nhập đàn cá trưởng thành ngoài biển khơi [21].

Tập tính săn mồi và vị trí trong lưới thức ăn: Cá vược sọc là loài săn mồi cơ hội ở bậc dinh dưỡng cao. Chế độ ăn của chúng rất phong phú, nhưng cá mòi dầu Đại Tây Dương chiếm tỷ trọng vượt trội trong khẩu phần thức ăn về mặt sinh khối và năng lượng trao đổi chất [25]. Bên cạnh đó, chúng tiêu thụ thêm các loài giáp xác (cua, tôm) và cá cơm biển. Khi còn nhỏ hoặc ở giai đoạn bán trưởng thành, cá vược sọc cũng là đối tượng săn mồi của cá mập lớn và chim ưng biển [10, 12]. Do đó, trạng thái số lượng của cá vược sọc phản ánh trực tiếp sức khỏe sinh thái của toàn bộ hệ sinh thái vịnh.

Tầm quan trọng kinh tế và thể thao giải trí: Khác với cá mòi dầu vốn chủ yếu được đánh bắt công nghiệp chế biến bột cá, cá vược sọc là trung tâm của hai ngành kinh tế thủy sản song song:

- **Nghề cá thương mại (*commercial fisheries*):** Cung cấp thịt cá thương phẩm cao cấp cho các nhà hàng và chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống trên toàn quốc.

- **Nghề cá giải trí (*recreational fisheries*):** Ngành du lịch câu cá giải trí thu hút hàng trăm nghìn cần thủ và du khách mỗi năm. Báo cáo phân tích kinh tế của tổ chức Southwick Associates (2019) [24] chỉ ra rằng nghề câu cá vược sọc đóng góp hàng tỷ đô la vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ, bảo đảm hàng chục ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp tại 11 bang dọc theo bờ biển Đại Tây Dương.

1.3 Hiện trạng suy giảm và khủng hoảng khai thác nghề cá

Mặc dù có vai trò thiết yếu, cả hai quần thể cá mòi dầu và cá vược sọc đều đã và đang trải qua những giai đoạn suy thoái trầm trọng, làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt giữa giới khoa học bảo tồn, các nhà hoạch định chính sách và các tập đoàn công nghiệp đánh bắt.

1.3.1 Khủng hoảng suy giảm cá mòi dầu và xung đột hạn ngạch

Từ những năm 1970 đến nay, sinh khối của cá mòi dầu Đại Tây Dương đã sụt giảm nghiêm trọng và liên tục duy trì ở mức thấp báo động [5]. Sự suy thoái này bắt nguồn từ hai nhóm nguyên nhân chính:

1. **Các áp lực môi trường sống suy thoái:** Ô nhiễm không khí và nguồn nước, hiện tượng nước biển ấm lên và biến đổi khí hậu toàn cầu, xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai, suy giảm diện tích đất ngập nước ven bờ do đô thị hóa và phân bón nông nghiệp chảy tràn tạo nên những "vùng chết" (*dead zones*) thiếu dưỡng khí vào mùa hè.

2. **Khai thác công nghiệp quá mức (*overharvesting*):** Đây được xem là mối đe dọa trực tiếp và nguy hiểm nhất. Các đội tàu công nghiệp quy mô lớn (điển hình là tập đoàn Omega Protein) sử dụng công nghệ trinh sát đàn cá bằng máy bay phối hợp cùng lưới vây khổng lồ (*purse seine nets*) để càn quét các đàn cá mòi dầu trong vịnh. Các tập đoàn lớn này liên tục vấp phải sự phản đối kịch liệt từ công chúng và các nhà bảo tồn vì nhiều lần vi phạm hoặc vận động hành lang làm suy yếu hạn ngạch đánh bắt (*harvest caps*) do chính quyền quy định [5, 20].

Điều đáng chú ý là tồn tại một mâu thuẫn sâu sắc giữa quan điểm quản lý hành chính và thực tế sinh thái: Trong khi Quỹ Bảo tồn Vịnh Chesapeake (*Chesapeake Bay Foundation*) và các nhà khoa học độc lập liên tục cảnh báo về sự cạn kiệt của cá mòi dầu, thì Báo cáo Đánh giá Trữ lượng năm 2019 của Ủy ban Nghề cá Biển các Bang Đại Tây Dương (ASMFC) thông qua chương trình SEDAR 69 lại đưa ra nhận định rằng *"loài cá mòi dầu Đại Tây Dương hiện chưa bị khai thác quá mức và tình trạng đánh bắt quá mức không xảy ra"* [23]. Nghịch lý này phản ánh sự sai lệch giữa các chỉ số tính toán đơn loài truyền thống so với nhu cầu thức ăn thực tế của toàn bộ lưới sinh thái.

1.3.2 Nguy cơ suy thoái và tình trạng đánh bắt quá mức của cá vược sọc

Đối với cá vược sọc, lịch sử sinh học cũng ghi nhận những đợt sụt giảm quần thể cận kề bờ vực tuyệt chủng vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, đến mức các cơ quan quản lý đã phải áp đặt lệnh cấm đánh bắt tạm thời (*moratorium*) nghiêm ngặt để quần thể có cơ hội phục hồi.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quần thể cá vược sọc lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy cấp do sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi:

- Ô nhiễm môi trường và độ pH suy giảm tại các khu vực bãi đẻ nước ngọt.
- Tình trạng suy kiệt nguồn thức ăn chính: sự suy giảm của đàn cá mòi dầu khiến cá vược sọc không đủ năng lượng dự trữ, dẫn đến tình trạng gầy yếu và bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (như bệnh lao cá do vi khuẩn *Mycobacteriosis*).
- Áp lực đánh bắt quá mức từ cả tàu cá thương mại và cần thủ giải trí. Đặc biệt, nghiên cứu sinh học ghi nhận khoảng 9% lượng cá vược sọc bắt được rồi thả lại (*catch-and-release*) trong nghề câu giải trí vẫn bị chết do sốc nhiệt độ và thương tích [6].

Theo Báo cáo Đánh giá Trữ lượng tại Hội thảo Đánh giá Trữ lượng Vùng Đông Bắc lần thứ 66 do Trung tâm Khoa học Nghề cá Đông Bắc (NEFSC) công bố, trữ lượng cá vược sọc chính thức bị xếp vào diện **bị khai thác quá mức** (*overfished*) và **đang diễn ra tình trạng khai thác quá mức** (*overfishing*) [17].

1.4 Thách thức quản lý tài nguyên chung và sự chuyển dịch mô hình

1.4.1 Bi kịch của tài nguyên sở hữu chung (*Tragedy of the Commons*)

Trong kinh tế học tài nguyên, các ngư trường biển tự nhiên thường là tài sản chung vô chủ hoặc thuộc sở hữu công cộng mở (*common property resources*). Do thiếu quyền sở hữu tài sản tư nhân được xác định rành mạch, từng đơn vị khai thác kinh tế (ngư dân, doanh nghiệp đánh bắt) luôn có xu hướng chạy đua tối đa hóa sản lượng đánh bắt nhằm nâng cao lợi nhuận trước mắt, mà không tính đến chi phí ngoại ứng (*negative externalities*) và thiệt hại dài hạn đối với khả năng tái sinh của nguồn tài nguyên sinh thái. Hiện tượng này dẫn thẳng đến tình trạng suy thoái tài nguyên chung (*overexploitation*) và cạn kiệt sinh học nếu không có sự can thiệp và điều tiết chặt chẽ từ phía nhà nước thông qua các công cụ pháp lý và chính sách kinh tế [11].

1.4.2 Hạn chế của phương pháp quản lý đơn loài và nhu cầu mô hình hóa đa loài

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các cơ quan quản lý nghề cá thường áp dụng các mô hình đánh giá trữ lượng đơn loài (*single-species stock assessment models*). Phương pháp tiếp cận này

giả định rằng tốc độ gia tăng sinh khối của một loài chỉ phụ thuộc vào số lượng cá thể nội bộ của chính loài đó và nỗ lực đánh bắt của con người.

Tuy nhiên, trong một lưới thức ăn biển tương hỗ, sự tương tác sinh thái là không thể tách rời:

> *"Nếu chúng ta khai thác cá mòi dầu ở mức sản lượng tối đa cho phép theo mô hình đơn loài, lượng sinh khối cá mòi dầu còn lại trong nước có thể không đủ để duy trì chuỗi thức ăn của cá vược sọc, từ đó vô tình đẩy quần thể cá vược sọc vào nguy cơ sụp đổ sinh học."*

Gần đây, các nhà nghiên cứu biển quốc tế đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải chuyển đổi sang phương thức **Quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh thái** (*Ecosystem-Based Fisheries Management – EBFM*) [3, 14]. Nghiên cứu của Howell và cộng sự (2021) [14] đã chỉ ra rằng, để bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng của các loài săn mồi đỉnh cao, chỉ tiêu khai thác an toàn (Điểm tham chiếu sinh thái – *Ecological Reference Points, ERP*) cho các loài cá mồi như cá mòi dầu cần phải được cắt giảm ít nhất **40%** so với ngưỡng tính toán bằng các mô hình đơn loài thông thường.

1.5 Phương pháp tiếp cận mô hình toán học trong đề tài

Để giải quyết bài toán phức tạp trên một cách khả thi và định lượng, bài báo khoa học của Panayotova và cộng sự (2023) [18] đã ứng dụng công cụ mô hình hóa toán học với hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát mở rộng.

1.5.1 Hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra hai loài

Xét hệ hai loài tương tác gồm con mồi $x(t)$ (cá mòi dầu) và kẻ săn mồi $y(t)$ (cá vược sọc). Động thái quần thể tự nhiên được mô tả qua hệ phương trình vi phân phi tuyến:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x(r - ax - by), \\ \dfrac{dy}{dt} = y(-e - cy + dx). \end{cases} \tag{1.1}$$

Trong đó:

- r là tốc độ tăng trưởng nội tại của con mồi; e là tốc độ tử vong tự nhiên của kẻ săn mồi khi thiếu con mồi.
- $a > 0$ và $c > 0$ là các hệ số tự giới hạn (*self-limitation*) phản ánh sự cạnh tranh nội bộ loài (*intra-species competition*) về không gian sống và thức ăn cục bộ. Giả thiết này khắc phục nhược điểm của mô hình Lotka–Volterra cổ điển (vốn dự báo dao động điều hòa không tắt) bằng cách đưa về động thái logistic tiệm cận thực tế.

- $b > 0$ là tỷ lệ cá mòi dầu bị cá vược sọc tiêu thụ; $d > 0$ biểu thị hiệu quả chuyển đổi dinh dưỡng từ con mồi sang tốc độ gia tăng của kẻ săn mồi.

Mặc dù mô hình (1.1) là một sự tinh giản so với hệ sinh thái cực kỳ phức tạp của vịnh Chesapeake (bỏ qua cấu trúc tuổi và các tương tác với các loài sinh vật khác), nó sở hữu những ưu thế toán học vượt trội:

1. **Khả năng giải tích chính xác (*analytically tractable*):** Cho phép tìm tường minh các nghiệm cân bằng, phân tích tính ổn định tiệm cận của ma trận Jacobi, tính dương và tính bị chặn của nghiệm.

2. **Mô tả được hành vi dao động lệch pha (*phase-shifted behavior*):** Tái hiện chính xác hiện tượng trễ pha điển hình trong các hệ sinh thái: sự gia tăng của con mồi kích thích sự phát triển của kẻ săn mồi, sau đó áp lực săn mồi gia tăng kéo theo sự suy giảm của con mồi, và chu kỳ lặp lại.

3. **Khả năng tích hợp dữ liệu thực nghiệm:** Số lượng tham số vừa đủ để có thể ước lượng tin cậy từ dữ liệu chuỗi thời gian thực tế mà không bị rơi vào hiện tượng quá khớp (*overfitting*).

1.5.2 Sơ đồ tương tác sinh thái – kinh tế

Mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố sinh thái, nguồn lợi sinh khối, hoạt động khai thác của con người và cơ chế thị trường kinh tế được tổng hợp trực quan trong Sơ đồ 1.1.

1.5.3 Tích hợp khai thác và mô hình kinh tế sinh thái (Bionomic model)


Để nghiên cứu tác động của con người, nhóm tác giả đưa thành phần khai thác vào hệ vi phân dựa trên giả thuyết **sản lượng đánh bắt trên một đơn vị nỗ lực** (*Catch-Per-Unit-Effort – CPUE*):

$$h_1 = q_1 E_1 x, \quad h_2 = q_2 E_2 y. \tag{1.2}$$

Trong đó E_1, E_2 là cường độ (nỗ lực) đánh bắt của các tàu thuyền đối với từng loài, và q_1, q_2 là các hệ số dễ đánh bắt. Kết hợp với hàm tô kinh tế (*economic rent*) thể hiện lợi nhuận ròng thu được sau khi trừ chi phí đánh bắt:

$$\pi(E_1, E_2) = (p_1 q_1 x - c_1)E_1 + (p_2 q_2 y - c_2)E_2, \tag{1.3}$$

với p_i là đơn giá thương phẩm trên một đơn vị sinh khối và c_i là chi phí cho một đơn vị nỗ lực khai thác.



Hình 1.1: Sơ đồ tương tác sinh thái – kinh tế trong hệ hai loài cá mòi dầu và cá vược sọc tại vịnh Chesapeake.

1.5.4 Khảo sát và đối sánh ba chính sách khai thác chiến lược

Nghiên cứu tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu thông qua việc so sánh ba chính sách khai thác then chốt:

1. **Chính sách Sản lượng bền vững tối đa (MSY – Maximum Sustainable Yield):** Khái niệm MSY bắt nguồn từ công trình kinh điển năm 1954 của Milner B. Schaefer [22]. Đây là cách tiếp cận nhằm xác định mức nỗ lực khai thác E_{MSY} để thu được sản lượng sinh khối hàng năm lớn nhất mà vẫn đảm bảo trữ lượng quần thể không bị suy giảm theo thời gian. Bài báo kiểm chứng điều kiện tồn tại của MSY trong bối cảnh hệ hai loài tương tác và chỉ ra những nguy cơ sinh học tiềm ẩn khi áp dụng máy móc MSY đơn loài cho các loài cá mồi.

2. **Chính sách Sản lượng kinh tế tối đa (MEY – Maximum Economic Yield):** Khác với MSY chỉ quan tâm đến sinh khối vật lý đánh bắt được, MEY nhắm tới việc tối đa hóa lợi nhuận kinh tế thuần túy $\pi(E)$. MEY xem xét yếu tố chi phí cận biên tăng dần khi nguồn cá cạn kiệt. Về mặt lý thuyết, chính sách MEY thường đòi hỏi mức nỗ lực khai thác thấp hơn MSY ($E_{\text{MEY}} < E_{\text{MSY}}$), do đó giúp bảo vệ quần thể cá tốt hơn và tạo ra vùng đệm an toàn trước các biến động ngẫu nhiên.

3. **Chính sách Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi sinh thái (RMY – Resilience Maximizing Yield):** Độ đàn hồi hay độ hồi phục (*Resilience* – R) là thước đo phản ánh tốc độ tự phục hồi của hệ thống sinh thái quay trở về trạng thái cân bằng sinh học bền vững sau khi chịu một nhiễu loạn môi trường đột ngột [19]. Theo lý thuyết của Pimm và Lawton (1978), thời gian phục hồi τ tỷ lệ nghịch với phần thực âm của giá trị riêng chủ đạo (λ_m) của ma trận Jacobian:
$$\tau = \frac{-1}{\mathrm{Re}(\lambda_m)}, \quad R = \frac{1}{\tau}. \tag{1.4}$$
Chính sách RMY ưu tiên tối đa hóa R (tức tối thiểu hóa thời gian τ), đặt sự an toàn và bền vững dài hạn của cấu trúc sinh thái lên trên các mục tiêu kinh tế ngắn hạn.

1.5.5 Phân tích độ nhạy cục bộ (Sensitivity Analysis)

Hệ thống các tham số sinh học trong thực tế thường chứa đựng những sai số đo đạc và sự biến động theo thời tiết khí hậu. Để đánh giá xem sự biến động nhỏ của từng tham số mô hình ảnh hưởng như thế nào đến nghiệm trạng thái theo thời gian, đề tài áp dụng **Phương pháp vi phân trực tiếp** (*Direct Differential Method*). Bằng cách thiết lập hệ phương trình vi phân bổ sung cho ma trận độ nhạy $S_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial p_j}$, nghiên cứu xác định được các tham số nhạy cảm nhất, giúp các nhà quản lý tập trung nguồn lực kiểm soát đúng những mắt xích then chốt.

1.6 Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài

1.6.1 Mục tiêu cụ thể

Trong khuôn khổ môn học *Các mô hình toán ứng dụng*, báo cáo hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Nắm vững phương pháp mô hình hóa sinh thái học:** Hiểu rõ cơ sở toán học và sinh học của mô hình Lotka–Volterra tổng quát, ý nghĩa các tham số và các giả thiết ràng buộc.

2. **Chứng minh chặt chẽ các tính chất toán học:** Chứng minh tính dương và tính bị chặn của nghiệm trong miền bất biến sinh học Ω, tìm nghiệm cân bằng kinh tế sinh thái (bionomic equilibria) và phân tích tính ổn định cục bộ thông qua các giá trị riêng của ma trận Jacobian.

3. **Khai thác dữ liệu thực nghiệm:** Tái hiện quy trình khớp mô hình phi tuyến với dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 1995–2017 của vịnh Chesapeake, đánh giá các chỉ số sai số thống kê.

4. **So sánh định lượng các chính sách khai thác:** Xác định tường minh công thức nghiệm cho E_{MSY}, E_{MEY}, E_{RMY} cho các kịch bản đánh bắt khác nhau (chỉ đánh bắt cá săn mồi, chỉ đánh bắt con mồi, đánh bắt hỗn hợp cả hai loài); phân tích sự đánh đổi (*trade-off*) giữa lợi nhuận kinh tế và độ an toàn sinh học.

5. **Thực hiện phân tích độ nhạy:** Đánh giá định lượng mức độ ảnh hưởng của từng tham số đến quỹ đạo nghiệm trạng thái quần thể hai loài.

1.6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Về mặt khoa học:** Báo cáo minh họa sinh động sức mạnh của toán học ứng dụng (cụ thể là lý thuyết phương trình vi phân phi tuyến, hệ động lực và giải tích ma trận) trong việc giải quyết các bài toán liên ngành phức tạp giữa kinh tế và sinh thái học.
- **Về mặt thực tiễn quản lý:** Kết quả nghiên cứu chứng minh rõ nét sự nguy hiểm của tư duy quản lý đơn loài đối với các loài cá mồi ven biển, đồng thời cung cấp những khuyến nghị có tính khả thi cao nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách nghề cá vịnh Chesapeake cân đối giữa mục tiêu sinh kế và bảo tồn nguồn lợi tự nhiên.

1.7 Bố cục của báo cáo

Báo cáo môn học được tổ chức thành 6 chương chính như sau:

- **Chương 1 – Mở đầu:** Trình bày bối cảnh nghiên cứu, tổng quan sinh học về cá mòi dầu và cá vược sọc tại vịnh Chesapeake, thực trạng khai thác, các thách thức quản lý tài nguyên chung, mô hình hóa toán học và mục tiêu của đề tài.
- **Chương 2 – Mô hình toán học và dữ liệu thực tế:** Trình bày chi tiết hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát 2 loài, các giả thiết mô hình, phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến khớp với dữ liệu thời gian 1995–2017, dự báo động thái đến năm 2100 và tính toán độ đàn hồi ban đầu.
- **Chương 3 – Mô hình kinh tế sinh thái và phân tích ổn định:** Xây dựng hệ bionomic có xét đến nỗ lực đánh bắt, chứng minh tính dương và tính bị chặn của nghiệm trong tập bất biến Ω, xác định các điều kiện tồn tại điểm cân bằng bionomic và phân tích tính ổn định tiệm cận của hệ thống.
- **Chương 4 – Phân tích các chính sách khai thác nghề cá:** Khảo sát chi tiết ba chính sách khai thác MSY, MEY và RMY trong ba kịch bản quản lý (chỉ khai thác kẻ săn mồi, chỉ khai thác con mồi, khai thác đồng thời cả hai loài); phân tích sự đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và tính bền vững sinh thái.
- **Chương 5 – Phân tích độ nhạy cục bộ:** Ứng dụng phương pháp vi phân trực tiếp để khảo sát tốc độ biến thiên của nghiệm theo 8 tham số động thái, xếp hạng các tham số then chốt chi phối hệ thống.

- **Chương 6 – Thảo luận và Kết luận:** Tổng hợp các kết quả chính, thảo luận các hàm ý chính sách đối với quản lý vịnh Chesapeake, đánh giá những hạn chế của mô hình và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ DỮ LIỆU THỰC TẾ

2.1 Hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát

Để nghiên cứu động thái biến động số lượng cá thể trong mối quan hệ dinh dưỡng giữa cá mòi dầu Đại Tây Dương (*Atlantic menhaden*) và cá vược sọc (*striped bass*), bài báo của Panayotova và cộng sự [18] sử dụng hệ phương trình vi phân Lotka–Volterra tổng quát mở rộng (*generalized Lotka–Volterra model*). Hệ gồm hai phương trình vi phân phi tuyến bậc nhất mô tả tốc độ biến thiên theo thời gian của sinh khối con mồi $x(t) = x$ và kẻ săn mồi $y(t) = y$:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x(r - ax - by), \\ \dfrac{dy}{dt} = y(-e - cy + dx). \end{cases} \tag{2.1}$$

2.1.1 Ý nghĩa sinh học của các tham số

Trong hệ phương trình (2.1), các tham số đều nhận giá trị thực dương và mang ý nghĩa sinh thái rõ rệt:

- $r > 0$ (năm^{-1}): Tốc độ tăng trưởng nội tại (*intrinsic growth rate*) của quần thể cá mòi dầu khi mật độ cá thể ở mức rất thấp và không chịu áp lực từ kẻ săn mồi.
- $a > 0$ (năm^{-1} $\times$ (tỷ con)$^{-1}$): Hệ số tự giới hạn (*self-limitation parameter*) của cá mòi dầu. Đại lượng này phản ánh sự cạnh tranh nội bộ loài (*intra-species competition*) đối với thức ăn (thực vật phù du) và không gian sống ven bờ. Sức chứa môi trường của riêng cá mòi dầu khi vắng bóng kẻ săn mồi là $K_x = r/a$.
- $b > 0$ (năm^{-1} $\times$ (tỷ con)$^{-1}$): Tốc độ tiêu thụ cá mòi dầu của cá vược sọc, biểu thị tác động săn bắt làm suy giảm quần thể con mồi trên mỗi đơn vị gặp gỡ giữa hai loài.
- $e > 0$ (năm^{-1}): Tỷ lệ tử vong tự nhiên (*natural mortality rate*) của cá vược sọc khi hoàn toàn không có nguồn thức ăn cá mòi dầu.

- $c > 0$ (năm^{-1} $\times$ (tỷ con)$^{-1}$): Hệ số tự giới hạn nội bộ loài của cá vược sọc, phản ánh áp lực cạnh tranh lãnh thổ sinh sản tại bãi đẻ nước ngọt và các yếu tố mật độ quần thể.

- $d > 0$ (năm^{-1} $\times$ (tỷ con)$^{-1}$): Hiệu quả chuyển đổi sinh khối (*conversion efficiency*), đo lường tốc độ gia tăng số lượng kẻ săn mồi nhờ hấp thụ thức ăn từ việc tiêu thụ quần thể con mồi.

2.1.2 Các giả thiết sinh học nền tảng

Hệ mô hình (2.1) được thiết lập dựa trên 5 giả thiết sinh học then chốt sau đây:

1. **Tăng trưởng logistic của con mồi:** Khi không có kẻ săn mồi ($y = 0$), tốc độ biến thiên của cá mòi dầu tuân theo phương trình vi phân logistic:

$$\frac{dx}{dt} = x(r - ax) = rx\left(1 - \frac{x}{r/a}\right). \tag{2.2}$$

   Quần thể con mồi sẽ tiệm cận ổn định về sức chứa môi trường $K_x = r/a$.

2. **Nguồn thức ăn duy nhất của kẻ săn mồi:** Trong phạm vi không gian sinh thái của mô hình, cá vược sọc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn là cá mòi dầu để duy trì sự sống và sinh sản.

3. **Suy giảm theo hàm mũ khi thiếu thức ăn:** Khi vắng bóng con mồi ($x = 0$), phương trình cho cá vược sọc trở thành $\frac{dy}{dt} = -ey - cy^2 < -ey$. Do đó, số lượng cá vược sọc sẽ suy giảm nhanh hơn hoặc bằng hàm mũ $y(t) \leq y(0)e^{-et} \to 0$ khi $t \to \infty$.

4. **Cô lập hóa hệ sinh thái hai loài:** Bỏ qua các tương tác dinh dưỡng phức tạp với các loài sinh vật khác (như cá xanh, chim ưng, động vật phù du) cũng như những biến động ngẫu nhiên về khí hậu thời tiết.

5. **Đồng nhất về cấu trúc cá thể:** Mô hình không phân biệt cấu trúc tuổi, giới tính, kích thước cá thể hay sự phân bố không gian địa lý của các đàn cá.

2.1.3 Ưu thế của mô hình

Mặc dù là một sự đơn giản hóa so với lưới thức ăn tự nhiên khổng lồ của vịnh Chesapeake, mô hình Lotka–Volterra tổng quát có các ưu thế vượt trội:

- **Nắm bắt được tính dao động trễ pha (*phase-shifted behavior*):** Tái hiện quy luật tự nhiên trong quan hệ con mồi – kẻ săn mồi: sự phát triển của con mồi thúc đẩy sự bùng nổ của kẻ săn mồi, sau đó áp lực săn bắt khiến con mồi sụt giảm, dẫn tới sự suy giảm trễ pha của kẻ săn mồi.

- **Giải tích khả thi (*analytically tractable*):** Số lượng phương trình và tham số vừa phải, cho phép giải tích tường minh các trạng thái cân bằng, khảo sát ma trận Jacobi và tính ổn định tiệm cận mà không cần dùng đến các phương pháp xấp xỉ quá phức tạp.
- **Ước lượng tin cậy từ dữ liệu thực tế:** Hệ thống gồm 6 tham số là quy mô lý tưởng để khớp với chuỗi dữ liệu lịch sử hạn chế mà không bị rơi vào hiện tượng quá khớp (*overfitting*).

2.2 Dữ liệu thực nghiệm và phương pháp hiệu chỉnh tham số

2.2.1 Nguồn dữ liệu chuỗi thời gian

Các tác giả sử dụng chuỗi dữ liệu độ phong phú cá thể (*abundance estimates*) thực tế tại vịnh Chesapeake trong giai đoạn 23 năm (từ 1995 đến 2017) được công bố chính thức bởi Ủy ban Nghề cá Biển các Bang Đại Tây Dương (ASMFC) [4]:

- Dữ liệu cá mòi dầu được trích xuất từ Báo cáo Đánh giá Chuẩn Trữ lượng Cá mòi dầu Đại Tây Dương 2019 (*Atlantic Menhaden 2019 Benchmark Stock Assessment*) [23].
- Dữ liệu cá vược sọc được trích xuất từ Báo cáo Cập nhật Đánh giá Trữ lượng Cá vược sọc Đại Tây Dương 2022 (*2022 Atlantic Striped Bass Stock Assessment Update Report*) [4].

Để phản ánh đúng quy mô thực tế của quần thể tự nhiên, chuỗi số liệu đã được hiệu chỉnh bổ sung ước lượng nỗ lực khai thác của nghề cá thương mại và nghề câu cá giải trí hàng năm.

2.2.2 Chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp khớp bình phương tối thiểu phi tuyến

Để phục vụ tính toán số học trên máy tính và tránh sai số tràn số dấu phẩy động, toàn bộ dữ liệu độ phong phú được chuẩn hóa bằng cách thu nhỏ theo tỷ lệ 10^9 (tức tính theo đơn vị **tỷ cá thể**):

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x}{10^9}, \quad y_{\text{scaled}} = \frac{y}{10^9}. \tag{2.3}$$

Nhóm tác giả sử dụng phần mềm MATLAB và Python để giải bài toán tối ưu hóa khớp mô hình (2.1) với chuỗi dữ liệu thời gian bằng **Phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến** (*Nonlinear Least Squares method*). Mục tiêu là tìm véctơ tham số tối ưu $\theta = (r, a, b, e, c, d)^T$ nhằm cực tiểu hóa hàm mục tiêu sai số bình phương:

$$\min_{\theta \in \Theta} \sum_{k=1}^{N} \left[\left(x(t_k; \theta) - x_k^{\text{obs}} \right)^2 + \left(y(t_k; \theta) - y_k^{\text{obs}} \right)^2 \right], \tag{2.4}$$

trong đó $N = 23$ là số mốc thời gian quan sát từ năm 1995 đến 2017.

Do bản chất phi tuyến cao của hệ Lotka–Volterra và việc hệ phương trình là một hệ toán học quá xác định (*over-determined system*), trong không gian tham số có thể tồn tại nhiều bộ

tham số cục bộ cho kết quả khớp tương đối tốt. Nhóm tác giả đã thiết lập ràng buộc chặn trên cho tất cả các tham số là 10 ($\theta_i \in (0, 10]$). Ràng buộc này cho phép xác định được giá trị tối ưu của tốc độ tăng trưởng nội tại của cá mòi dầu là $r = 0.513$. Đáng chú ý, giá trị $r = 0.513$ hoàn toàn phù hợp và tương thích về độ lớn với kết quả ước lượng độc lập từ dữ liệu sinh học thống kê trong công trình của Drew và cộng sự (2021) [9].

2.2.3 Bảng tham số tối ưu thu được

Bộ tham số tối ưu của mô hình được tổng hợp trong Bảng 2.1 (tương ứng với Table 1 trong bài báo gốc [18]):

Bảng 2.1: Bảng giá trị tham số của mô hình thu được từ quá trình khớp dữ liệu thực tế.

Tham số	**Ý nghĩa sinh học**	**Giá trị**	**Đơn vị thứ nguyên**
r	Tốc độ tăng trưởng nội tại cá mòi dầu	0.513	năm^{-1}
a	Hệ số tự giới hạn của cá mòi dầu	0.026	năm^{-1} $\times$ (tỷ cá thể)$^{-1}$
b	Tác động săn bắt của cá vược sọc lên cá mòi dầu	1.765	năm^{-1} $\times$ (tỷ cá thể)$^{-1}$
e	Tỷ lệ tử vong tự nhiên của cá vược sọc	1.213	năm^{-1}
c	Hệ số tự giới hạn của cá vược sọc	0.520	năm^{-1} $\times$ (tỷ cá thể)$^{-1}$
d	Hiệu quả tiêu thụ cá mòi dầu lên cá vược sọc	9.999	năm^{-1} $\times$ (tỷ cá thể)$^{-1}$

Độ chính xác của mô hình hồi quy phi tuyến được đánh giá thông qua chỉ số **Sai số chuẩn phần dư** (*Residual Standard Error* – S):


$$S = \sqrt{\frac{1}{2N - p} \sum_{k=1}^{N} \left[\left(x(t_k) - x_k^{\text{obs}} \right)^2 + \left(y(t_k) - y_k^{\text{obs}} \right)^2 \right]} = 0.11, \tag{2.5}$$

trong đó $2N = 46$ là tổng số điểm quan sát của hai loài và $p = 6$ là số tham số ước lượng. Giá trị $S = 0.11$ cho biết khoảng cách sai lệch trung bình giữa các điểm dữ liệu thực nghiệm quan sát được và đường cong hồi quy lý thuyết của mô hình chỉ vào khoảng 0.11 tỷ cá thể (110 triệu con), chứng minh mô hình có độ khớp tốt và mô tả sát thực trạng thái hệ sinh thái vịnh.

2.3 Kết quả khớp mô hình và phân tích dự báo đến năm 2100

2.3.1 Biểu đồ khớp mô hình giai đoạn 1995–2017

Hình 2.1 biểu diễn kết quả đường cong mô hình lý thuyết so với dữ liệu quan sát thực tế của cá mòi dầu (đường màu đỏ) và cá vược sọc (đường màu xanh lam) trong giai đoạn 1995–2017.



Hình 2.1: Đường cong khớp của mô hình Lotka–Volterra với chuỗi số liệu thực tế về độ phong phú cá thể của cá mòi dầu (đỏ) và cá vược sọc (xanh) từ 1995 đến 2017 (tái hiện Hình 1 từ bài báo gốc [18]).


Từ Hình 2.1, chúng ta nhận thấy rõ hiện tượng dao động lệch pha sinh thái tự nhiên:

- Khi quần thể cá mòi dầu dồi dào, quần thể cá vược sọc có nguồn dinh dưỡng phong phú và bắt đầu tăng trưởng mạnh.
- Sự gia tăng của cá vược sọc tạo áp lực săn bắt cực lớn, làm suy giảm quần thể cá mòi dầu trong các giai đoạn tiếp theo.
- Khi cá mòi dầu khan hiếm, đàn cá vược sọc thiếu thức ăn và bước vào chu kỳ suy giảm số lượng, tạo điều kiện cho cá mòi dầu bắt đầu hồi phục trở lại.

2.3.2 Dự báo động thái quần thể đến năm 2100

Sử dụng mô hình (2.1) với bộ tham số tối ưu từ Bảng 2.1, nhóm tác giả tiến hành mô phỏng số để dự báo xu thế phát triển dài hạn của quần thể hai loài cá từ năm 1995 đến năm 2100. Kết quả mô phỏng được thể hiện trong Hình 2.2.

Từ đồ thị dự báo Hình 2.2, chúng ta nhận thấy rằng:



Hình 2.2: Dự báo của mô hình về động thái quần thể cá mòi dầu và cá vược sọc đến năm 2100 (tái hiện Hình 2 từ bài báo gốc [18]).

1. Biên độ dao động của cả hai quần thể suy giảm dần theo thời gian (dao động tắt dần – *damped oscillations*).

2. Sau năm 2050, hệ sinh thái tiệm cận và hội tụ bền vững về trạng thái cân bằng dừng (*steady-state equilibrium*) $Q = (x^*, y^*)$.

2.3.3 Tính toán điểm cân bằng dừng

Tại trạng thái cân bằng đồng tồn tại tự nhiên (*co-existence equilibrium*), các đạo hàm theo thời gian bằng 0:

$$\begin{cases} r - ax^* - by^* = 0, \\ -e - cy^* + dx^* = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} ax^* + by^* = r, \\ dx^* - cy^* = e. \end{cases} \tag{2.6}$$

Sử dụng định lý Cramer, nghiệm cân bằng được tính tường minh:

$$x^* = \frac{rc + be}{ac + bd}, \tag{2.7}$$

$$y^* = \frac{rd - ae}{ac + bd}. \tag{2.8}$$

Thay các giá trị tham số từ Bảng 2.1 vào công thức:

$$ac + bd = (0.026)(0.520) + (1.765)(9.999) = 0.01352 + 17.648235 = 17.661755,$$
$$rc + be = (0.513)(0.520) + (1.765)(1.213) = 0.26676 + 2.140945 = 2.407705,$$
$$rd - ae = (0.513)(9.999) - (0.026)(1.213) = 5.129487 - 0.031538 = 5.097949.$$

Do đó:

$$x^* = \frac{2.407705}{17.661755} \approx 0.1363, \quad y^* = \frac{5.097949}{17.661755} \approx 0.2886. \tag{2.9}$$

Như vậy, điểm cân bằng dừng của hệ thống là:

$$Q = (x^*, y^*) = (0.1363, 0.2886). \tag{2.10}$$

Quy đổi theo quy mô số lượng cá thể thực tế, trạng thái dừng tự nhiên của vịnh Chesapeake tương ứng với khoảng **136.3 triệu con cá mòi dầu** và **288.6 triệu con cá vược sọc**.

2.4 Phân tích độ đàn hồi sinh thái (Resilience) của hệ thống

2.4.1 Khái niệm độ đàn hồi theo Pimm và Lawton (1978)

Trong sinh thái học toán học, **Độ đàn hồi sinh học** (*Resilience* – R) là một chỉ số động lực học định lượng đo lường tốc độ mà một hệ sinh thái có thể tự ổn định và phục hồi trở lại trạng thái cân bằng bền vững ban đầu sau khi phải chịu đựng một cú sốc hoặc nhiễu loạn môi trường đột ngột [19].

Theo lý thuyết kinh điển của Stuart L. Pimm và John H. Lawton (1978) [19], thời gian phục hồi về trạng thái cân bằng τ (*return time to equilibrium*) tỷ lệ nghịch với độ lớn của phần thực âm của giá trị riêng chủ đạo (*leading eigenvalue*) của ma trận Jacobian:

$$\tau = \frac{-1}{\mathrm{Re}(\lambda_m)} \quad \text{và} \quad R = \frac{1}{\tau} = -\mathrm{Re}(\lambda_m), \tag{2.11}$$

trong đó λ_m là giá trị riêng có phần thực lớn nhất (gần trục ảo nhất, chi phối tốc độ suy giảm chậm nhất của nghiệm nhiễu loạn) của hệ thống tuyến tính hóa tại điểm cân bằng.

Nhận xét 2.1. *Các tính chất quan trọng của chỉ số độ đàn hồi:*

1. *Khái niệm độ đàn hồi chỉ có nghĩa khi hệ thống ở trạng thái cân bằng ổn định tiệm cận (asymptotically stable), tức* $\mathrm{Re}(\lambda_m) < 0$. *Khi đó* $\tau > 0$ *và* $R > 0$.

2. *Độ đàn hồi* R *và thời gian phục hồi* τ *tỷ lệ nghịch với nhau. Hệ sinh thái có độ đàn hồi* R *càng cao thì thời gian hồi phục* τ *sau nhiễu loạn càng ngắn, đồng nghĩa với việc hệ thống*

có sức đề kháng cao hơn và ít bị tổn thương hơn trước những biến động ngoại cảnh.

2.4.2 Thiết lập ma trận Jacobian và giá trị riêng của hệ thống

Để khảo sát độ ổn định và tính độ đàn hồi tại điểm cân bằng đồng tồn tại (x^*, y^*), ta tuyến tính hóa hệ phương trình vi phân (2.1). Ma trận Jacobi tổng quát của hệ là:

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \dfrac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \dfrac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r - 2ax - by & -bx \\ dy & -e - 2cy + dx \end{pmatrix}. \tag{2.12}$$

Tại điểm cân bằng đồng tồn tại $Q = (x^*, y^*)$, do thỏa mãn $r - ax^* - by^* = 0$ và $-e - cy^* + dx^* = 0$, ma trận Jacobi rút gọn thành:

$$J(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} -ax^* & -bx^* \\ dy^* & -cy^* \end{pmatrix} = A. \tag{2.13}$$

Phương trình đặc trưng của ma trận A là phương trình bậc hai:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0, \tag{2.14}$$

với:

$$\operatorname{tr}(A) = -(ax^* + cy^*), \tag{2.15}$$

$$\det(A) = (-ax^*)(-cy^*) - (-bx^*)(dy^*) = (ac + bd)x^*y^*. \tag{2.16}$$

Do $x^* > 0, y^* > 0$ và các tham số a, b, c, d đều dương:

- Vết của ma trận luôn âm: $\operatorname{tr}(A) = -(ax^* + cy^*) < 0$.
- Định thức luôn dương: $\det(A) = (ac + bd)x^*y^* > 0$.

Theo tiêu chuẩn Routh–Hurwitz, cả hai giá trị riêng của ma trận A đều có phần thực âm, khẳng định điểm cân bằng đồng tồn tại $Q(x^*, y^*)$ là **ổn định tiệm cận** (*asymptotically stable*).

2.4.3 Tính toán giá trị số cụ thể

Thay các giá trị tham số từ Bảng 2.1 và tọa độ cân bằng $(x^*, y^*) = (0.1363, 0.2886)$ vào:

$$\begin{aligned}\text{tr}(A) &= -\left[(0.026)(0.1363) + (0.520)(0.2886)\right] \\ &= -(0.0035438 + 0.150072) = -0.1536158,\end{aligned}$$

$$\det(A) = (17.661755)(0.1363)(0.2886) \approx 0.694747.$$

Biệt thức Δ của phương trình đặc trưng:

$$\begin{aligned}\Delta &= (\text{tr}(A))^2 - 4\det(A) \\ &= (-0.1536158)^2 - 4(0.694747) \\ &= 0.023598 - 2.778988 = -2.75539 < 0.\end{aligned} \tag{2.17}$$

Vì $\Delta < 0$, hai giá trị riêng là một cặp số phức liên hợp:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\text{tr}(A)}{2} \pm i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \approx \frac{-0.1536}{2} \pm i\frac{\sqrt{2.7554}}{2} \approx -0.0768 \pm 0.8301i. \tag{2.18}$$

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với công thức (2) trong bài báo gốc [18]:

$$\lambda_1 \approx -0.0768 + 0.8301i, \quad \lambda_2 \approx -0.0768 - 0.8301i. \tag{2.19}$$

2.4.4 Ý nghĩa sinh thái của thời gian hồi phục

Do cả hai giá trị riêng đều có phần thực bằng nhau $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\lambda_2) \approx -0.0768 < 0$, phần thực của giá trị riêng chủ đạo là $\text{Re}(\lambda_m) = -0.0768$.

Áp dụng công thức (2.11), ta tính được:

$$R \approx 0.0768 \text{ năm}^{-1}, \tag{2.20}$$

$$\tau \approx \frac{1}{0.0768} \approx 13.021 \text{ năm}. \tag{2.21}$$

Ý nghĩa sinh thái quan trọng của chỉ số độ đàn hồi:

Giá trị $\tau \approx 13.021$ năm chỉ ra rằng: Nếu hệ sinh thái tự nhiên của vịnh Chesapeake (trong điều kiện chưa bị đánh bắt nhân tạo) phải hứng chịu một cú sốc hoặc nhiễu loạn môi trường lớn (như một đợt rét kỷ lục, hiện tượng tràn dầu, suy thoái đột ngột chất lượng nước hay dịch bệnh), thì hệ thống sẽ mất khoảng **13 năm** để các dao động số lượng cá thể tắt dần và quần thể hai loài tự phục hồi trở về trạng thái cân bằng sinh học ban đầu. Khoảng thời gian 13 năm là một chu kỳ phục hồi tương đối dài trong quản lý sinh thái biển. Điều này cho thấy hệ thống vịnh Chesapeake có độ nhạy cảm cao và tốc độ tự chữa lành tương đối chậm, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt rằng mọi chính sách khai thác thương mại của con người cần phải được kiểm soát cẩn trọng để tránh đẩy hệ thống vượt qua ngưỡng chịu đựng tự nhiên.

CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI VÀ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH

(Nội dung chi tiết của chương này sẽ được phát triển đầy đủ trong giai đoạn tiếp theo):

3.1 Mô hình kinh tế sinh thái (Bionomic Model)

Xây dựng hệ phương trình vi phân có khai thác dựa trên giả thuyết CPUE và hàm tô kinh tế $\pi(E_1, E_2)$:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x(r - ax - by) - q_1 E_1 x, \\ \dfrac{dy}{dt} = y(-e - cy + dx) - q_2 E_2 y, \\ \pi(E_1, E_2) = (p_1 q_1 x - c_1)E_1 + (p_2 q_2 y - c_2)E_2. \end{cases} \tag{3.1}$$

3.2 Chứng minh tính dương và tính bị chặn của nghiệm

- Xác định miền bất biến sinh học:

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2_+ \;\middle|\; 0 \le x \le \frac{r}{a},\ 0 \le x + \frac{y}{\gamma} \le L \right\}, \tag{3.2}$$

  với $\gamma = d/b$, $\delta = \min(q_1 E_1, q_2 E_2, e)$, $L = \frac{r^2}{4a\delta}$.

- Chứng minh nghiệm $x(t) \ge 0, y(t) \ge 0$ với mọi $t \ge 0$ khi điều kiện đầu không âm.

- Ứng dụng thừa số tích phân để chứng minh $\limsup_{t\to\infty} w(t) \le \frac{r^2}{4a\delta}$, bảo đảm tính bị chặn toàn cục.

3.3 Điều kiện tồn tại các điểm cân bằng bionomic

Khảo sát 4 trường hợp khai thác:

1. **Trường hợp 1:** Chỉ khai thác cá vược sọc ($E_1 = 0, E_2 \neq 0$) – Định lý 3.1.

2. **Trường hợp 2:** Chỉ khai thác cá mòi dầu ($E_1 \neq 0, E_2 = 0$) – Định lý 3.2.
3. **Trường hợp 3:** Không khai thác loài nào ($E_1 = E_2 = 0$) – Điểm cân bằng sinh học thuần túy.
4. **Trường hợp 4:** Khai thác đồng thời cả hai loài ($E_1 \neq 0, E_2 \neq 0$) – Định lý 3.3.

3.4 Tác động của khai thác lên tính ổn định tiệm cận

Phân tích ma trận Jacobi $J(x, y)$, phương trình đặc trưng và dấu của Trace, Determinant để chứng minh tính ổn định tiệm cận cho từng trường hợp.

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH CÁC CHÍNH SÁCH KHAI THÁC NGHỀ CÁ

(Nội dung chi tiết của chương này sẽ được phát triển đầy đủ trong giai đoạn tiếp theo):

4.1 Chính sách Sản lượng bền vững tối đa (MSY)

- Tối đa hóa hàm sản lượng đánh bắt $Y(E) = q_1 E x^* + q_2 E y^*$.
- **Trường hợp 1 (Chỉ khai thác cá vược sọc):** Nỗ lực $E_{\text{MSY}} = \frac{rd-ae}{2aq_2}$. Chứng minh quần thể kẻ săn mồi ở mức MSY bằng 50% quần thể khi chưa đánh bắt (Định lý 4.1).
- **Trường hợp 2 (Chỉ khai thác cá mòi dầu):** Điều kiện tồn tại MSY đòi hỏi $\frac{rd-ae}{cr+be} > \frac{d}{2c}$. Đối với hệ sinh thái vịnh Chesapeake, điều kiện này không thỏa mãn, nỗ lực $E_{Y_m} \approx 1.02$ sẽ dẫn tới sự tuyệt chủng của cá vược sọc; do đó chính sách khuyến nghị giảm 50%: $E_{\text{MSY}} = 0.5$ (Định lý 4.2).
- **Trường hợp 3 (Khai thác đồng thời cả hai loài):** Điều kiện tồn tại nghiệm bền vững và mức khuyến nghị an toàn sinh thái $E_{\text{MSY}} = 0.5$ (Định lý 4.3).

4.2 Chính sách Sản lượng kinh tế tối đa (MEY)

- Tối đa hóa hàm tô kinh tế ròng $\text{Rent}(E) = R(E) - C(E) = \hat{p}Y(E) - \hat{c}E$.
- Chứng minh tính chất quan trọng: $E_{\text{MEY}} < E_{\text{MSY}}$ khi chỉ đánh bắt cá vược sọc, khẳng định chính sách MEY thân thiện hơn với bảo tồn sinh thái.
- Phân tích nghịch lý kinh tế khi đánh bắt cá mòi dầu hoặc cả hai loài trong vịnh Chesapeake: E_{MEY} nhận giá trị âm dưới các giả định chi phí thông thường, chứng minh MEY không thể áp dụng độc lập mà cần kết hợp bảo trợ hệ sinh thái.

4.3 Chính sách Sản lượng tối đa hóa độ đàn hồi (RMY)

- Đánh giá tác động của nỗ lực khai thác lên độ hồi phục R và thời gian cân bằng τ.
- **Đánh bắt cá vược sọc:** Độ đàn hồi tăng tuyến tính theo nỗ lực trong miền khảo sát ($E_{\text{RMY}} = 10$).
- **Đánh bắt cá mòi dầu:** Độ đàn hồi giảm đơn điệu ngặt theo E_1, đạt cực đại tại $E_1 = 0$; bất kỳ nỗ lực đánh bắt cá mòi dầu nào cũng phải trả giá bằng sự suy giảm độ bền vững sinh thái.
- **Đánh bắt kết hợp hai loài:** Sự đánh đổi gay gắt giữa sản lượng và độ ổn định hệ thống.

CHƯƠNG 5

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỤC BỘ

(Nội dung chi tiết của chương này sẽ được phát triển đầy đủ trong giai đoạn tiếp theo):

5.1 Phương pháp vi phân trực tiếp (Direct Differential Method)

- Thiết lập hệ phương trình vi phân mở rộng gồm 2 phương trình trạng thái và các phương trình cho véctơ độ nhạy:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial u_i}{\partial p_j}\right) = J \cdot S_j + F_j, \tag{5.1}$$

  với véctơ 8 tham số $p = (r, a, b, E_1, e, c, d, E_2)$.

- Tính ma trận Jacobian $J(x, y)$ và ma trận đạo hàm riêng của vế phải F.

5.2 Chỉ số độ nhạy tương đối và xếp hạng tham số

- Tính chuẩn Euclidean của ma trận độ nhạy tương đối:

$$\|\bar{S}_{ij}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial u_i}{\partial p_j}(t_k)\frac{p_j}{u_i(t_k)}\right)^2}. \tag{5.2}$$

- **Đối với cá vược sọc:** Nhạy cảm nhất với tốc độ tăng trưởng nội tại của cá mòi dầu r ($\|\cdot\|_2 \approx 1.0080$), hệ số săn bắt b (≈ 1.0004) và nỗ lực đánh bắt cá mòi dầu E_1 ($1.9647E_1/q_1$).

- **Đối với cá mòi dầu:** Nhạy cảm nhất với hiệu suất chuyển hóa dinh dưỡng d (≈ 0.9985), tỷ lệ tử vong tự nhiên của kẻ săn mồi e (≈ 0.8886) và nỗ lực đánh bắt cá vược sọc E_2 ($0.7328E_2/q_2$).

- Thảo luận ý nghĩa thực nghiệm đối với các nhà quản lý sinh thái.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

(Nội dung chi tiết của chương này sẽ được phát triển đầy đủ trong giai đoạn tiếp theo):

6.1 Tổng kết các kết quả đạt được

- Đã xây dựng và khảo sát toàn diện mô hình toán học Lotka–Volterra tổng quát 2 loài tích hợp yếu tố khai thác và kinh tế sinh thái cho hệ cá mòi dầu – cá vược sọc tại vịnh Chesapeake.
- Đã chứng minh chặt chẽ tính đặt đúng của mô hình (tính dương và bị chặn toàn cục trong miền Ω).
- Đã chỉ ra sự khác biệt bản chất và những hiểm họa tiềm ẩn khi áp dụng chính sách MSY đơn loài cho cá mồi; chứng minh sự cần thiết của việc giảm 50% hạn ngạch đánh bắt cá mòi dầu để bảo vệ kẻ săn mồi.
- Đã phân tích tính khả thi và giới hạn của chính sách MEY và RMY đối với hệ thống đa loài.
- Đã định lượng mức độ nhạy cảm của các tham số then chốt thông qua phương pháp vi phân trực tiếp.

6.2 Hàm ý chính sách quản lý cho vịnh Chesapeake

- Chuyển đổi căn bản từ quản lý đơn loài sang Quản lý Nghề cá Dựa trên Hệ sinh thái (EBFM).
- Thiết lập các Điểm tham chiếu sinh thái (ERP) nghiêm ngặt đối với cá mòi dầu Đại Tây Dương để bảo tồn nguồn thức ăn cho cá vược sọc và các loài thủy sản thượng tầng.
- Kiểm soát chặt chẽ đội tàu lưới vây công nghiệp và hạn ngạch của các tập đoàn đánh bắt lớn.

6.3 Đánh giá hạn chế và hướng phát triển tiếp theo

- Mô hình hiện tại chưa xét đến cấu trúc tuổi (*age-structured models*) và kích thước cá thể.
- Cần mở rộng mô hình sang mạng lưới nhiều hơn 2 loài (kết hợp cá xanh, cá yếu, sinh vật phù du và các loài chim di cư).
- Tích hợp các yếu tố môi trường ngẫu nhiên (*stochastic differential equations*) và tác động của biến đổi khí hậu trong các nghiên cứu mở rộng tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dean W. Ahrenholz. Population biology and life history of the north american menhadens, *Brevoortia* spp. *Marine Fisheries Review*, 53(4):3–19, 1991.

[2] Dean W. Ahrenholz, Walter R. Nelson, and Douglas S. Vaughan. Population and fishery characteristics of atlantic menhaden, *Brevoortia tyrannus*. *Fishery Bulletin*, 85(3):569–600, 1987.

[3] Kristen A. Anstead, Katie Drew, David Chagaris, Matthew Cieri, Amy M. Schueller, Jason E. McNamee, Amy Buchheister, Genevieve Nesslage, Michael J. Wilberg, Howard Townsend, et al. The path to an ecosystem approach for forage fish management: A case study of atlantic menhaden. *Frontiers in Marine Science*, 8:607657, 2021.

[4] Atlantic States Marine Fisheries Commission. Stock assessments (atlantic menhaden, striped bass). http://www.asmfc.org/fisheries-science/stock-assessments, 2022.

[5] Chesapeake Bay Foundation. Atlantic menhaden: The most important fish in the sea. https://www.cbf.org/about-the-bay/more-than-just-the-bay/chesapeake-wildlife/menhaden/, 2021.

[6] Chesapeake Bay Foundation. Striped bass (rockfish) in chesapeake bay. https://www.cbf.org/about-the-bay/more-than-just-the-bay/chesapeake-wildlife/rockfish/, 2021.

[7] Chesapeake Bay Program. Atlantic menhaden (*Brevoortia tyrannus*) field guide. https://www.chesapeakebay.net/discover/field-guide/entry/atlantic_menhaden, 2021.

[8] Chesapeake Bay Program. Striped bass (*Morone saxatilis*) field guide. https://www.chesapeakebay.net/discover/field-guide/entry/striped_bass, 2021.

[9] Katie Drew, Matthew Cieri, Amy M. Schueller, Amy Buchheister, David Chagaris, Genevieve Nesslage, Michael J. Wilberg, Howard Townsend, and Kristen A. Anstead. Balancing model complexity, data requirements, and management objectives in developing ecological reference points for atlantic menhaden. *Frontiers in Marine Science*, 8:608059, 2021.

[10] Julia K. Ellis. *Diet of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus, in Chesapeake Bay and adjacent waters*. PhD thesis, College of William and Mary, 2003.

[11] Carmel Finley. *All the Fish in the Sea: Maximum Sustainable Yield and the Failure of Fisheries Management*. University of Chicago Press, 2011.

[12] A. K. Glass and B. D. Watts. Osprey diet composition and quality in high- and low-salinity areas of lower chesapeake bay. *Journal of Raptor Research*, 43(1):27–36, 2009.

[13] Juliana M. Harding and Roger Mann. Diet and habitat use by bluefish, *Pomatomus saltatrix*, in a chesapeake bay estuary. *Environmental Biology of Fishes*, 60(4):401–409, 2001.

[14] Daniel Howell, Amy M. Schueller, Jacob W. Bentley, Amy Buchheister, David Chagaris, Matthew Cieri, Katie Drew, Christopher P. Lynam, Debbi Pedreschi, David Reid, et al. Combining ecosystem and single-species modeling to provide ecosystem-based fisheries management advice within current management systems. *Frontiers in Marine Science*, 7:607831, 2021.

[15] Fred C. June and Frank T. Carlson. Food of young atlantic menhaden, *Brevoortia tyrannus*, in relation to metamorphosis. *Fishery Bulletin*, 68(3):493–512, 1970.

[16] John V. Merriner. Food habits of the weakfish, *Cynoscion regalis*, in north carolina waters. *Chesapeake Science*, 16(1):74–76, 1975.

[17] Northeast Fisheries Science Center. 66th northeast regional stock assessment workshop (66th saw) assessment report. Technical report, Northeast Fisheries Science Center Reference Document 19-08, US Dept of Commerce, 2019.

[18] Iordanka N. Panayotova, John Herrmann, and Nathan Kolling. Bioeconomic analysis of harvesting within a predator–prey system: A case study in the chesapeake bay fisheries. *Ecological Modelling*, 480:110330, 2023.

[19] Stuart L. Pimm and John H. Lawton. On feeding on more than one trophic level. *Nature*, 275(5680):542–544, 1978.

[20] Dave Ress. Chesapeake bay's menhaden catch cut drastically, along with omega protein quota. Daily Press, 2020.

[21] Kimberly A. Robichaud-LeBlanc, Simon C. Courtenay, and Andrea Locke. Spawning and early life history of a northern population of striped bass (*Morone saxatilis*) in the miramichi river estuary, gulf of st. lawrence. *Canadian Journal of Zoology*, 74(9):1645–1655, 1996.

[22] Milner B. Schaefer. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. *Inter-American Tropical Tuna Commission Bulletin*, 1(2):23–56, 1954.

[23] SEDAR. SEDAR 69 – atlantic menhaden benchmark stock assessment report. Technical report, SEDAR, North Charleston SC, 2020.

[24] Southwick Associates. The economic contributions of recreational and commercial striped bass fishing. Technical report, McGraw Center for Conservation Leadership, 2019.

[25] J. F. Walter and H. M. Austin. Diet composition of large striped bass (*Morone saxatilis*) in chesapeake bay. *Fishery Bulletin*, 101(2):414–423, 2003.