

Пример 1:

В комплекте из 10 резисторов 4 бракованных. Какова вероятность, что среди трех наудачу выбранных резисторов будут:

- а) 2 исправных;
- б) все исправные?

Пример 1:

В комплекте из 10 резисторов 4 бракованных. Какова вероятность, что среди трех наудачу выбранных резисторов будут:


а) 2 исправных;

б) все исправные?

Решение:

а) А - из 3-х выбранных резисторов 2 исправных (и 1 неисправный)

$$P(A) = \frac{m_1}{n}$$


$$n = C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{\overset{4}{8} \cdot \overset{3}{8} \cdot 10}{\cancel{2} \cdot \cancel{3}} = 120$$



и



$$m_1 = C_6^2 \cdot C_4^1 = \frac{6!}{2! \cdot 4!} \cdot 4 = \frac{5 \cdot 6}{\cancel{2}} \cdot \cancel{4}^2 = 60$$

$$P(A) = \frac{60}{120} = 0,5$$

б) В - из 3-х выбранных резисторов 3 исправных

$$P(B) = \frac{m_2}{n}$$



и



$$m_2 = C_6^3 \cdot C_4^0 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot 1 = \frac{4 \cdot 5 \cdot \cancel{6}}{\cancel{2} \cdot \cancel{3}} = 20$$

$$P(B) = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} = 0,167$$

Пример 2:

В лифт на первом этаже девятиэтажного дома зашли 4 человека, каждый из которых может выйти на любом этаже со второго по девятый. Какова вероятность, что все зашедшие в лифт люди выйдут:

- а) на одном этаже;
- б) на разных этажах?

Пример 2:

В лифт на первом этаже девятиэтажного дома зашли 4 человека, каждый из которых может выйти на любом этаже со второго по девятый. Какова вероятность, что все зашедшие в лифт люди выйдут:

- а) на одном этаже;
- б) на разных этажах?

Решение:

а) А - все люди выйдут на одном этаже

$$P(A) = \frac{m_1}{n}$$

$$n = 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 4096$$

$$m_1 = 8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 8$$

$$P(A) = \frac{8}{4096} \approx 0,002$$

б) В - все люди выйдут на разных этажах

$$P(B) = \frac{m_2}{n}$$

$$m_2 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$$

$$P(B) = \frac{1680}{4096} \approx 0,41$$

Пример 3:

Студент знает 20 из 30 вопросов. Зачет считается сданным, если он ответит не менее чем на 3 из 4 заданных вопросов. Найти вероятность того, что студент сдаст зачет.


Пример 3:

Студент знает 20 из 30 вопросов. Зачет считается сданным, если он ответит не менее чем на 3 из 4 заданных вопросов. Найти вероятность того, что студент сдаст зачет.

Решение:

A - студент сдаст зачет (знает 3 и 1 не знает или знает 4 ответа на вопросы)

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

 $n = C_{30}^4 = \frac{30!}{4! \cdot 26!} = \frac{27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 27405$



$$m = C_{20}^3 \cdot C_{10}^1 + C_{20}^4 \cdot C_{10}^0 = \frac{20!}{3! \cdot 17!} \cdot 10 + \frac{20!}{4! \cdot 16!} \cdot 1 = \frac{18 \cdot 19 \cdot 20}{2 \cdot 3} \cdot 10 + \frac{17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 16245$$

$$P(A) = \frac{16245}{27405} \approx 0,59$$

Физкультура



Философия



Теория
вероятности



Условная вероятность

$P(A)$ – вероятность наступления события A

Условная вероятность $P(A|B)$ – вероятность наступления события A при условии, что в опыте произошло событие B

Примеры:

A – на небе тучи

B – пойдет дождь

$$P(A) = 0.8$$

$$P(B) = 0.5$$

$$P(B|A) = ?$$



Условная вероятность

$P(A)$ – вероятность наступления события A

Условная вероятность $P(A|B)$ – вероятность наступления события A при условии, что в опыте произошло событие B

Примеры:

A – выпадение четного числа очков на кубике при одном бросании

B – выпадение нечетного числа очков

$$P(B|A) = ?$$

C – выпадение 6 очков на кубике при одном бросании

D – выпадение четного числа очков

$$P(D|C) = ?$$



Условная вероятность

$P(A)$ – вероятность наступления события A

Условная вероятность $P(A|B)$ – вероятность наступления события A при условии, что в опыте произошло событие B

Примеры:

A – выпадение четного числа очков на кубике при одном бросании

B – выпадение нечетного числа очков

$P(B|A) = 0$, события A и B несовместны

C – выпадение 6 очков на кубике при одном бросании

D – выпадение четного числа очков

$P(D|C) = 1$



Условная вероятность

Примеры:

A – выпадение четного числа очков на кубике при одном бросании

B – выпадение нечетного числа очков на кубике при одном бросании

C – выпадение более 3 очков

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

$$P(C) = 1/2$$

$$P(C|A) = 2/3$$

$$P(C|B) = 1/3$$

Условная вероятность

$$P(B|A) = \frac{N(AB)}{N(A)} = \frac{N(AB)/N}{N(A)/N} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$N(AB)$ – число исходов, благоприятствующих совместному осуществлению A и B ,
 $N(A)$ - число исходов, благоприятствующих осуществлению A

Условной вероятностью события B при условии A называется отношение вероятности совместного появления событий A и B к вероятности события A :

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(A) \neq 0$$

Условная вероятность. Свойства

При фиксированном событии $A \subset F$, $P(B|A)$ является функцией события $A \subset F$. $P(B|A)$ удовлетворяет всем аксиомам вероятности A1–A3, следовательно, является вероятностью.

1) $P(B|A) \geq 0$ – следует из определения условной вероятности;

2) $P(\Omega | A) = 1$, так как $P(\Omega | A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$

Условная вероятность. Свойства

3) Пусть $\{B_n\}$ – последовательность попарно несовместных событий.

Тогда

$$P(\sum B_n | A) = \frac{P((\cup B_n) \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\cup (B_n \cap A))}{P(A)} = \sum \frac{P(B_n \cap A)}{P(A)} = \sum P(B_n | A)$$

Условная вероятность. Свойства

- $P(B/A) = 1$, если $A \subseteq B$;
- $P(B/A) = 0$, если A и B несовместны;
- $P(A/A) = P(\bar{A}/\bar{A}) = 1$;
- $P(\bar{A}/A) = P(A/\bar{A}) = 0$.

Условная вероятность. Свойства

Пример: При трехкратном подбрасывании монеты выпало два герба – событие A . Определить условную вероятность того, что при втором подбрасывании монеты выпал герб – событие B .

Всего при 3 подбрасываниях $N = 2^3 = 8$ элементарных исходов
 $\Omega = \{ ГГГ, ГГР, ГРГ, ГРР, РГГ, РГР, РРГ, РРР \}$

$A = \{ ГГР, ГРГ, РГГ \}; \quad N(A) = 3;$

$AB = \{ ГГР, РГГ \}; \quad N(AB) = 2$

$P(AB) = N(AB) / N = 2/8 = 1/4; \quad P(A) = N(A) / N = 3/8;$

$P(B|A) = P(AB) / P(A) = 2/3;$

Формула умножения вероятностей

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(A) \neq 0$$

$$P(AB) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$$

Формула умножения вероятностей (для конечного числа событий)

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * \dots * P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

Формула умножения вероятностей

Пример:

Имеется 6 карточек, на которых написаны 3 буквы «а», 2 буквы «н», и одна буква «с». Карточки перетасовываются и последовательно кладутся в ряд. Найти вероятность того, что получится слово «ананас».

$A = \{ \text{получилось слово «ананас»} \};$

$A_1 = \{ \text{первая буква «а»} \}; \quad A_2 = \{ \text{вторая буква «н»} \}$

$A_3 = \{ \text{третья буква «а»} \}; \quad A_4 = \{ \text{четвертая буква «н»} \}$

$A_5 = \{ \text{пятая буква «а»} \}; \quad A_6 = \{ \text{шестая буква «с»} \}$

Формула умножения вероятностей

Пример:

Имеется 6 карточек, на которых написаны 3 буквы «а», 2 буквы «н», и одна буква «с». Карточки перетасовываются и последовательно кладутся в ряд. Найти вероятность того, что получится слово «ананас».

$A = \{ \text{получилось слово «ананас»} \};$

$A_1 = \{ \text{первая буква «а»} \}; \quad A_2 = \{ \text{вторая буква «н»} \}$

$A_3 = \{ \text{третья буква «а»} \}; \quad A_4 = \{ \text{четвертая буква «н»} \}$

$A_5 = \{ \text{пятая буква «а»} \}; \quad A_6 = \{ \text{шестая буква «с»} \}$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 * A_2 * A_3 * A_4 * A_5 * A_6) = \\ &= P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 A_2) * P(A_4|A_1 A_2 A_3) * P(A_5|A_1 A_2 A_3 A_4) * P(A_6|A_1 A_2 A_3 A_4 A_5) \\ &= 3/6 * 2/5 * 2/4 * 1/3 * 2/5 * 1/2 * 1/1 = \mathbf{1/60} = 0,01667 \end{aligned}$$

$$P(A_1) = 3/6;$$

$$P(A_2|A_1) = 2/5;$$

$$P(A_3|A_1 A_2) = 2/4;$$

$$P(A_4|A_1 A_2 A_3) = 1/3;$$

$$P(A_5|A_1 A_2 A_3 A_4) = 1/2;$$

$$P(A_6|A_1 A_2 A_3 A_4 A_5) = 1/1$$

Формула умножения вероятностей

Пример:

В коробке 12 электролампочек, среди которых 4 бракованные, неотличимые по виду от доброкачественных. Некто наугад берет лампочку, ввинчивает ее в патрон и включает ток. Бракованная лампочка сразу же перегорает, она выбрасывается и берется следующая. Действие повторяется до тех пор, пока не будет гореть лампочка. Найти вероятность того, что будет выброшено не более двух электролампочек (событие A).

Формула умножения вероятностей

Пример:

В коробке 12 электролампочек, среди которых 4 бракованные, неотличимые по виду от доброкачественных. Некто наугад берет лампочку, ввинчивает ее в патрон и включает ток. Бракованная лампочка сразу же перегорает, она выбрасывается и берется следующая. Действие повторяется до тех пор, пока не будет гореть лампочка. Найти вероятность того, что будет выброшено не более двух электролампочек (событие A).

A_i – i -тая лампочка доброкачественная;

$$A = A_1 + \bar{A}_1 * A_2 + \bar{A}_1 * \bar{A}_2 * A_3$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 + \bar{A}_1 * A_2 + \bar{A}_1 * \bar{A}_2 * A_3) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 * A_2) + P(\bar{A}_1 * \bar{A}_2 * A_3) = \\ &= P(A_1) + P(\bar{A}_1) * P(A_2 | \bar{A}_1) + P(\bar{A}_1) * P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) * P(A_3 | \bar{A}_1 * \bar{A}_2) = \end{aligned}$$

$$= 8 / 12 + 4 / 12 * 8 / 11 + 4 / 12 * 3 / 11 * 8 / 10 = 54 / 55 \approx \mathbf{0,982}$$

Независимые события

События A и B называются **независимыми**, если

$$P(AB) = P(A) * P(B), \text{ то есть } P(B|A) = P(B)$$

Формула умножения вероятностей (для конечного числа событий)

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * \dots * P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$



Полная вероятность


Предположим, что в результате испытания событие A может произойти одновременно с одним из попарно независимых событий $H_1, H_2 \dots H_n$, составляющих полную группу.

Тогда вероятность события A определяется **формулой полной вероятности**:

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(H_k) * P(A|H_k)$$

События $H_1, H_2 \dots H_n$ называются гипотезами и удовлетворяют условию

$$\sum_{k=1}^n P(H_k) = 1$$



Полная вероятность

Пример: в кассе продается 70 билетов лотереи «Один из ста» и 30 билетов «Три из пятидесяти». Какова вероятность выиграть в лотерею, если купить только 1 билет?

А – выигрыш в лотерею

H_1 – купить билет лотереи «Один из ста»

H_2 – купить билет лотереи «Три из пятидесяти»

Полная вероятность

Пример: в кассе продается 70 билетов лотереи «Один из ста» и 30 билетов «Три из пятидесяти». Какова вероятность выиграть в лотерею, если купить только 1 билет?

A – выигрыш в лотерею

H_1 – купить билет лотереи «Один из ста»

H_2 – купить билет лотереи «Три из пятидесяти»

$$P(H_1) = 70/100 = 0.7$$

$$P(H_2) = 30/100 = 0.3$$

$$P(A|H_1) = 1/100 = 0.01$$

$$P(A|H_2) = 3/50 = 0.06$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) * P(A|H_1) + P(H_2) * P(A|H_2) = \\ &= 0.7 * 0.01 + 0.3 * 0.06 = 0.025 \end{aligned}$$

Полная вероятность

A – выигрыш в лотерею

H₁ – купить билет лотереи «Один из ста»

H₂ – купить билет лотереи «Три из пятидесяти»

} гипотезы

априорные
(доопытные)
вероятности

$$P(H_1) = 70/100 = 0.7$$

$$P(H_2) = 30/100 = 0.3$$

$$P(A|H_1) = 1/100 = 0.01$$

$$P(A|H_2) = 3/50 = 0.06$$


условные
вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) * P(A|H_1) + P(H_2) * P(A|H_2) = \\ &= 0.7 * 0.01 + 0.3 * 0.06 = 0.025 \end{aligned}$$

Полная вероятность

Пример: Команда из четырех студентов сдает совместный проект. Зачет по проекту зависит от защиты, причем вызвать на защиту проекта могут любого студента из команды. Первый студент знает содержание проекта на 100 %, второй и третий – на 50%, а четвертый – на 2%. Какова вероятность, что проект будет сдан?

Полная вероятность



$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = P(H_4) = 0.25$$

$$P(A|H_1) = 1$$

$$P(A|H_2) = 0.5$$

$$P(A|H_3) = 0.5$$

$$P(A|H_4) = 0.02$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) * P(A|H_1) + P(H_2) * P(A|H_2) + \\ &\quad + P(H_3) * P(A|H_3) + P(H_4) * P(A|H_4) = \\ &0.25 * 1 + 0.25 * 0.5 + 0.25 * 0.5 + 0.25 * 0.02 = \mathbf{0.505} \end{aligned}$$