

				Equipo: 7		Observaciones
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	
Prueba exacta de Fisher	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	2	No mencionan si es tamaño es adecuado para una prueba de Fisher.
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher debido al tamaño de dos muestras dicotómicas independientes , las que pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .				
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes o que llevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2			
		Seleccionan la prueba exacta de Fisher, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no es adecuada.	1			
		No responden o no seleccionan la prueba exacta de Fisher.	0			
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	
		Específicamente para la prueba exacta de Fisher: hipótesis no paramétricas sobre la independencia/dependencia de dos variables dicotómicas .				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2			
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
	Prueba estadística	Escriben código R-ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	
		Específicamente ejecutan una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.				
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.	2			
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0			
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	3	
		Específicamente concluyen, en base a una prueba exacta de Fisher realizada correctamente, sobre la independencia/dependencia de las dos variables dicotómicas en estudio.				
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba exacta de Fisher realizada.	2			
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			
Prueba de McNemar	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	3	
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar porque las dos muestras dicotómicas son pareadas y pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .				
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras están apareadas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2			
		Seleccionan la prueba de McNemar, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no es adecuada.	1			
		No responden o no seleccionan la prueba de McNemar.	0			
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	
		Específicamente para la prueba de McNemar: hipótesis no paramétricas sobre cambios en las proporciones de dos variables dicotómicas.				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2			
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de Fisher o Q de Cochran).	1			
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
	Prueba estadística	Escriben código R-ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	
		Específicamente ejecutan una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.				
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.	2			
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o Fisher o Q de Cochran).	1			
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0			
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	3	
		Específicamente concluyen, en base a una prueba de McNemar realizada correctamente , sobre el cambio de frecuencias en las variables dicotómicas en estudio.				
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba de McNemar realizada.	2			
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o exacta de Fisher o Q de Cochran).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			

				Equipo: 7		Observaciones
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	
Prueba chi-cuadrado	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	4	4	3	No mencionan el subtipo de chi-cuadrado de Pearson.
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categorica con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn, eligiendo y justificando apropiadamente el subtipo entre independencia, homogeneidad o bondad de ajuste.				
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categorica con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado, que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn.				
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes, que no son muy pequeñas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2xn).				
		Seleccionan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.				
		No responden o no seleccionan la prueba exacta chi-cuadrado de Pearson.	0			
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	
		Específicamente para la prueba chi-cuadrado de Pearson: hipótesis no paramétricas sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categorica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica.				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas adecuadas para la prueba chi-cuadrado de Pearson sobre las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categorica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica, aunque el subtipo (la independencia, homogeneidad o bondad de ajuste) es ambiguo o son genéricas (podrían ser las hipótesis de otra prueba con variables categoricas).				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).				
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).				
	Prueba estadística	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, omnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	
		Específicamente ejecutan una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.				
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.				
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	1	Entregan conclusiones sobre la prueba, pero no mencionan que no necesitan realizar un procedimiento post-hoc.
		Específicamente concluyen, en base una prueba chi-cuadrado de Pearson realizada correctamente , sobre el sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de la variable categorica comparadas en los posibles valores de la variable dicotómica. Reconocen que no necesitan un procedimiento post-hoc.				
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson realizada, reconociendo que no necesitan un procedimiento post-hoc.				
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).				
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.				
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			

Ejercicio práctico n° 4

				Equipo:	7	
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
Prueba Q de Cochran	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	2	La redacción no deja explícito si las muestras son pareadas, dicen que hay 50 muestras por estrategia publicitaria pero no si estas provienen de las mismas personas encuestadas.
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran porque tienen más de dos mediciones de una variable dicotómica , generando tres o más muestras apareadas de éxitos/fracasos (1/0).				
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras están apareadas o que conllevan a una tabla de unos y ceros).	2			
		Seleccionan la prueba Q de Cochran, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no es adecuada.	1			
		No responden o no seleccionan la prueba Q de Cochran.	0			
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	
		Específicamente para la prueba Q de Cochran: hipótesis no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos entre más de dos muestras apareadas .				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos en muestras apareadas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2			
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0			
	Procedimiento ómnibus	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	
		Específicamente ejecutan una prueba de Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.				
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.	2			
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0			
	Procedimiento post-hoc	Escriben código R -ordenado, bien indentado, sin sentencias espurias y bien comentado- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	0	No realizan prueba post-hoc luego de la prueba de Q de Cochran o mencionan que no era necesario.
		Específicamente ejecutan un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones); o bien argumentan de manera correcta que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc por los resultados obtenidos en la prueba ómnibus.				
		Escriben código R que realiza sin errores un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones); o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	2			
		Escriben código R que realiza un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples adecuado para datos de frecuencias; o bien señalan que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	1			
		No realizan un procedimiento post hoc o este está muy incompleto o equivocado; o bien no identifican que no corresponde efectuar dicho procedimiento, aplicando uno de forma espuria.	0			
	Conclusiones	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	2	Luego de identificar que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, no mencionan que no es necesario realizar post-hoc.
		Específicamente: - concluyen, en base a una prueba Q de Cochran realizada correctamente , sobre la igualdad o diferencia tipo ómnibus en las proporciones de éxitos entre todas las muestras apareadas; - luego identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples con pruebas de McNemar ejecutado correctamente; o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.				
		Entregan una conclusión ómnibus correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba Q de Cochran realizada, e identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples con pruebas de McNemar; o bien indican correctamente que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	2			
		Entregan una conclusión ómnibus a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1			
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	0	Hay más de tres errores de ortografía.
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0			
	Extras	En cada pregunta reportan explícitamente el estadístico y p-valor, ómnibus y post-hoc si corresponde, con el formato enseñado.	2	2	1	
		Reportan explícitamente el estadístico y p-valor, al menos el ómnibus, en al menos dos preguntas.	1			
	SUMA				56	46
DESCUENTOS					0	
BONIFICACIÓN					1	
PUNTUACIÓN FINAL					47	
NOTA				7.0	5.8	