



design:
Dielle



na najbolji način

D.O.O GEBI

24220 Čantavir, Maršala Tita 46
Republika Srbija
Tel.: (+381)24/782-525,
Fax.:(+381)24/782-526
email.: office@gebi.rs
www.gebi.rs






na najbolji način

PROGRAM ZA SVINJE





ENERGOPIG, -PIGZAL, -START PREMIUM, -START, -GROVER, -TOV I, -TOV II, -TOV III, -FERT, FERT DRY



PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI:

Utrošak hrane EnergoPig	0,5-1 kg/prase
Utrošak hrane EnergoPigzal	najmanje 3 kg-prase
Utrošak hrane Energostart Premium *	5 kg/prase
Utrošak hrane Energostart *	12 kg/prase
Utrošak hrane Energrover	8 kg/prase

*EnergoStart Premium ili EnergoStart – može se koristiti samo jedna smeša (u količini od 17kg)

Potpune smeše za prasadi, svinje u tovu, krmače dojare i nerastove, suprasne krmače i nazimice

ENERGOFEED program za uzgoj svinja obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama proizvodnje, od prasadi, svinja u tovu, krmača i nerastova. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izbalansirane visokokvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa.

ENERGOPIG	Potpuna smeša za prihranjuvanje prasadi – PREDSTARTER
ENERGOPIGZAL	Potpuna smeša za prasad 3-5 dana pred zalučenje i 15 dana nakon zalučenja

EnergoStart Premium	Specijalna potpuna smeša za odbijanje prasadi I faza ,do 15 kg (sa probiotikom)
EnergoStart	Potpuna smeša za uzgoj prasadi I faza ,do 15 kg ISHRANA PO VOLJI!
EnerGrover	Potpuna smeša za uzgoj prasadi II faza, do 25 kg
EneroTov I	Potpuna smeša za tov svinja I, od 25 do 60 kg
EneroTov II	Potpuna smeša za tov svinja II, od 60 kg do 100 kg
EneroTov III	Potpuna smeša za tov svinja III, od 100 kg do 120 kg
EneroFert	Potpuna smeša za krmače dojare i neraste
EneroFert Dry	Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice

REZULTATI KOJI SE POSTIŽU SA NAŠOM PREPORUKOM:

težina prasadi pri zalučenju	8-11 kg
starost prasadi na kraju odgoja	70 dana
prosečna težina po prasetu	25 kg
utrošak hrane po prasetu	28 kg
prosečan dnevni prirast	450 g
konverzija hrane za kg prirasta kod prasadi	1,75 kg
utrošak hrane od 25 kg do 60 kg telesne težine	100 kg/tov I
utrošak hrane od 60 kg do 105 kg telesne težine	140 kg/tov II
konverzija hranena za kg prirasta u tovu	2,7-3 kg



UNI P-GROVER, UNI S I, UNI S II, UNI S III, UNI K, UNI SK

Potpune smeše za prasad, svinje u tovu, krmače dojare i nerastove, suprasne krmače i nazimice



UNI program za uzgoj svinja obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama proizvodnje, od prasadi, svinja u tovu, krmača i nerastova. Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izbalansirane visokokvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa.

UNI P-Grover	Potpuna smeša za uzgoj prasadi II ,faza do 25 kg
UNI S I	Potpuna smeša za tov svinja I, od 25 do 60 kg
UNI S II	Potpuna smeša za tov svinja II, od 60 kg do 100 kg
UNI S III	Potpuna smeša za tov svinja III, od 100 kg do 120 kg
UNI K	Potpuna smeša za krmače dojare i neraste
UNI SK	Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice

Pakovanje:

10, 20, 40 kg i u rinfuzi

PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI:

Utrošak hrane EnergoPig	0,5-1 kg/prase
Utrošak hrane EnergoPigzal	najmanje 3 kg-prase
Utrošak hrane Energostart Premium *	5 kg/prase
Utrošak hrane Energostart *	12 kg/prase
Utrošak hrane UNI P Grover	8 -10kg/prase

*EnergoStart Premium ili EnergoStart – može se koristiti samo jedna smeša (u količini od 17kg)

REZULTATI KOJI SE POSTIŽU SA NAŠOM PREPORUKOM:

utrošak hrane od 25 kg do 60 kg telesne težine	110 kg/tov I
utrošak hrane od 60 kg do 105 kg telesne težine	150 kg/tov II
konverzija hranena za kg prirasta u tovu	3-3,3 kg



ENERGO PIGZAL

Potpuna smeša za prasad u fazi zalučenja

- USPEŠNO ZALUČENJE BEZ POJAVE EDEMSKE BOLESTI
- KONZUMACIJA PO VOLJI U PERIODU ZALUČENJA

- lako prihvatljiva i veoma ukusna hrana
- osigurava maksimalan dnevni prirast
- kontrola crevne flore
- visok nivo optimalno izbalansiranih aminokiselina
- enzimi za varenje i fitaza
- sa probiotikom



Pakovanje: 10 kg



ENERGOSTART SUPER 40%

Dopunska smeša za prasad



Pakovanje: 10 kg

Zašto koristiti GEBI Supere za prasad?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
- obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

ENERGOSTART SUPER je smeša namenjena za ishranu prasadi od 2. nedelje starosti do postizanja težine od 25 kg. Pripremljena smeša obezbeđuje izuzetnu konverziju hrane, kratak period tova, lepu i živahnu prasad, spremnu za tov. Predloge sastavljanja smeša sa **ENERGOSTART SUPER**-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoStart 20% za prasad do 15 kg					
	I	kg*	II	kg*	III	kg*
Kukuruz	45	13	55	16	65	19
Pšenica			10	3		
Ječam	20	6				
EnergoStart SUPER 40%	35	10	35	10	35	10
Ukupno	100 %	29 kg	100 %	29 kg	100 %	29 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg **ENERGOSTART SUPER**-a

Predlog mešanja:

Hranivo	EnerGrover 18% za prasad od 15 do 25 kg					
	I	kg*	II	kg*	III	kg*
Kukuruz	45	15	60	20	70	23
Pšenica			10	3		
Ječam	25	8				
EnergoStart SUPER 40%	30	10	30	10	30	10
Ukupno	100 %	33 kg	100 %	33 kg	100 %	33 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg **ENERGOSTART SUPER**-a

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa **ENERGOSTART SUPER**-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smešu sa **ENERGOSTART SUPER**-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa **ENERGOSTART SUPER**-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



UNI SUPER P 40%

Dopunska smeša za prasad



Pakovanje: 10 kg

Zašto koristiti GEBI Supere za prasad?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorишćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
- obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Predlog mešanja:

Hranivo	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	45	13	55	16	65	19
Pšenica			10	3		
Ječam	20	6				
UNI SUPER P 40%	35	10	35	10	35	10
Ukupno	100 %	29 kg	100 %	29 kg	100 %	29 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg UNI SUPER P-a

Predlog mešanja:

Hranivo	UNI P Grover 18% za prasad od 15 do 25 kg					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	45	15	60	20	70	23
Pšenica			10	3		
Ječam	25	8				
UNI SUPER P 40%	30	10	30	10	30	10
Ukupno	100 %	33 kg	100 %	33 kg	100 %	33 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg UNI SUPER P-a

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnos 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



ENERGO START SUPER PLUS 41%



Pakovanje: 10, 20 kg

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdrava i lepa prasadi
- prasadi bez pojave proliva
- što manje gubitaka
- ujednačena prasadi
- visok dnevni prihrasti
- nizak utrošak hrane

Dopunska smeša za prasadi u odgoju

Zašto koristiti GEBI Supere za prasadi?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
- obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Uputstvo za upotrebu:

Kada se na 20-25% supera doda 80-75% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica), dobija se potpuna smeša za prasadi u odgoju do 30-35kg.
Preporuke mešanja pogledajte u tabeli.

Primeri startera za odgoj:

Sirovine, %	1	2	3	4	5	6
Kukuruz	42	42	30	28		75
Ječam	35		30	25	40	
Pšenica		35	20	25	40	
ENERGOSTART SUPER PLUS	23	23	20	22	20	25

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

- Pri prelasku sa prethodne smeša na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasadi grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

Dopunska smeša za prasad u odgoju

LAKO I JEDNOSTAVNO MEŠANJE!!

- samo 20% - 25% u smešama za ishranu prasadi
- optimalni odnos i nivo aminokiselina
- za ishranu prasadi po volji bez pojave proliva
- savršeno pripremljena prasad za tov
- dobro iskorišćavanje hrane
- manje amonijaka i štetnih gasova u objektu

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdrava i lepa prasad
- prasad bez pojave proliva
- što manje gubitaka
- ujednačena prasad
- visok dnevni prirasti
- nizak utrošak hrane

Pakovanje: 10 kg

Predlog mešanja:

Smeša za prasad od zalučenja do 15 ili 18* kg - STARTER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)
Kukuruz	55	50	60	75
Ječam	20	15		
Pšenica		10	15	
ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%	25	25	25	25

*- Prasad hraniti sa Starter smešom do težine prasadi od 15 ili 18 kg, u zavisnosti od željenog intenziteta porasta (ishranom prasadi do težine od 18 kg skraćuje se vreme tova)

Predlog mešanja:

Smeša za prasad od 15* kg do početka tova - GROVER

ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%

HRANIVO	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)	% (kg/100kg smeše)
Kukuruz	55	55	60	80
Ječam	25	15	20	
Pšenica		10		
ENERGOSTART SUPER PREMIUM 42%	20	20	20	20

* - Za kraći period tova preporučujemo prelazak na GROVER smešu sa 18 kg težine prasadi

** - Za kraći period tova preporučujemo ishranu prasadi GROVER smešom do 30 kg težine

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smešu sa ENERGOSTART SUPER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikrotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2,5-3,5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa ENERGOSTART SUPER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

SAVETI I PREPORUKE ZA ODGOJ ZDRAVE I LEPE PRASADI:

ISHRANA

Prasad na sisi:

Početi davati EnergoPIG već od 7. dana prasadima, 3-4 puta dnevno, po malo (po pola šake), kako bi prasad osetila miris hrane i navikavala se na čvrstu hranu.

Kada počne konzumacija hrane, prasadima davati veću količinu hrane. Posude sa hranom treba da su dostupne prasadima 24 sata dnevno. Ove posude je najbolje je postaviti u prostor gde su prasad, tako da krmača nema pristup.

Voda

Posudu sa vodom postaviti u blizini posude sa hranom i obezbediti da stalno imaju svežu vodu na raspolažanju.

Temperatura

Prasadima na sisi treba obezbediti toplu sredinu kako ne bi trošili energiju na zagrevanje nego da mogu sve da iskoriste za telesni razvoj. Prilikom rođenja bi temperatura trebala da je 35°C. Najbolje je da im se obezbediti sijalica koja će da ih greje.

Raspoređivanje prasadi

Prasad ravnomerno rasporediti na sise krmača, tako da se svaka koristi, jer će tako biti najveća proizvodnja mleka. Kod nazimica je naročito važno ovako da se radi jer nisu sve sise razvijene.

Kod krmača koje imaju manji broj prasadi treba prebaciti prasad iz legala gde ima više prasadi. Bitno je da su prasad sličnog uzrasta, maksimalno 2 dana razlike u starosti. Na ovaj način će se krmačino mleko iskoristiti na najbolji način i dobitće se najveći stepen prirosta i preživljavanja prasadi.

Kontrola težine

Kontrolisati telesnu masu prasadi prilikom rođenja. Poželjno je da telesna masa prasadi bude oko 1500 g. Od prasadi koja su ispod 1200g mogu se očekivati slabiji rezultati, a prasad ispod 1000g telesne mase slabije preživljavaju.

Zdravstvena zaštita

Preparate gvožđa dati prasadima najkasnije 3. dana posle prašenja. Njihove zalihe od rođenja se potroše do ovog perioda, a količina gvožđa koju dobijaju od krmača putem mleka, nije dovoljna. Danas već postoje preparati gvožđa koji se daju prasadima da konzumiraju nekoliko dana pa se u tom slučaju ne moraju davati ovi preparati putem injekcija.

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija...)

Najbolje higijenske uslove u prasilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekcionala sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

ISHRANA

Prasad u odgoju:

Zalučenje sproveсти pažljivo i voditi računa o dnevnoj konzumaciji hrane kod prasadi na dan zalučenja!

Od početka nuditi hranu po volji (ad libidum) – potpuna smeša ENERGOPIGZAL ili smeša proizvedena na gazdinstvu sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om za prasad uz dodatno umešavanje GEBICID-a i DIGESTOPLUS-a, kao dodatne preventive od digestivnih poremećaja i proliva. Prilikom uvođenja u ishranu smeš napravljene sa GEBI SUPEROM ili SAPLEMENTOM-om treba ga davati umešano sa EnergoPIG-om još 3-4 dana u odnosu u 50:50.

Ukoliko prasad nisu konzumirala čvrstu hranu u momentu zalučenja, preporučuje se obročno hranjenje prasadi posle zalučenja, u trajanju 7-10 dana.

Voda

Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće.

Smeštaj

Prasad bolje jedu hranu ukoliko je navlažena. Obezbediti dovoljno mesta za hranjenje prasadima, tako da bi na 4 praseta trebalo najmanje 1 mesto za hranjenje. Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi prasad lakše pronašao hranu.

Temperatura u početku odgoja treba da je oko 30°C, a kasnije se postepeno snižava do 22°C, na kraju odgoja.

Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.

Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.2-0.3 m² po prasetu.

Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekcionala sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite prasadi, kako u prasilištu, tako i u odgoju (vakcinacija protiv mikoplazme, cirko-virusnih infekcija...)

Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdrava i lepa prasad
- idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu
- prasad bez pojave proliva
- što manje gubitaka
- ujednačena prasad
- visok dnevni prirasti
- nizak utrošak hrane





Pakovanje: 10, 20 kg



Vaši proizvodni ciljevi:

- zdravi i lepi tovljenici
- idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu
- visoki dnevni prirasti
- što manje gubitaka
- ujednačeni tovljenici
- niska konverzija hrane (ispod 1:3)
- što kraći tov

ENERGOTOV SUPER 35%

Dopunska smeša za tov svinja

ENERGOTOV SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša za ishranu svinja u tovu koja omogućuje iskorišćavanje svih potencijala tovljenika ukoliko se pridržavate naših predloga pravljenja smeša. Urađena je po najsvremenijim recepturama što će se odraziti na Vaše proizvodne rezultate. Predloge sastavljanja smeša sa **ENERGOTOV SUPER**-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoTov I 16%					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	53	20	63	23	73	27
Pšenica			10	4		
Ječam	20	7				
EnergoTov SUPER 35%	27	10	27	10	27	10
Ukupno	100 %	37 kg	100 %	37 kg	100 %	37 kg

* - količina smeša koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOTOV SUPER-a

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoTov II 14%					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	55	27	70	35	80	40
Pšenica			10	5		
Ječam	25	13				
EnergoTov SUPER 35%	20	10	20	10	20	10
Ukupno	100 %	50 kg	100 %	50 kg	100 %	50 kg

* - količina smeša koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOTOV SUPER-a

Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:

- sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.



Pakovanje: 10 kg

Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:

- sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskoriščavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje visok dnevni priast i nisku konverziju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdravi i lepi tovljenici
- idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu
- visoki dnevni priasti
- što manje gubitaka
- ujednačeni tovljenici
- niska konverzija hrane (ispod 1:3)
- što kraći tov

UNI SUPER S 35%

Dopunska smeša za tov svinja

UNI SUPER S je visokokvalitetna dopunska smeša za ishranu svinja u tovu koja omogućuje iskoriščavanje svih potencijala tovljenika ukoliko se pridržavate naših predloga pravljenja smeša. Urađena je po najsvremenijim recepturama što će se odraziti na Vaše proizvodne rezultate. Predloge sastavljanja smeša sa **UNI SUPER S**-om možete videti u tabelama:

Predlog mešanja:

Hranivo	UNI S I 16%					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	53	20	63	23	73	27
Pšenica			10	4		
Ječam	20	7				
UNI SUPER S 35%	27	10	27	10	27	10
Ukupno	100 %	37 kg	100 %	37 kg	100 %	37 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg **UNI SUPER S**-a

Predlog mešanja:

Hranivo	UNI S II 14%					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	55	27	70	35	80	40
Pšenica			10	5		
Ječam	25	13				
UNI SUPER S 35%	20	10	20	10	20	10
Ukupno	100 %	50 kg	100 %	50 kg	100 %	50 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg **UNI SUPER S**-a

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

- U smešu dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivačista, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.





ENERGOTOV SUPER PLUS 36%



Pakovanje: 10, 20 kg

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdravi i lepi tovljenici
- visoki dnevni prirasti (preko 900 g/dan)
- što manje gubitaka
- ujednačeni tovljenici
- niska konverzija hrane (ispod 1:3)
- što kraći tov



Dopunska smeša za tovne svinje

Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskoriscavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- lako i jednostavno se meša, samo 15-20% u smeši
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- postiže se visok ideo mesa
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Uputstvo upotrebe:

Kada se na 20% supera doda 80% žitarica (kukuruz, pšenica, ječam) dobija se potpuna smeša za tov svinja I, od 30-35 kg do oko 70 kg. Kada se na 15% supera doda 85% žitarica (kukuruz, pšenica, ječam) dobija se potpuna smeša za tov svinja II, od oko 70 kg do 115 kg. Predloge mešanja možete pogledati u tabeli.

Predlog mešanja:

Primeri mešanja hrane za I fazu tova:

Sirovine, %	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kukuruz	50	40	30	10		79			
Ječam	15	20	25	35	40		25	20	
Pšenica	15	20	25	35	40		25	20	
Silirano zrno kukuruza						30	40	80	
ENERGOTOV SUPER PLUS	20	20	20	20	20	21	20	20	20

Predlog mešanja:

Primeri mešanja hrane za II fazu tova:

Sirovine, %	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kukuruz	50	40	30	10		84			
Ječam	20	25	30	40	45		30	20	
Pšenica	15	20	25	35	40		25	15	
Silirano zrno kukuruza						30	50	85	
ENERGOTOV SUPER PLUS	15	15	15	15	15	16	15	15	15

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

- U smeši dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.



Pakovanje: 10 kg

ENERGOTOV SUPER PREMIUM 37%

Dopunska smeša za tovne svinje

Zašto koristiti GEBI Supere za svinje?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- stimulise konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalijuma i mikroelemenata
- lako i jednostavno se meša, samo 15-20% u smeši
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- postiže se visok ideo mesa
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdravi i lepi tovljenici
- visoki dnevni prirasti (preko 900 g/dan)
- što manje gubitaka
- ujednačeni tovljenici
- niška konverzija hrane (ispod 1:3)
- što kraći tov

Uputstvo za upotrebu:

ENERGOTOV SUPER PREMIUM se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u tovu. U potpune smeše za svinje u I fazi tova (25-70kg) se stavlja u količini od 20% (20kg ENERGOTOV SUPER PREMIUM - a se dobro izmeša sa 80kg prekrupljenih žitarica). U II fazi tova (preko 70kg) se koristi u količini od 15% u potune smeše za tov svinja (15 kg ENERGOTOV SUPER PREMIUM - a se dobro izmeša sa 85kg prekrupljenih žitarica).

Predlog mešanja:

Predlog receptura za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu sa ENERGOTOV SUPER PREMIUM-om

I faza tova (25-70kg) *

Hranivo	%(kg/100kg smeša)	%(kg/100kg smeše)	%(kg/100kg smeša)	%(kg/100kg smeše)
Kukuruz	60	55	65	80
Ječam	20	15		
Pšenica		10	15	
ENERGOTOV SUPER PREMIUM	20	20	20	20

* Za kraći period tova preporučujemo prelazak na smešu za tov sa 30 kg težine prasadi

Predlog mešanja:

II faza tova (preko 70kg)

Hranivo	%(kg/100kg smeša)	%(kg/100kg smeše)	%(kg/100kg smeša)	%(kg/100kg smeše)
Kukuruz	60	55	65	85
Ječam	25	20		
Pšenica		10	20	
ENERGOTOV SUPER PREMIUM	15	15	15	15

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU SVINJA U TOVU:

- U smeši dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanju terapije infektivnih oboljenja
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

SAVETI I PREPORUKE ZA USPEŠAN I PROFITABILAN TOV SVINJA:

- Obezbediti laku dostupnost hrane tokom 24 sata, tako da se preporučuje da noću radi osvetljenje kako bi tovljenici lakše pronašli hrana.
- Preporučuje se korišćenje ovlažavanje hrane prilikom konzumacije (upotreba nipl-pojilica u hranilicama za suvo hranjenje)
- Ukoliko se koristi oprema za tečnu ishranu, redovno je čistiti
- Obezbediti dovoljno pojilica za tovljenike, najmanje da ima 1 pojilica na 12 tovljenika, koju bi trebalo postaviti na visinu od 40-60 cm
- Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperaturne oscilacije i prašina u vazduhu.
- Temperatura u početku tova treba da je oko 22°C a kasnije se postepeno snižava do 18°C, na kraju tova.
- Izbegavati prenaseljenost u štali, jer se tako narušava zdravstveno stanje i proizvodni rezultati. Treba obezbediti 0.40 m² po tovljeniku uzrasta 30-50 kg; 0.55 m² po tovljeniku uzrasta 50-85 kg; 0.70 m² po tovljeniku uzrasta 85-110 kg; 1.00 m² po tovljeniku uzrasta preko 110 kg
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite tovljenika, (vakcinacija, preventivne mere...)
- Najbolje higijenske uslove u tovilištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, prasad ulaze u čist i dezinfekovan objekat-tovilište!
- Poželjno je da postoji malo odeljenje gde se mogu izolovati bolesne životinje, tako da budu odvojene od zdravih.
- Prilikom isporuke na klanje voditi računa o tretiranim svinjama koja se moraju još zadržati u slučaju da su ranije tretirane lekovima.
- Poželjna je povratna informacija od klanice o % mesnatosti isporučenih svinja.





ENERGOFERT SUPER 35%

Dopunska smeša za priplodne svinje



Pakovanje: 10 kg

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoFert 16% za krmače dojare i nerastove					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	64	23	58	21	55	19,5
Pšenica					10	4
Pšen. stočno brašno	8	3	4	1	7	2,5
Ječam			10	4		
EnergoFert 35%	28	10	28	10	28	10
Ukupno	100 %	36 kg	100 %	36 kg	100 %	36 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOFERT SUPER-a

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoFert 14% za suprasne krmače i nazimice					
	I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	50	25	60	30	68	34
Pšenica			10	5		
Ječam	20	10				
Pšenično stočno brašno	10	5	10	5	12	6
EnergoFert SUPER 35%	20	10	20	10	20	10
Ukupno %/kg	100 %	50 kg	100 %	50 kg	100 %	50 kg

* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOFERT SUPER-a

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRMAČA:

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
- GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvi 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja

Zašto koristiti GEBI Supere za krmače?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svariljive sastojke
- sadrži visoke nivoe vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod nazimica
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorишćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdrave, plodne i lepe krmače
- 30 ili više zalučeno prasadi po krmači godišnje
- prasad na prašenju iznad 1200g
- dobra telesna kondicija krmača
- lako i brzo prašenje
- krmače dugog proizvodnog veka
- što manje gubitaka
- starost prvog pripusta 220-240 dana
- težina kod prvog pripusta 120-130 kg
- idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu



SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KRMAČA

SUPRASNE KRMAČE:

- Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20°C, kako bi se životinje osećale komforno
- Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu
- Obezbediti dovoljne količine vode. Ako se krmače drže u grupi, treba obezbediti bar 1 pojilicu na 4 krmače
- Kontrolisati telesnu kondiciju krmača
- Redovno kontrolisati konzumaciju - da li krmače sve pojedu iz hranilica. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krmača, kako bi i u prasilištu, tako i u odgoju bilo što manje problema sa prasadima (vakcinacija protiv parvovirusnih infekcija, E. Coli, klostridija...)
- Najbolje higijenske uslove u objektu za suprasne krmače možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!



KRMAČE U PRASILIŠTU:

- Pre uvođenja kramača u prasilište poželjno je da budu čiste, što se može postići pranjem ili tuširanjem
- Pre uvođenja krmača u objekat, potrebno je izvršiti temeljno čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta
- Obezbediti dovoljnu količinu sveže i čiste vode za piće. Poželjno je krmači dati dodatnu količinu vode i u korito (i pored postojeće pojilice), kako bi što više popila vode i nadoknadila izgubljenu tečnost od proteklog prašenja
- Obezbediti sredinu sa temperaturom 18-20°C, kako bi se životinje osećale komforno
- Obezbediti dovoljne količine svežeg vazduha, a da se izbegne preveliko strujanje vazduha (promaja), temperature oscilacije i prašina u vazduhu.
- Treba nadzirati prašenje, prasad odma postaviti na sisu kako bi što ranije posisala kolostrum
- Kontrolisati porodajnu težinu prasadi (trebalo bi da je masa prasadi iznad 1.2kg, a poželjno je da bude iznad 1.5kg)
- Prasadima obezbediti dodatnu grejalicu (grejnu ploču ili grejnu sijalicu), kako se ne bi prehladila prasad posle prašenja i da ne bi gubila energiju na zagrevanje
- Poželjno je ujednačiti legla, tako što se prasad od krmača sa većim leglom prebacuje kod krmača sa manjim leglima jer se na taj način postiže ravnomerniji rast prasadi i najbolja iskorijenost proizvedenog mleka krmače
- Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon urađenih navedenih postupaka, krmače ulaze u čist i dezinfekovan objekat!
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krmača, kako u čekalištu, tako i u prasilištu (sprečavanje upale vimena i materice...)

GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRMAČA

ISHRANA SUPRASNIH KRMAČA:

- Suprasnim krmačama davati 2-2.5 kg hrane dnevno. Nakon osemenjavanja treba da ostanu 3 dana u istom objektu
- Ukoliko krmače završe fazu dojenja u lošoj kondiciji, količinu hrane im povećati od 2.7 kg pa čak do preko 3kg na dana
- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda suprasnosti
- 2-7 dana pred prašenje krmačama davati oko 3.5 kg hrane, kako bi se lakše privikle na veću količinu hrane nakon prašenja
- 2 dana pred prašenje količinu hrane smanjiti na 2 kg
- Na sam dan prašenja je poželjno da krmača jede što manje hrane sa dodatkom pšeničnog stočnog brašna, kako bi se što lakše oprasila i kako bi se izbegli problemi sa zatvorom nakon prašenja koji prouzrokuje veće probleme, kao što su upala materice, vimena i smanjena ili čak prekinuta proizvodnja mleka

ISHRANA KRMAČA DOJARA:

- Nakon prašenja krmačama davati svaki dan po 0.5 – 1 kg više hrane, kako bi se što pre dostigla maksimalna konzumacija hrane
- Hrana za krmače dojare mora biti najboljeg kvaliteta
- Mlađe krmače treba da pojedu najmanje 5 kg hrane na dan a starije krmače da pojedu najmanje 6 kg hrane na dan
- Kako bi se obezbedio dovoljan unos hrane krmačama treba nuditi hranu 3-4 puta na dan i voditi računa da se hrana ne zadržava dugo u hranilicama, naročito u toplijem delu godine
- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
- GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja



Saplement

SAPLEMENT PREMIUM 10%



Pakovanje: 5,25 kg

Način upotrebe:

Saplement Premium 10% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu prasadi u količini od 10% (10 kg premiska se dobro izmeša sa 90 kg ostalih hraniva).

Za prasad preporučujemo stavljanje ekstru-diranih komponenti prilikompravljenja smeše.

U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT PREMIUM-om



DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE:

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50 Nakon ovog perioda koristiti smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2.5-3.5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smešu sa SAPLEMENT PREMIUM-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energonix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lisin, metionin, treonin), organski vezani selen, zakiseljivač, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

	Proteini	19,00 %	Vitamin A E-672	200.000 IU
	Lizin	3,80 %	Vitamin D3 E-671	20.000 IU
	Kalcijum	8,00 %	Vitamin E	1000 mg
	Fosfor	3,00 %	Enzimi:	

Enzimi:
Fitaza
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Predlog mešanja:

Primeri startera za zalučenje:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA SAČMA				
	STARTER - za zalučenje					STARTER - za zalučenje				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Kukuruz	43.65	44.35	21.35	66.65		44.35	45.05	21.85	67.55	
Ječam	25		25		37.05	25		25		36.95
Pšenica		25	25		36.5		25	25		37
Sojina Pogača GEBI	19.7	19	17	21.7	14.8					
Sojina Sačma GEBI						19	18.3	16.5	20.8	14.4
SAPLEMENT PREMIUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DigestoPlus	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
GebiCID	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
MIKOSTOP PLUS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Predlog mešanja:

Primeri startera za odgoj:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA SAČMA				
	STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg					STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	34.6	35.3	12.2	57.6		36.2	36.9	13.7	59.4	
Ječam	25		25		32	25		25		33
Pšenica		25	25		31.5		25	25		32
Sojina Pogača GEBI	30.4	29.7	27.8	32.4	26.5					
Sojina Sačma GEBI						28.8	28.1	26.3	30.6	25
SAPLEMENT PREMIUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Saplement

SAPLEMENT STARTER 4%

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad od 7 do 15 kg



Pakovanje: 2, 20 kg

Predlog mešanja:

Primeri startera za zalučenje:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA SAČMA				
	STARTER - za zalučenje					STARTER - za zalučenje				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	46,95	47,65	24,65	70,35		47,65	48,35	25,35	71,05	
Ječam	25		25		38,7	25		25		39,1
Pšenica		25	25		38,15		25	25		38,45
Sojina Pogača GEBI	22,4	21,7	19,7	24	17,5					
Sojina Sačma GEBI						21,7	21	19	23,3	16,8
SAPLEMENT STARTER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DigestoPlus	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
GebiCID	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MIKOSTOP PLUS	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*predložene smeše se mogu davati prasadima po volji u momentu zalučenja i narednih 10-15 dana se preporučuje davanje navedenih smeša sa navedenim dodacima

Predlog mešanja:

Primeri startera za odgoj:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA SAČMA				
	STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg					STARTER – posle faze zalučenja do oko 18 kg				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	40,6	41,3	18,2	63,6		42,2	42,9	19,7	65,4	
Ječam	25		25		35	25		25		36
Pšenica		25	25		34,5		25	25		35
Sojina Pogača GEBI	30,4	29,7	27,8	32,4	26,5					
Sojina Sačma GEBI						28,8	28,1	26,3	30,6	25
SAPLEMENT STARTER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Zašto koristiti GEBI Sapemente za prasad?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži probiotik
- ukusan je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
- idealan nivo u odnosu aminokiselina (lizin, metionin, treonin, triptofan), organski vezani selen, zakašćivač, probiotik, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
- obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT STARTER 4% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu prasadi uzrasta od 7 do 15 kg. U potunce smeše za prasad se stavlja u količini od 4% (4 kg premika se dobro izmeša sa 96 kg prekrupljenih žitarica i sojine sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu prasadi). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT STARTER-om. Preporučujemo upotrebu ekstrudiranih žitarica.

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE:

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smešu sa SAPLEMENT STARTER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50. Nakon ovog perioda koristiti smeš sa SAPLEMENT STARTER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2,5-3,5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smeš sa SAPLEMENT STARTER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Saplement

SAPLEMENT GROVER 4%

Vitaminsko - mineralni premiks za prasad u odgoju



Pakovanje: 4, 20 kg

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin), organski vezani selen, zakišeljivač, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini	9,00 %
Lizin	6,00 %
Kalcijum	15,70 %
Fosfor	3,70 %
Vitamini:	

Vitamin A E-672

60.000 IJ

Vitamin D3 E-671

50.000 IJ

Vitamin E

2500 mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza,
β-glukanaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Sapemente za prasad?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- ukus je i stimuliše konzumaciju hrane kod prasadi
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin i triptofan)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- povoljno utiče na razvoj digestivnog trakta
- obezbeđuje dobru pripremu prasadi za tov
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT GROVER 4% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu prasadi u odgoju, uzrasta od 15 do 30kg telesne mase ili od tri nedelje nakon alučenja pa do početka tova. U potpune smeše za prasad se stavlja u količini od 4% (4 kg premiska se dobro izmeša sa 96 kg prekrupljenih žitarica i sojine sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu prasadi). U tabeli možete videti naše prelogi sastavljanja potunih smeša za ishranu prasadi sa SAPLEMENT GROVER -om.

Predlog mešanja:

Primeri grovera za odgoj:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA SAČMA				
	GROVER – od 18 kg do 30 kg					GROVER – od 18 kg do 30 kg				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	44	44,8	21,7	67,1		45,6	46,3	23,1	68,8	
Ječam	25		25		37	25		25		37,4
Pšenica		25	25		36		25	25		37
Sojina Pogača GEBI	27	26,2	24,3	28,9	23					
Sojina Sačma GEBI						25,4	24,7	22,9	27,2	21,6
SAPLEMENT GROVER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU PRASADI OD PRAŠENJA DO STAVLJANJA U TOVILIŠTE

- Pri prelasku sa prethodne smeše na smeš sa SAPLEMENT GROVER-om, mešati još 3-4 dana u odnosu 50:50
- Nakon ovog perioda koristiti smeš sa SAPLEMENT GROVER-om po volji (ad libidum).
- Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.
- GEBICID (5-8 kg/t) i DIGESTOPLUS (2,5-3,5 kg/t) koristiti u situacijama kada se prasad grupišu iz više legala ili domaćinstava, pri prvim danima prelaska na smeš sa SAPLEMENT GROVER-om, pri pojavi poremećaja u varenju kod prasadi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje prasadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više prasilišta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja.

Saplement

SAPLEMENT UNI 3%



Pakovanje: 3, 25 kg

Predlog mešanja:

Predlog receptura za svinje u tovu

Sirovina	TOV I – 16% (25 – 70 kg)						TOV II – 14% (preko 70 kg)					
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	41.4	68.2	42.5	69.4	43.4	70.5	45.6	72.6	46.5	73.5	47.2	74.4
Ječam / Pšenica	30		30		30		30		30		30	
Sojina pogača GEBI – 42%	19.6	22.8					14.4	17.4				
Sojina sačma GEBI – 44%			18.5	21.6					13.5	16.5		
Sojina sačma 46%					17.6	20.5					12.8	15.6
Suncokretova sačma 33%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pšenično stočno brašno	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
SAPLEMENT UNI 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

DODATNE GEBI PREPORUKE :

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivačista, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

Vitaminsko - mineralni premiks za svinje u porastu i tovu

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, organski vezani selen, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	23,00 %
Fosfor	5,00 %
Vitamini:	
Vitamin A E-672	420.000 IJ
Vitamin D3 E-671	66.000 IJ
Vitamin E	6000 mg
Enzimi:	
Fitaza	+
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza).	+

Zašto koristiti GEBI Saplemente za svinje?

Zato što:

- sa GEBI sojinom pogačom ili sačmom i sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Način upotrebe:

SAPLEMENT UNI 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu. U potpune smeše za svinje u porastu u tovu, od 25 do 70kg se stavlja u količini od 3% (3 kg premiska se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili suncokretove sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu svinja). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT UNI-om.



Saplement



Pakovanje: 3, 25 kg

Način upotrebe:

SAPLEMENT TOV 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu. U potpune smeše za svinje u porasti u tovu, od 25 do 70kg se stavlja u količini od 3% (3 kg premiksa se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili suncokretove sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu svinja. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT TOV -om.

Predlog mešanja:

Predlog receptura za svinje u tovu

SIROVINA	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV I - 16,5% (25 – 70 kg)					TOV I - 16,5% (25 – 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	46	46,7	28,4		73,2	45,2	45,9	27,7		72,4
Ječam	30		25	41,7		30		25	41	
Pšenica		30	25	41			30	25	40,8	
Sojina pogača GEBI - 42%	18	17,3	15,6	12,3	20,8	15,8	15,1	13,3	10,2	18,6
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

SAPLEMENT TOV 3%

Vitaminsko - mineralni premiks za svinje u porastu i tovu

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lisin, metionin, treonin), organski vezani selen, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks..

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKS:

Proteini	10,00 %
Lizin	7,20 %
Kalcijum	19,50 %
Fosfor	3,00 %
Vitamini:	
Vitamin A E-672	420.000 IJ
Vitamin D3 E-671	66.000 IJ
Vitamin E	6000 mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za svinje?

Zato što:

- sa GEBI sojinom pogačom ili sačmom i sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorишćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

DODATNE GEBI PREPORUKE:

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA SAČMA 44%					GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV I – 16,5% (25 – 70 kg)					TOV I – 16,5% (25 – 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	47	47,6	29,3		74,3	46	46,7	28,4		73,4
Ječam	30		25	42		30		25	41,4	
Pšenica		30	25	41,5			30	25	41	
Sojina sačma GEBI – 44%	17	16,4	14,7	11,5	19,7	15	14,3	12,6	9,6	17,6
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV II – 14,5% (preko 70 kg)					TOV II – 14,5% (preko 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	51,9	52,6	25,4		79	51,1	51,8	24,6		78,3
Ječam	30		30	44,5		30		30	44	
Pšenica		30	30	44,8			30	30	44,4	
Sojina pogača GEBI - 42%	12,1	11,4	8,6	5,7	15	9,9	9,2	6,4	3,6	12,7
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA SAČMA 44%					GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV II – 14,5% (preko 70 kg)					TOV II – 14,5% (preko 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	52,5	53,2	25,9		79,9	51,6	52,3	25		79
Ječam	30		30	44,5		30		30	44,5	
Pšenica		30	30	45,1			30	30	44,1	
Sojina sačma GEBI – 44%	11,5	10,8	8,1	5,4	14,1	9,4	8,7	6	3,4	12
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Saplement

SAPLEMENT TOV PLUS 3%



Pakovanje: 3, 9 kg

Način upotrebe:

SAPLEMENT TOV PLUS 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu svinja u porastu i tovu. U potpune smeše za svinje u porastu u tovu, od 25 do 70kg se stavlja u količini od 3% (3 kg premiksa se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili suncokretovu sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu svinja). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT TOV PLUS -om.

Predlog mešanja:

Predlog receptura za svinje u tovu

SIROVINA	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV I - 16,5% (25 – 70 kg)					TOV I - 16,5% (25 – 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	46	46,7	28,4		73,2	45,2	45,9	27,7		72,4
Ječam	30		25	41,7		30		25	41	
Pšenica		30	25	41			30	25	40,8	
Sojina pogača GEBI - 42%	18	17,3	15,6	12,3	20,8	15,8	15,1	13,3	10,2	18,6
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT PLUS TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Vitaminsko - mineralni premiks za svinje u porastu i tovu

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin, triptofan), organski vezani selen, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini	12,00 %
Lizin	11,00 %
Kalcijum	19,50 %
Fosfor	3,00 %
Vitaminii:	
Vitamin A E-672	290.000 IU
Vitamin D3 E-671	51.000 IU
Vitamin E	2000 mg

Enzimi:

Fitaza + Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, d-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI


Saplemente za svinje?

Zato što:

- sa GEBI sojinom pogačom ili sačmom i sa Vašim žitaricama predstavlja idealnu kombinaciju
- stimuliše konzumaciju hrane kod svinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorишćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje visok dnevni prirast i nisku konverziju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

DODATNE GEBI PREPORUKE:

- U smeše dodati 5 kg/t GEBICID-a, kao stimulator crevne mikroflore i za poboljšano varenje hrane
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više odgajivališta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA SAČMA 44%					GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV I – 16,5% (25 – 70 kg)					TOV I – 16,5% (25 – 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	47	47,6	29,3		74,3	46	46,7	28,4		73,4
Ječam	30		25	42		30		25	41,4	
Pšenica		30	25	41,5			30	25	41	
Sojina sačma GEBI – 44%	17	16,4	14,7	11,5	19,7	15	14,3	12,6	9,6	17,6
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT PLUS TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA POGAČA					GEBI SOJINA POGAČA + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV II – 14,5% (preko 70 kg)					TOV II – 14,5% (preko 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	51,9	52,6	25,4		79	51,1	51,8	24,6		78,3
Ječam	30		30	44,5		30		30	44	
Pšenica		30	30	44,8			30	30	44,4	
Sojina pogača GEBI - 42%	12,1	11,4	8,6	5,7	15	9,9	9,2	6,4	3,6	12,7
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT PLUS TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

SIROVINA	GEBI SOJINA SAČMA 44%					GEBI SOJINA SAČMA 44% + SUNCOKRETOVA SAČMA				
	TOV II – 14,5% (preko 70 kg)					TOV II – 14,5% (preko 70 kg)				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	52,5	53,2	25,9		79,9	51,6	52,3	25		79
Ječam	30		30	44,5		30		30	44,5	
Pšenica		30	30	45,1			30	30	44,1	
Sojina sačma GEBI – 44%	11,5	10,8	8,1	5,4	14,1	9,4	8,7	6	3,4	12
Suncokretova sačma 33%						3	3	3	3	3
Pšenično Stoč. Brašno	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
SAPLEMENT PLUS TOV 3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Saplement

SAPLEMENT FERT 3%

Vitaminsko - mineralni premiks za priplodne svinje



Pakovanje: 3,25 kg

Način upotrebe:

SAPLEMENT FERT 3% se koristi za spravljanje potunih smeša za ishranu priplodnih krmača i nerastova.

U potpune smeše se stavlja u količini od 3% (3kg premnika se dobro izmeša sa 97 kg prekrupljenih žitarica, sojine ili sunokretove sačme i tako se dobija 100 kg kvalitetne smeše za ishranu krmača i nerastova). U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu svinja sa SAPLEMENT FERT - om.

SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hidrider), sintetičke aminokiseline (lizin, metionin, treonin), mikroelementi, vitamini, organski vezani selen, enzimi za varenje, fitaza, antioksidant, aroma, nosač za premiks.

HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Proteini	6,50	%
Lizin	1,50	%
Kalcijum	25,40	%
Fosfor	3,50	%
Vitaminii:		
Vitamin A E-672	500.000	IJ
Vitamin D3 E-671	66.000	IJ
Vitamin E	2.500	mg

Enzimi:

Fitaza +
Enzimi za varenje (celulaza, ksilanaza, β-glukonaza, α-amilaza, proteaza). +

Zašto koristiti GEBI Saplemente za priplodne svinje?

Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod nazimica
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- idealan nivo i odnos aminokiselina (lizin, metionin, treonin)
- sadrži enzime za poboljšano varenje hrane
- sadrži fitazu, koja poboljšava iskorišćavanje fosfora, kalcijuma i mikroelemenata
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

Vaši proizvodni ciljevi:

- zdrave, plodne i lepe krmače
- 30 ili više zalućene prasadi po krmači godišnje
- prasad na prašenju iznad 1200g
- dobra telesna kondicija krmača
- lako i brzo prašenje
- krmače dugog proizvodnog veka
- što manje gubitaka
- starost prvog priputa 220-240 dana
- težina kod prvog priputa 120-130 kg
- idealna smeša proizvedena na Vašem gazdinstvu



Predlog mešanja:

Primeri sastavljanja smeša za suprasne krmače:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA				GEBI SOJINA SAČMA			
	FERT 13 % - za suprasne				FERT 13 % - za suprasne			
	I %	II %	III %	IV %	I %	II %	III %	IV %
Kukuruz	45	45	66		45,3	46,2	67,3	
Ječam	25			37	25			37
Pšenica		25		37		25		37
Sojina Pogača GEBI 42	6	6	8	2				
Sojina Sačma GEBI 44					5,7	4,8	6,7	2
Suncokretova sačma	6	6	6	6	6	6	6	6
Pšenično Stočno Brašno	15	15	17	15	15	15	17	15
SAPLEMENT FERT	3	3	3	3	3	3	3	3

* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

Primeri sastavljanja smeša za krmače dojare:

SIROVINE	GEBI SOJINA POGAČA				GEBI SOJINA SAČMA			
	FERT 16% - za dojare				FERT 16% - za dojare			
	I %	II %	III %	IV %	I %	II %	III %	IV %
Kukuruz	46,5	47	65		47,5	48	66	
Ječam	20			36	20			37
Pšenica		20		35,5		20		35,5
Sojina Pogača GEBI 42	18,5	18	20	13,5				
Sojina Sačma GEBI 44					17,5	17	19	12,5
Suncokretova sačma	5	5	5	5	5	5	5	5
Pšenično Stočno Brašno	7	7	7	7	7	7	7	7
SAPLEMENT FERT	3	3	3	3	3	3	3	3

* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRMAČA:

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda dojenja
- GEBICID (4-6 kg/t) koristiti u hrani za krmače prvih 7 dana nakon prašenja, kako bi se izbegli poremećaji u varenju
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana nakon odbijanja prasadi zbog pregrupisavanja krmača i što bržeg uspešnog osemenjavanja

OSTALE SMEŠE IZ GEBI PROGRAMA ZA SVINJE:



ENERGOMIX START 1%

Vitaminsko – mineralni premiks za prasad



ENERGOMIX TOV 1%

Vitaminsko – mineralni premiks za tovne svinje



ENERGOMIX FERT 1%

Vitaminsko – mineralni premiks za priplodne svinje



Kompletan program odgoja prasadi, tova svinja i ishrane priplodnih svinja pojedinih hibrida, po zahtevu kupca.

VITAMINSKO MINERALNI PREMIKS

energomix

STOPKAN



ZA SVINJE I ŽVINU

VISOKOKVALITETNI SASTOJCI

POMAŽE U SUZBIJANJU I SPREČAVANJU KANIBALIZMA KOD SVINJA (GRIŽA REPOVA I UŠIJU)

HEMIJSKI SASTAV 1kg PREMIKSA:

Proteini, %, najmanje	19
Lizin, %, najmanje	2,8
Metionin, %, najmanje	1,4
Kalcijum, g	70
Fosfor, g	42
Natrijum, g	49
Magnezijum, g	12
Vitamin A, E-672,IJ	350.000
Vitamin D3, E-671,IJ	84.000
Vitamin E, mg	1.680
Vitamin B1, mg	140
Vitamin B2, mg	140
Vitamin B6, mg	140
Vitamin B12, mg	1,1
Vitamin C, mg	700
Pantotenska kiselina, mg	400
Niacin, mg	145
Folna kiselina, mg	20
Gvožđe, E-1, mg	500
Bakar, E-4, mg	500
Mangan, E-5, mg	500
Cink, E-6, mg	1.200
Kobalt, E-3, mg/kg	20
Jod, E-2, mg	50
Organiski Selen, mg	5
Antioksidant: E-321, E-320, E324, E330, E-338, mg/kg, najmanje	3.500
Nosač premiksa ad., mg	1.000.000

NAČIN UPOTREBE:

STOPKAN se koristi preventivno radi suzbijanja poremećaja u ponašanju kod živine i svinja ispoljenih čupanjem perja i međusobnim kljucanjem, kod živine i grižom repova i ušiju kod svinja. Posebno se koristi u slučajevima pojave kanibalizma. Tretman sa ovim premiksom treba da traje 7 - 14 dana, po potrebi i duže. Pozitivni efekti se uočavaju posle 5 dana korištenja. Daje se u količini od 3kg STOPKAN-a na 100kg hrane za svinje ili živinu, koju treba dobro izmešati.

Pakovanje: 3 kg

SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA

MIKO STOP

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja




Pakovanje: 0,3 i 10 kg

NAČIN UPOTREBE: Miko-STOP se stavlja u potpune smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, u količini od 2-3 kg/t (200-300 g na 100 kg gotove hrane). Količina koja se dodaje zavisi od stepena zaraženosti sirovina plesnima i mikotoksinima. Kod mlađih kategorija i jako visokog nivoa mikotoksina može se dodati i do 4 kg/t (400 g na 100kg gotove hrane).

ZAŠTO TREBA KORISTITI MIKO STOP?

- Pomaže u sprečavanju pojave znakova mikotoksikoza (proširen spektar vezivanja mikotoksina)
- Pomaže u ublažavanju negativnog efekta mikotoksina prisutnih u hrani
- Pomaže stimulaciju imunog sistema, stabilizaciju crevne mikroflore i poboljšanje zdravstvenog stanja životinja
- Pomaže u postizanju boljih proizvodnih rezultata (priраст, konverzija, nosivost, mlečnost)
- Sadrži ekstrakte kvasca – koji imaju prebiotsko dejstvo, vežu miko- i entero- toksine
- Sadrži organski vezani selen, C-vitamin i vitamine B-kompleksa koji su izuzetno bitni u stresnim uslovima



SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA




Pakovanje: 0,5 i 10 kg

NAČIN UPOTREBE: Miko-STOP PLUS se stavlja u potpune smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, naročito je namenjen za upotrebu kod prasadi, svinja i teladi. Stavlja se u količini od 4-5 kg/t (400-500 g na 100 kg gotove hrane). Količina koja se dodaje zavisi od stepena zaraženosti sirovina plesnima i mikotoksinima. Kod mlađih kategorija i jako visokog nivoa mikotoksina može se dodati i do 6 kg/t (600 g na 100kg gotove hrane).

ZAŠTO TREBA KORISTITI MIKO-STOP PLUS?

- Pomaže u sprečavanju pojave znakova mikotoksikoza (proširen spektar vezivanja mikotoksina)
- Podstiče bolju konzumaciju hrane kod prasadi, svinja, teladi i junadi
- Pomaže u ublažavanju negativnog efekta mikotoksina prisutnih u hrani
- Pomaže stimulaciju imunog sistema, stabilizaciju crevne mikroflore i poboljšanje zdravstvenog stanja životinja
- Pomaže u postizanju boljih proizvodnih rezultata (prirast, konverzija, nosivost, mlečnost)
- Sadrži ekstrakte kvasca – koji imaju prebiotsko dejstvo, vežu miko- i entero- toksine
- Sadrži organski vezani selen, C-vitamin i vitamine B-kompleksa koji su izuzetno bitni u stresnim uslovima



SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA

NEOZEL

Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

ŠTA SU MIKOTOKSINI?

To su hemijske supstance koje proizvode plesni nastanjene u hrani.

Mikotoksi su otporni na delovanje visokih temperatura i imunog sistema životinja (ne prepozne ih). Konzumiranjem hrane koja sadrži mikotoksine u većim količinama dolazi do raznih poremećaja i oboljenja u zavisnosti od vrste mikotoksina i vrste i kategorije domaćih životinja (poremećaju u varenju, reprodukciji...).

Unošenjem manjih količina mikotoksina tokom dužeg vremenskog perioda dolazi do:

1. Slabijih proizvodnih rezultata - smanjen dnevni prirast, slabija konverzija hrane, produženje vremena tova, smanjenja nosivosti, manje mladunaca u leglu koji su slabije vitalnosti...
2. Povećane osetljivosti prema infektivnim bolestima.

ZAŠTO KORISTITI NEOZEL?

Neozel se koristi PREVENTIVNO kod svih vrsta i kategorija domaćih životinja, kako bi smanjio ili neutralizovao štetno dejstvo mikotoksina (u različitom stepenu - zavisno od vrste mikotoksina) tako što ih vezuje za sebe i zajedno se izlučuju iz organizma.

Preventivno dejstvo se ogleda u:

- Sprečavanju štetnog dejstva plesnive hrane.
- Poboljšava zdravstveno stanje i otpornost životinja
- Sprečava proline, - Povećava prirast, plodnost i nosivost
- Skraćuje dužinu trajanja tova,
- Poboljšava kvalitet mesa, mleka i jaja
- Poboljšava imuni odgovor kod domaćih životinja,
- Smanjuje pojavu oboljenja i smrtnosti.

Pakovanje: 1 i 10 kg



**Novi
PROIZVOD**



na najbolji način

Digesto **PLUS**

VITAMINSKO – MINERALNI PREMIKS ZA SVE VRSTE I
KATEGORIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA



- ⌘ Pomaže u balansiranju varenja
- ⌘ Pomaže u ublažavanju dijareja i njene pojave
- ⌘ Pomaže u prevenciji poremećaja varenja
- ⌘ Pomaže u jačanju imuniteta i opšteg zdravstvenog stanja
- ⌘ Poboljšava prirast i konverziju
- ⌘ Pomaže u smanjenju amonijaka u objektima

Digesto PLUS se koristi umešan u hrani, u trajanju od 5 do 15 dana ili duže, u zavisnosti od potrebe. Dužina vremena upotrebe nije ograničena i može se koristiti i od početka pa do kraja proizvodnog ciklusa. Dozira se prema sledećim preporukama:

Prasad: - STARTER - 2,50 - 3,50 kg/t (250 - 350 g/100kg hrane)
- GROVER - 1,50 - 2,50 kg/t (150 - 250 g/100kg hrane)

Telad: - 1,00 - 3,00 kg/t (100 - 300 g/100kg hrane) ili 3 - 5 g/grlo/dan

Jagnjad i jarad: - 1,00 - 3,00 kg/t (100 - 300 g/100kg hrane) ili 2 - 4 g/grlo/dan

Brojler: - STARTER - 0,40 - 0,50 kg/t (40 - 50 g/100kg hrane)

- GROVER - 0,20 - 0,25 kg/t (20 - 25 g/100kg hrane)

Koke nosilje: - 0,15 - 0,30 (15-30 g/100kg hrane)

Čurke: - STARTER - 1,00 - 1,50 (100 - 150 g/100kg hrane)

- GROVER - 0,50 - 1,00 (50 - 100 g/100kg hrane)

Svinje: - 0,50 - 1,50 (50 - 150 g/100kg hrane)

Junad: - 0,10 - 0,50 (10 - 50 g/100kg hrane)

Kunići: - 2,00 - 5,00 (200 - 500 g/100kg hrane)

Digesto PLUS je optimalna mešavina vitamina, minerala, probiotika i prebiotika koja svoj efekat naročito ispoljava kod mlađih kategorija domaćih životinja. Efekat se ispoljava: pomaže u zaštiti crevne sluzokozje, u ublažavanju poremećaja u varenju i pojave dijareja, pomaže u smanjenju količine amonijaka i vlažnosti prostirke u objektima za uzgoj domaćih životinja, naročito kod životinja u stresnim situacijama.

Stresne situacije u kojima se *Digesto PLUS* koristi:

- prelazak sa mlečne na crvatu hrani – začuljenje
- narušenost optimalnih mikroklimatskih uslova
- smanjenje opšte otpornosti životinja
- sumnje na higijensku ispravnost hrane
- sumnje na kontaminaciju hrane mikotoxinima

Digesto PLUS svojim navedenim pozitivnim efektima kod životinja doprinosi i ostvarivanju boljih proizvodnih rezultata koji se ogledaju u boljem prirastu, smanjenju konverzije, povećanoj masi životinja, povećanoj mlečnosti, povećanom broju jaja.

FSH DOO "GEBI" ČANTAVIR, Maršala Tita br. 46., 24220 Čantavir, Republika Srbija.
Tel.: 024/ 782 525; Fax: 024/ 782-526, Email: office@gebi.rs, www.gebi.rs

pakovanje: 100g

GEBI CID

ZAKISELJIVAC

GEBI-cid je optimalna mešavina organskih kiselina u obliku granula, koje sporo otpuštaju organske kiseline. Organske kiseline snižavaju pH hrane i sadržaj u želucu i crevima, čime delotvorno ometaju razvoj patogenih bakterija. Snižena pH vrednost želudačnog i crevnog sadržaja stimuliše rast mlečno kiselinskih bakterija, koje sprečavaju rast i razmnožavanje bakterija koje izazivaju prolive i digestivne smetnje. Efekat je najizraženiji kod mlađih životinja, a ogleda se u smanjenoj pojavi digestivnih poremećaja i pojave prolija, naročito kod prasadi neposredno posle zalučenja. GEBI-cid poboljšava ukus i varenje hrane, a u određenom stepenu povećava i apetit. Lako se meša u smeši.

- ✓ SMANJUJE DIGESTIVNE PROBLEME
- ✓ SNIŽAVA PH U ŽELUCU I CREVIMA
- ✓ POGODNO POSLE ZALUČENJA
- ✓ BOLJE VARENJE HRANE



Pakovanje: 0,5 kg

ENERGOMIX VITAMIN C

VODOTOPIVI 10%

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

ZAŠTO SE KORISTI ENERGOMIX 10% ?

- ① Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže jačanje imuniteta životinja
- ② Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže oporavak životinja od dugotrajnog transporta
- ③ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom promene hrane
- ④ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom vakcinacije
- ⑤ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom deblikiranja (s ećenje kljunova)
- ⑥ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom pregrupisavanja
- ⑦ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom delovanja visokih temperatura
- ⑧ Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom obeležavanja
- ⑨ Zato što potrebe za C Vitaminom rastu pri bolestima, većim fizičkim naporima, graviditetu i laktaciji
- ⑩ Zato što potpomaže ozdravljenje i oporavak životinja od infektivnih oboljenja

ENERGOMIX 10% VITAMIN C

se koristi umešan u hrani ili vodi za sve vrste i kategorije domaćih životinja.

Ovaj premiks se koristi 3 – 5 dana u hrani ili vodi. Svakog dana praviti svež rastvor ukoliko se daje preko vode. Prilikom sastavljanja rastvora, premiks treba dobro izmešati sa malom količinom vode, pa zatim dodati u preostalu količinu vode!

PREPORUČUJE SE U SLEDEĆIM KOLIČINAMA:

SVINJE

1-2 kg po toni hrane ili 0,5 – 1 kg na 1000 litara vode

TOVNI PILICI I ČURKE

2-4 kg po toni hrane ili 1-2kg na 1000 litara vode

KOKE NOSILJE

4-6 kg po toni hrane ili 2-3kg na 1000 litara vode

TELAD I JUNAD I TOVU

1-3 kg po toni hrane ili 1-2 kg na 1000 litara vode

GOLUBOVI

1-2g na 10 lit. vode

KONJI

20-50g na dan po grlu u vodi ili hrani

PSI

0,1-1 g na dan u vodi ili hrani

MAČKE

0,1g na dan u vodi ili hrani

KUNIĆI

2-5g na 10 lit. vode

Pakovanje: 200 g

Stimulplus

- SA ORGANSKIM SELENOM
- SA AROMOM



ZA SVE VRSTE I KATEGORIJE
DOMAČIH ŽIVOTINJA

ZA BOLJE ISKORIŠĆAVANJE HRANE
ZA BOLJI PRIRAST
STIMULIŠE APETIT

HEMIJSKI SASTAV 1kg PREMIKSA:

Vitamin A, E-672, IJ	550.000
Vitamin D3, E-671, IJ	500.000
Vitamin B1, mg	100
Vitamin B2, mg	200
Vitamin B6, mg	100
Vitamin B12, mg	1
Vitamin C, mg	2.000
Lizin, mg	10.000
Metionin, mg	3.500
Gvožđe, E-1, mg	300
Bakar, E-4, mg	500
Mangan, E-5, mg	350
Cink, E-6, mg	350
Kobalt, E-3, mg	60
Jod, E-2, mg	4
Organjski Selen, mg	15
Kalcijum, mg	9.000
Fosfor, mg	3.300
Natrijum, mg	4.000
Antitoksin, mg	50.000
Enzimi, mg	50.000
Antioksidant: E-321, E-320, E324, E330, E-338, mg/kg, najmanje	12.500
Nosač ad. mg	1.000.000

NAČIN UPOTREBE:

Koristi se kod svih vrsta i kategorija životinja tako što se 1kg STIMULPLUS - a izmeša sa 100kg hrane

Svoj efekat ispoljava tako što:

- Stimuliše apetit
- Poboljšava iskorišćavanje hrane
- Skraćuje vreme tova
- Sprečava dejstvo toksina iz hrane
- Poboljšava resorbkciju hranjivih sastojaka
- Doprinosi dobrom zdravstvenom statusu životinja
- Obезбеђује organizam vitaminima i mineralima



na najbolji način

- ISKUSTVA NAŠIH KUPACA - GEBI STRUČNA PODRŠKA



**G - arancija kvaliteta
E - konomična ishrana
B - irani sastojci
I - dealna cena**





na najbolji način

Beleške:

Beleške:

