

Домашнее задание 1.

1. Выпуклые множества

1. а) Выпуклость \Rightarrow Пересечение с любой прямой выпукло.

Очевидно, т.к. прямая — тоже выпуклое множество.

б) Пересечение с любой прямой выпукло \Rightarrow Выпуклость.

Пусть наше множество — X . Если оно состоит из одной точки, оно выпукло. Далее, в нем лежат две различные точки x_1, x_2 . Проведем через эти точки прямую. По условию, пересечение прямой с X выпукло. Это означает, что в пересечении лежат все точки вида $tx_1 + (1-t)x_2$, $t \in [0, 1]$. Значит эти точки лежат и в X . Получили, что вместе с каждой парой точек во множестве X лежит отрезок, их соединяющий. Это определение выпуклости.

2.

3.

4. Докажем, что множество $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y_0\|_2\}$ выпукло. Тогда исходное будет выпукло, как пересечение выпуклых по S .

2. Двойственные конусы

2. Далее $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0\}$. Замкнутость и выпуклость следуют из того, что это множество является пересечением полупространств вида $x_i \geq x_{i+1}$ и полупространства $x_n \geq 0$. Каждое из них является выпуклым и замкнутым, значит и пересечение выпукло и замкнуто. Рассмотрим $x^1, x^2 \in X$, $x^i = (x_1^i, \dots, x_n^i)$ и возьмем линейную комбинацию $t_1x^1 + t_2x^2$, $t_1, t_2 \geq 0$. Очевидно, что если $x_i^1 \geq x_{i+1}^1$ и $x_i^2 \geq x_{i+1}^2$, то $t_1x_i^1 + t_2x_i^2 \geq t_1x_{i+1}^1 + t_2x_{i+1}^2$. Также $t_1x_n^1 + t_2x_n^2 \geq 0$. Значит $t_1x^1 + t_2x^2 \in X$. X равен своей конической оболочке, т.е. он — конус.