

# Заголовок статьи

И. Н. Нестеров, С. В. Клочков, А. С. Чурсанова

## 1 Введение

Пусть  $X \subset \mathbb{C}^n$  — комплексное евклидово пространство размерности  $n$ .  
 $A : X \rightarrow X$  — линейный дифференциальный оператор. Дано линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами  $Ax = 0, x \in X$ . Оператор  $A$  неизвестен. Запишем  $A$  в следующем виде:

$$Ax = x^{(n)} - \alpha_1 x^{(n-1)} - \dots - \alpha_n,$$

где  $\alpha_i \in \mathbb{C}, i = \overline{1, n}$ .

Будем рассматривать его характеристическое уравнение:

$$\lambda^n - \alpha_1 \lambda^{n-1} - \dots - \alpha_n = 0$$

Тогда матрица оператора  $A$  будет иметь следующий вид: Построим матрицу оператора  $A$ , соответствующую характеристическому уравнению:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_n & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1} & \dots & \alpha_1 \end{pmatrix}$$

В дальнейшем будем проводить исследования этой матрицы.

## 2 Пример

Для примера рассмотрим частный случай  $n = 3$ . Тогда матрица  $\mathcal{A}$  имеет вид:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 \end{pmatrix}$$

Возможны три варианта:

1. все собственные значения различны;
2. есть собственные значения  $\lambda_1, \lambda_2$ , которые имеют кратности  $k_1 = 2, k_2 = 1$  соответственно;
3. все собственные значения одинаковы;

Рассмотрим первый случай. Пусть матрица  $\mathcal{A}$  имеет собственные значения  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  которые имеют кратности  $k_1 = k_2 = k_3 = 1$  соответственно. Оператор  $A$  имеет простую структуру. Тогда жорданова форма матрицы  $\mathcal{A}$  имеет вид:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Далее запишем матрицу перехода  $\mathcal{U}$  и обратную к ней  $\mathcal{U}^{-1}$ :

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{U}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \lambda_2\lambda_3(\lambda_3 - \lambda_2) & \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & \lambda_3 - \lambda_2 \\ \lambda_1\lambda_3(\lambda_1 - \lambda_3) & \lambda_3^2 - \lambda_1^2 & \lambda_1 - \lambda_3 \\ \lambda_1\lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1) & \lambda_1^2 - \lambda_2^2 & \lambda_2 - \lambda_1 \end{pmatrix},$$

где  $\Delta = \det \mathcal{U} = (\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_2 - \lambda_1)$ .

Теперь запишем проекторы оператора  $A$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \mathcal{U}\mathcal{J}\mathcal{U}^{-1}, \\ \mathcal{P}_i &= \mathcal{U}\mathcal{P}'_i\mathcal{U}^{-1}, \\ \mathcal{P}'_i &= (p'_{jk}), \\ p'_{jk} &= \begin{cases} 1, & \text{если } j = k = i; \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases} \end{aligned}$$

где  $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ , и  $\mathcal{P}'_i$  — проекторы жордановой матрицы  $\mathcal{J}$  оператора  $A$ . Тогда по теореме о спектральном разложении оператора простой структуры [1]:

$$\mathcal{A} = \lambda_1\mathcal{P}_1 + \lambda_2\mathcal{P}_2 + \lambda_3\mathcal{P}_3$$

Рассмотрим второй случай. Пусть матрица  $\mathcal{A}$  имеет собственные значения  $\lambda_1, \lambda_2$  которые имеют кратности  $k_1 = 2, k_2 = 1$  соответственно. Тогда жорданова форма матрицы  $\mathcal{A}$  имеет вид:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу перехода  $\mathcal{U}$  и обратную к ней  $\mathcal{U}^{-1}$ :

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \lambda_1 & 1 & \lambda_2 \\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_2^2 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{U}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \lambda_2^2 - 2\lambda_1\lambda_2 & 2\lambda_1 & -1 \\ \lambda_1^2\lambda_2 - \lambda_1\lambda_2^2 & \lambda_2^2 - \lambda_1^2 & \lambda_1 - \lambda_2 \\ \lambda_1^2 & -2\lambda_1 & 1 \end{pmatrix},$$

где  $\Delta = \det \mathcal{U} = (\lambda_1 - \lambda_2)^2$ .

!!!Дописать про проекторы!!!

И наконец последний случай. Пусть матрица  $\mathcal{A}$  имеет одно собственное значение  $\lambda$  кратности  $k = 3$ . Тогда жорданова форма матрицы  $\mathcal{A}$  имеет вид:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу перехода  $\mathcal{U}$  и обратную к ней  $\mathcal{U}^{-1}$ :

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ \lambda^2 & 2\lambda & 2 \end{pmatrix},$$
$$\mathcal{U}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\lambda & 1 & 0 \\ \frac{1}{2}\lambda^2 & -\lambda & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

где  $\Delta = \det \mathcal{U} = 2$ .

!!!Дописать про проекторы!!!

## Список литературы

- [1] Г. Баскаков А. Лекции по алгебре. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. — 159 с.