

ЖОРДАНОВА ФОРМА ДЛЯ ЛОДУ N-ГО ПОРЯДКА
Нестеров И.Н., Клочков С.В., Чурсанова А.С. (Воронеж)
nesterovilyan@gmail.com, klochkov_s.v@mail.ru,
anastasyachursanova@gmail.com

Рассматривается линейное однородное дифференциальное уравнение

$$x^{(n)} = \alpha_1 x^{(n-1)} + \dots + \alpha_n,$$

где $\alpha_k \in \mathbb{C}, k = \overline{1, n}$. Данное уравнение обычным способом сводится к системе линейных дифференциальных уравнений вида $\dot{y} = Ay$ [1], где матрица оператора A имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_n & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1} & \dots & \alpha_1 \end{pmatrix},$$

Теорема 1. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ собственные значения матрицы A кратностей k_1, \dots, k_m соответственно. Тогда жорданова форма матрицы A имеет вид:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{J}_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{J}_m \end{pmatrix}, \text{ где } \mathcal{J}_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Векторами столбцами матрицы перехода являются собственные векторы $e_i = (1, \lambda_i, \dots, \lambda_i^{n-1})$ и присоединенные к ним вида:

$$(0, 1, \dots, (n-1)\lambda_i^{n-2}), \dots, \underbrace{(0, \dots, 0, (k_i-1)!)_{k_i-1}}, \dots, \frac{(n-1)!}{(n-k_i)!} \lambda_i^{n-k_i}, i = \overline{1, m}$$