

Preguntas Marcadores Tumorales + Drogas abuso – Exámenes Oficiales TEL

Andalucía - 2017



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - OEP 2017 - ESTABILIZACIÓN

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

38 La gastrina está elevada en:

- a) Síndrome de Zollinger-Ellisón.
- b) Acromegalia.
- c) Waldenstrom.
- d) Tumor de Wilms.

39 La dopamina nos sirve como marcador en el:

- a) Carcinoide.
- b) Neuroblastoma.
- c) Neo de pulmón.
- d) Carcinoma suprarrenal.

43.- La gonadotropina coriónica se relaciona con los tumores de:

- a) Testículo.
- b) Hepatomas.
- c) Carcinoma ovárico.
- d) Carcinoma pancreático.

52.- ¿Cuál es la muestra de elección por razones técnicas y prácticas en el screening de las drogas de abuso?

- a) Sangre.
- b) Orina.
- c) Saliva.
- d) Heces.

99. -¿Cuál de las siguientes sustancias no se considera un estimulante del Sistema Nervioso Central?

- a) Anfetaminas.
- b) Nicotina.
- c) Opio.
- d) Tricíclicos.

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN T.E.L.

(Resolución 812E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por lo que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 31 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS

Fecha 07/12/2019

26.- Respecto al antígeno carcinoembrionario (CEA), señale la respuesta correcta:

- a) Se encuentra niveles séricos elevados únicamente en pacientes con cáncer de mama.
- b) Se encuentra niveles séricos elevados únicamente en pacientes con cáncer de ovario.
- c) Es un marcador muy sensible y específico.
- d) Es un marcador inespecífico de tumor.

27.- Para diagnosticar y controlar el tratamiento del cáncer de ovario. Es clínicamente útil el marcador:

- a) Ca 125.
- b) CEA.
- c) PSA.
- d) ACTH.

46.- El hierro es transportado en el organismo unido a:

- a) Ferritina.
- b) Transferrina.
- c) Ceruloplasmina.
- d) Transcobalamina.

92.- En relación a la detección de anfetamina en orina, señale la respuesta incorrecta:

- a) El volumen mínimo de la muestra de orina para el proceso del análisis es de 5 ml.
- b) La estabilidad de la muestra de orina centrifugada a temperatura de 4º C, es entre 24 y 48 horas.
- c) Si los resultados son positivos, se debe guardar una alícuota, por la posibilidad de tener que realizar un contraanálisis, en el caso de que el resultado tenga implicaciones legales.
- d) En las condiciones preanalíticas no es necesario ayunas.

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS
DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO**

DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PRIMER EJERCICIO

27 DE OCTUBRE DE 2019

27.- Con respecto a la leucemia mieloide crónica señale la respuesta correcta:

- a) Se caracteriza por la excesiva producción de granulocitos.
- b) Las radiaciones ionizantes no influyen en la génesis.
- c) Es característico el cromosoma de Filadelfia.
- d) Las respuestas a y c son correctas.


Preguntas de reserva.

2.- El marcador tumoral más utilizado para el diagnóstico de cáncer prostático es:

- a) TPA.
- b) PSA.
- c) AFP.
- d) Ca15,3.

3.- ¿Cuál de los siguientes marcadores está presente en el carcinoma hepatocelular?

- a) PAP.
- b) PSA.
- c) Ca 125.
- d) AFP.



T.S.E. LABORATORIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Madrid - 7 de Febrero de 2019

55.- Cual de estos pacientes tendrá mayor probabilidad de tener un carcinoma de próstata a partir de los resultados de un análisis de sangre:

- a) PSA total mayor de 10 ng/ml.
- b) % PSA libre mayor del 35%.
- c) PSA libre entre 4-10 ng/ml.
- d) PSA total menor de 5 ng/ml.

65.- Un marcador tumoral:

- a) Es cualquier sustancia que está relacionada con la presencia o progresión de una neoplasia.
- b) Es la prueba ideal para diagnosticar la presencia de cualquier neoplasia.
- c) Los marcadores tumorales son especialmente útiles en la monitorización de la respuesta al tratamiento.
- d) A y C son correctas.

87.- El periodo de tiempo en el que es detectable la presencia en orina de una droga de abuso tras su consumo se puede definir como:

- a) Sensibilidad de la prueba.
- b) Especificidad de la prueba.
- c) Ventana de positividad.
- d) Cribado.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES EN
LA CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO**

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «**Hoja de Respuestas**» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- El **tiempo de duración de las dos pruebas** es de **tres horas**.
- **No abra** el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**» y «**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «**Reserva**» de la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «**Hoja de Respuestas**».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «**Hoja de Respuestas**» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE ESTA.

ESTE CUADERNILLO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

18.- ¿Qué marcador tumoral en sangre se encuentra más aumentado en el adenocarcinomas de colon y recto?

- a) Ca 125.
- b) Ca 15.3.
- c) Ferritina.
- d) Antígeno carcinoembrionario (CEA)

39.- En cuanto al cribado de Drogas de Abuso en orina, es cierto que:

- a) Los métodos de cribado (inmunoanálisis) deben ofrecer una alta especificidad analítica.
- b) Los métodos de cribado (inmunoanálisis) deben ofrecer una alta sensibilidad analítica.
- c) El intervalo de tiempo de detección de estas sustancias es ilimitado desde que se produce el consumo.
- d) Los resultados obtenidos por métodos de cribado se pueden considerar definitivos y, por tanto, diagnósticos.

57.- Los resultados de un análisis confirmatorio de Drogas de Abuso, nos dan información de:

- a) Informan de manera cualitativa (positivo o negativo) acerca de la droga detectada.
- b) Informan de manera cuantitativa acerca de la droga detectada y sus metabolitos.
- c) Informan de manera cualitativa y cuantitativa acerca de la droga detectada y sus metabolitos.
- d) Informan de los Factores Biológicos relacionados con el Genotipo.

CASO PRÁCTICO 5:

Mujer de 74 años, que es llevada a Urgencias por su hijo, que refiere haberla encontrado en casa en estado de sedación, somnolienta que apenas responde a estímulos, falta de coordinación motora e incapacidad para hablar. Se le pregunta a su hijo sobre la medicación que toma su madre y refiere tratamiento para el colesterol, la tensión arterial y que, tras fallecimiento de su padre, toma algo para la ansiedad y dormir mejor. Se le toma una muestra de orina y sangre, solicitándose bioquímica básica en suero y un test de drogas.

121.- ¿Qué método básico es el más ampliamente utilizado para screening de drogas de abuso en orina, en laboratorio de urgencias?

- a) Cromatografía de gases-Espectrometría de masas (GC-MS).
- b) Gasometría.
- c) Inmunoensayo múltiple enzimático (EMIT).
- d) Inmunocromatografía.

122.- Señale algún inconveniente en el uso de técnicas de screening de drogas en orina:

- a) Facilidad de ejecución.
- b) Rapidez de resultados.
- c) Buena relación coste-efectividad.
- d) Reacciones cruzadas (falsos positivos).

123.- Si se obtiene un resultado positivo para una droga en un test de screening de orina, basado en la competición del antígeno “marcado” y “no marcado” por el sitio de unión a un anticuerpo específico, ¿qué observamos?

- a) Una línea continua en la ventana T de muestra y una línea continua en la ventana C de control.
- b) Una sola línea continua en la ventana C de control.
- c) No aparece ninguna línea en el test.
- d) Una línea discontinua en la ventana C de control.

124.- La definición del cut-off de una técnica analítica es:

- a) El valor del control alto.
- b) El valor del control bajo.
- c) El punto de corte (concentración de la droga en la muestra) a partir del cual se considera el resultado positivo.
- d) El método analítico del autoanalizador.

125.- El consumo continuado de drogas puede llegar a producir:

- a) Daños orgánicos y cerebrales.
- b) Dependencia física y psicológica.
- c) Conductas compulsivas, agresivas o violentas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



Secretaría General
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
LABORATORIO, EN LAS INTITUCIONES SANITARIAS
DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

Convocado mediante Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del SES (DOE nº 213 de 5 de noviembre de 2021)

TURNOS LIBRE Y DE DISCAPACIDAD

**FASE DE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST**

TIPO 1

(Ver Instrucciones para la realización del ejercicio)

6. Los marcadores tumorales pueden servir para:

- a) Estadía de del tumor.
- b) Predicción y seguimiento de la respuesta terapéutica.
- c) Detección de recurrencia.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

94. Ante la sospecha de un cáncer de ovario de tipo seroso, ¿cuál es el marcador más adecuado?

- a) CA 125.
- b) CEA.
- c) CA 19-9.
- d) AFP.

95. Entre las posibilidades de aumentar la especificidad del antígeno prostático específico (PSA) en el diagnóstico de cáncer de próstata destaca la medida en suero de distintas formas moleculares o isoformas de PSA. La forma proPSA es:

- a) Un precursor de PSA unido a antitripsina.
- b) Una forma de PSA libre.
- c) Un precursor de PSA unido a alfa-2-macroglobulina.
- d) Un precursor de PSA unido a albúmina.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - EXAMEN APLAZADO

ADVERTENCIAS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).
- EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.
- ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.
- NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.
- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de **tres horas**.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

19. En el algoritmo de malignidad ovárica ROMA se emplean dos tipos de marcadores. Indique cuáles son:

- A) CA 125 y HE-4.
- B) HE-4 y CA 15.3.
- C) CA 15.3 y PSA.
- D) PSA y CEA.

31. ¿Qué prueba se emplea para el cribado del cáncer de colon?

- A) Sangre oculta en heces.
- B) Cuerpos reductores.
- C) Determinación de leucocitos en sangre.
- D) Calprotectina.

OSAKIDETZA

2021eko azaroaren 25eko 1489/2021 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-Lehiaketarako deia (EHAA 249 Zkia. 2021eko abenduaren 15ekoa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1489/2021 de 25 de noviembre de 2021 (BOPV Nº 249 de 15 de diciembre de 2021)
--	--

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2022ko uztailaren 2an / 2 de julio de 2022

1. Ariketa / Ejercicio 1 ***A Eredua / Modelo A***

10.- El principal productor terminal del metabolismo de la adrenalina y la noradrenalina es el:

- a) Ácido úrico.
- b) Ácido vanilmandélico.
- c) Ácido acético.
- d) Ácido clorhídrico.

32.- Ante una sospecha de carcinoma hepatocelular, el marcador tumoral es:

- a) CEA.
- b) Alfafetoproteína.
- c) CA 125.
- d) CA 19.9.

59.- ¿Cuál de las siguientes determinaciones ha demostrado mayor utilidad en el cribado del cáncer colorrectal?

- a) Ca 19,9.
- b) CEA.
- c) Sangre oculta en heces.
- d) CYFRA 21.

103.- De los siguientes marcadores tumorales, ¿cuál se utiliza en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer medular de tiroides?

- a) PSA.
- b) S-100.
- c) Calcitonina.
- d) HER-2/neu.

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE
TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA.**

**Resolución de 19 de abril de 2021, de la directora general de Recursos Humanos
(DOGV núm. 9077/06.05.2021)**

**TURNO DE ACCESO LIBRE CON RESERVA PARA DIVERSIDAD
FUNCIONAL**

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD A

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 65 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD B

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 70 minutos

11/12/2022

28.- ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es el más específico para la detección del cáncer de próstata?

- a) CEA.
- b) PSA.
- c) CA 15-3.
- d) CA 125.

35.- Una de las patologías más frecuentemente asociada a la presencia de sangre oculta en heces es:

- a) Cirrosis.
- b) Cáncer de colon.
- c) Pancreatitis
- d) Litiasis Renal.

**CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN DEL
PUESTO DEL TRABAJO DE
TECNICO ESPECIALISTA EN
LABORATORIO**

(Resolución 2649E/2022, de 9 de noviembre, del "director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

25 de noviembre de 2023

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

4.- ¿Cuál es la técnica más habitual para la determinación de marcadores serológicos tumorales en los laboratorios de análisis clínicos?:

- a. Espectrometría de masas.
- b. Espectroscopía de absorción atómica.
- c. Técnicas inmunoquímicas o de inmunoensayo.
- d. Potenciometría indirecta.



OSAKIDETZA

2022ko azaroaren 24ko 1827/2022 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa- Lehiaketarako deia (EHAA 246 Zkia. 2022ko abenduaren 27koa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1827/2022 de 24 de noviembre de 2022 (BOPV Nº 246 de 27 de diciembre de 2022)
--	---

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2023ko irailaren 29an / 29 de septiembre de 2023

27.- Un valor elevado del marcador tumoral PSA se utiliza para monitorizar el cáncer de próstata. Este valor también puede verse alterado por:

- a) Hipertrofia de próstata benigna.
- b) Insuficiencia renal.
- c) Embarazo.
- d) Hepatopatía.

29.- Los genes que han sufrido variaciones en la secuencia de nucleótidos por mutación, amplificación o reordenamiento cromosómico se llaman:

- a) Protooncogenes.
- b) Oncogenes.
- c) Carcinogenes.
- d) Apoptogenes.

35.- ¿Cuál de los siguientes métodos NO es habitualmente utilizado para la confirmación de la detección de drogas de abuso?

- a) GC-FID (cromatografía de gases- detector de ionización por llama).
- b) GC-MS (cromatografía de gases- espectrometría de masas).
- c) HPLC-UV (cromatografía líquida de alta resolución- espectrofotometría ultravioleta).
- d) FAAS (Espectrofotometría de absorción atómica de llama).

107.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la detección precoz del cáncer de mama es FALSA?

- a) La prueba va dirigida a mujeres entre 50-69 años.
- b) En caso de tener antecedentes familiares va dirigida a mujeres de entre 40-69 años.
- c) Se realiza cada 5 años.
- d) La prueba consiste en dos radiografías (mamografías) en distinta proyección de cada mama.

63. ¿Cuál es el tipo de tumor que más se relaciona con las radiaciones ionizantes?

- a. Cáncer de pulmón.
- b. Leucemia.
- c. Cáncer de piel.
- d. Cáncer gástrico.

64. Ante la sospecha de carcinoma hepatocelular, el marcador tumoral de elección es:

- a. HCG.
- b. Alfa-fetoproteína (AFP).
- c. CEA.
- d. PSA.

 Comunidad de Madrid	Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales CONSEJERÍA DE SANIDAD	PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).
CATEGORÍA: T. S. ESP. EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (examen 10-03-2024)		
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA		
ADVERTENCIAS: • No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuademillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). • Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas). • El cuestionario consta de 80 preguntas, más 10 de reserva, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE EXAMEN". • Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. • Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante. • Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. • Las respuestas erróneas serán penalizadas, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas. • Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la "HOJA DE EXAMEN" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. • Para la realización del ejercicio dispone Vd. de 95 minutos desde la señal de comienzo.		

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

36.- Los marcadores tumorales no son:

- A) Electrolitos.
- B) Antígenos tumorales.
- C) Hormonas y enzimas.
- D) Antígenos oncofetales.

45.- Indique cuál de estas asociaciones es incorrecta:

- A) Cromogranina A - tumores neuroendocrinos.
- B) HE4 - cáncer de páncreas.
- C) AFP – hepatocarcinoma.
- D) Tiroglobulina - carcinoma medular de tiroides.

79.- ¿Qué asociación es falsa?

- A) Alfa-fetoproteína y tumor de células germinales.
- B) CA 125 y neuroblastoma (neoplasia del sistema nervioso central).
- C) Calcitonina y carcinoma medular del tiroides.
- D) Antígeno específico prostático y neoplasia de próstata.

80.- Cual de lo siguientes es un marcador tumoral:

- A) Anticuerpos antifosfolípido.
- B) Cistatina C.
- C) Antígeno Carcinoembrionario.
- D) Mioglobina.

85.- En un paciente que tenía antes de ser operado de una neoplasia de colon un valor de CEA muy elevado y que después de la cirugía se normalizó, ¿qué significado puede tener el aumento a 10 veces el valor normal del marcador en la revisión realizada a los dos años?:

- A) Un fallo en el metabolismo del marcador.
- B) Una posible recidiva del tumor.
- C) Un efecto de la variabilidad biológica de cada individuo.
- D) Una disminución en la eliminación del marcador por fallo renal.

PRUEBA ÚNICA:
CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELÉFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.**

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de la prueba es de dos horas.
- Para abrir este cuadernillo de preguntas, rompa el precinto cuando se indique.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
 - PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «prueba teórico-práctica».

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

- Esta prueba consta de **75 preguntas**, numeradas de la 1 a la 75, y **3 preguntas más de reserva**, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica/práctica deben ser contestadas en la

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

21.- El Antígeno de células escamosas (SCC), se emplea para el diagnóstico de:

- A) Carcinoma suprarrenal.
- B) Mieloma.
- C) Carcinoma de cérvix.
- D) Neuroblastoma.



GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Salud



salud
servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 2 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 246, de 22 de diciembre de 2022)

CATEGORÍA:
TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **1:50 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.



ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

16.- El cromosoma Filadelfia (Ph1) es característico de:

- A) Leucemia Linfóide Aguda.
- B) Leucemia Mieloide Crónica.
- C) Leucemia Mieloide Aguda.
- D) Leucemia Linfóide Crónica.

24.- ¿Cuál es un marcador de elección para tumores epiteliales de ovario?

- A) Ca 125.
- B) AFP.
- C) Ca 15.3.
- D) Ca 19.9.

78.- Indique qué marcador es útil para el seguimiento de tumores colorrectales y páncreas (carcinomas digestivos):

- A) PSA.
- B) Ca 125.
- C) Ca 15.3.
- D) Ca 19.9.

Respuestas correctas.

Andalucía – 2017

38.- a)

39.- b)

43.- **ANULADA** (Puede ser la respuesta a o c).

52.- b)

99.- c)

Navarra – 2019

26.- d)

27.- a)

46.- b)

92.- **ANULADA.**

La presencia de anfetaminas (o sus metabolitos) en orina oscila entre 2 y 4 días (algunas referencias bibliográficas apuntan entre 1 y 3 días).

Los métodos de cribado, *screening* o despistaje (inmunocromatografía) requieren poco volumen de muestra, mientras que los métodos confirmatorios (cromatografía de gases / espectroscopia de masas) requieren un volumen mayor, de entre 1 y 3 mL de muestra.

Po tanto, tanto la respuesta a (referida al volumen necesario) como la b (relativa a la estabilidad de la droga) son incorrectas, motivo por el que se anuló dicha pregunta.

La Rioja – 2019

27.- d)

Preguntas de reserva.

2.- b)

3.- d)

Madrid – 2019

55.- a)

65.- d)

87.- c)

Andalucía – 2021

18.- d)

39.- b)

57.- c)

CASO PRÁCTICO 5:

121.- d)

122.- d)

123.- b)

124.- c)

125.- d)

Extremadura – 2021

6.- d)

94.- a)

95.- b)

Andalucía – 2022

19.- a)

31.- a)

País Vasco – 2022

10.- b)

32.- b)

59.- c)

103.- c)

Comunidad Valenciana - 2022

28.- b)

35.- b)

Navarra - 2022

4.- c)

País Vasco – 2023

27.- a)

29.- b)

35.- d) FAAS (Espectrofotometría de absorción atómica de llama). Este método se utiliza principalmente para la determinación de metales en muestras.

107.- c)

País Vasco – 2023

27.- a)

29.- b)

Castilla y León - 2023

63.- b)

64.- b)

Madrid – 2024

36.- a)

45.- b)

79.- b)

80.- c)

85.- b)

Andalucía – 2024

21.- c)

Aragón – 2024

16.- b)

24.- a)

78.- d)