

La Rioja - 2019

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS
DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO

DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PRIMER EJERCICIO

27 DE OCTUBRE DE 2019

28.- ¿Cuál de los siguientes factores de coagulación NO es dependiente de la vitamina K?:

- a) Protrombina o Factor II.
- b) Factor VIII.
- c) Factor IX.
- d) Factor VII.

29.- ¿Qué inhibidor fisiológico de la coagulación ejerce una acción proteolítica sobre los factores V y VIII?:

- a) Antitrombina III.
- b) Proteína C.
- c) Proteína S.
- d) Cofactor II de la heparina.

Comentario

La proteína C se clasifica dentro los inhibidores fisiológicos de la coagulación, ya que degrada los factores Va y VIIIa, impidiendo el desarrollo del proceso de coagulación. Su disminución (por causa genética o adquirida) predispone a trombosis venosa.

Es dependiente de la vitamina K (al igual que los factores VII, IX y X, la protrombina o factor II así como las proteínas S y Z).

30.- ¿Qué técnica de laboratorio es utilizada para el control del tratamiento con anticoagulantes orales?:

- a) Tiempo de Reptilase.
- b) Tiempo de Protrombina (TP).
- c) Tiempo de Trombina (TT).
- d) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa).

Comentario

Tiempo de protrombina (TP) (vn= <15sg), Índice de Quick (vn= 100%) o INR (vn= 0,8–1,2 personas no anticoaguladas, entre 2 y 3 en personas que toman anticoagulantes orales)* es la prueba habitualmente utilizada para evaluar a los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales (fármacos antagonistas de la vitamina K; simtrome, acenocumarol,

warfarina). El resultado puede expresarse también como Índice de Quick (en %) o como índice de Normalización Internacional (INR) tras aplicarse una fórmula.

31.- El método coagulativo de Clauss se utiliza para:

- a) Valoración del Factor XIII.
- b) Determinación del Fibrinógeno.
- c) Determinación de la Trombina.
- d) Determinación del Factor VIII.

Comentario

El fibrinógeno (Fg) tiene un papel preponderante en la hemostasia primaria y secundaria.

Para su medición, destaca la prueba de fibrinógeno de Clauss (unidades en g/L), en la cual se induce la formación de fibrina mediante el uso de una gran cantidad de trombina exógena. También es habitual la medición del fibrinógeno derivado, en la cual el instrumento hace un cálculo a 450 nm durante la formación del coágulo cuando se realiza el Tiempo de Protombina (TP), siendo esta técnica menos precisa que la de Clauss.

32.- Señale la respuesta correcta. Los valores de referencia de la prueba de laboratorio llamada (TTPa) Tiempo de Tromboplastina Parcial activada son:

- a) 1-4 minutos.
- b) 80-120%.
- c) 5-20 segundos.
- d) 25-35 segundos.

Comentario

El tiempo más largo (TTPa), es el que más dura (<35 sg) y evalúa la vía más larga (la intrínseca). Está alargado en las hemofilias y sirve para controlar el tratamiento con heparina (antídoto: protamina).

Andalucía - 2017



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - OEP 2017 - ESTABILIZACIÓN

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
- **No abra** el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

62.- De forma general, los valores de INR en paciente anticoagulado oral deben oscilar entre:

- a) 2 - 3.5.
- b) 7-10.
- c) 10-15.
- d) 20-25.

63.- Para el estudio de la presencia de anticoagulantes circulantes, se realiza:

- a) Tiempo de Caolín.
- b) Tiempo de veneno de Russell.
- c) A y B, son ciertas.
- d) Ninguna técnica es correcta.

Comentario – Pregunta rara

El tiempo de Caolín es el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) que evalúa la vía intrínseca. Normalmente se le denomina de esta manera o Tiempo de Cefalina. La denominación de Caolín (infrecuente) proviene del empleo de esta sustancia junto con fosfolípidos para llevar a cabo la determinación.

El tiempo de veneno de Russel se emplea generalmente para la detección del Anticoagulante Lúpico (AL) ante la sospecha del Síndrome Antifosfolípido (SAF).

En el estudio de veneno de Russell se puede afirmar que se busca la presencia de una sustancia anticoagulante (Anticoagulante Lúpico). El Tiempo de Caolín o TTPa puede utilizarse con este fin, aunque su sensibilidad es menor.

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN T.E.L.

(Resolución 812E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por lo que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 31 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS

Fecha 07/12/2019

67.- Son factores de la coagulación de la vía intrínseca:

- a) VII, V, II.
- b) VIII, IX, XII.
- c) I, III, VII.
- d) V, VI, X.

68.- Señale la respuesta correcta, la hemofilia de tipo B:

- a) Está causada por un déficit de factor VIII.
- b) Hay un déficit de fibrinógeno.
- c) Está causada por un déficit de factor V.
- d) Está causada por un déficit de factor IX.

Comentario.

La hemofilia B es un trastorno hemorrágico que se produce en aquellos pacientes con déficit del factor IX (presente en la vía intrínseca) y supone un 10% del total de casos de hemofilia. Se trata de una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, por lo que la hemofilia afecta casi exclusivamente a varones. El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) estará alargado (> 35 segundos).

69.- El tiempo de tromboplastina parcial activada se ve alargado en el tratamiento con:

- a) Warfarina.
- b) Heparina no fraccionada.
- c) Acenocumarol.
- d) Tras la administración de vitamina K.

Comentario.

La Heparina fraccionada o de bajo peso molecular (HBPM) se evalúa mediante el estudio del factor Xa.

T.S.E. LABORATORIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Madrid - 7 de Febrero de 2019

1.- Indique la afirmación correcta sobre el plasminógeno:

- a) El plasminógeno o profibrinolisisina es una glicoproteína sintetizada por el hígado, presente en el plasma sanguíneo.
- b) El plasminógeno tipo I aparece reclutado en los coágulos de fibrina.
- c) El plasminógeno tipo II está preferentemente presente en la superficie de la célula.
- d) Todas las anteriores son correctas.

Comentario – Difícil (para aprender).

El plasminógeno humano (=profibrinolisisina) es una glicoproteína sintetizada en el hígado de una sola cadena de 791 aminoácidos, con un componente en carbohidratos del 2% aproximadamente y 93.000 daltons de masa molecular. Tiene seis dominios estructurales, uno de ellos con actividad serin-proteasa. Se trata de la forma inactiva de la plasmina, una serin-proteasa implicada en el sistema fibrinolítico (disolución de los coágulos).

Existen dos formas principales de plasminógeno en los seres humanos: el plasminógeno tipo I, que contiene dos glicosilaciones y está presente principalmente en los coágulos sanguíneos, y el plasminógeno tipo II, el cual contiene solo un azúcar y está presente preferentemente sobre la superficie celular del plasminógeno tipo I.

18.- Indique la afirmación falsa respecto a la agregometría:

- a) La agregometría óptica se realiza con plasma rico en plaquetas.
- b) Es un método que mide en tiempo real la agregación de las plaquetas.
- c) Los métodos para evaluar la agregación plaquetaria pueden basarse en la transmisión de luz (agregometría de impedancia) o en la resistencia al paso de una corriente eléctrica (agregometría óptica).
- d) Todas las anteriores son falsas.

Comentario.

Las pruebas de función plaquetaria simulan el proceso fisiológico de adhesión y de agregación, de forma que permiten la cuantificación de la respuesta plaquetaria y la identificación de una función anormal.

Una de las pruebas más utilizadas para evaluar la función plaquetaria es la agregometría por transmisión de luz. Dicha técnica se basa en la medición por espectrofotometría del cambio turbidimétrico que se produce a medida que las plaquetas, en agitación constante, se agregan ante el estímulo de un agonista o sustancia proagregante (agregometría óptica). El plasma rico en plaquetas permite poca transmisión de luz. La agregación inicia cuando se adiciona un agonista, el plasma se vuelve más claro y permite la transmisión de luz, ésta se mide constantemente y el cambio en la transmisión se representa en una curva de agregación.

La agregometría de sangre total utiliza dos electrodos para registrar el cambio en el paso de la corriente eléctrica (agregometría de impedancia).

66.- El tiempo de protrombina es sensible al déficit de los siguientes factores de la coagulación **ANULADA**

- a) II, V, VII, X.
- b) II, V, VII, X.
- c) VIII, XIII.
- d) VIII, XII.

Comentario.

El Tiempo de Protrombina (s), también denominado Índice de Quick (%), consiste en determinar el tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado tras añadirle tromboplastina cálcica en exceso.

Mediante esta técnica se valora la vía extrínseca de la coagulación (deficiencia del factor VII, X, V [proacelerina], II [protrombina] y I [fibrinógeno]), para investigar la coagulación en personas afectadas por hepatopatías, coagulación intravascular diseminada (CID) o déficit de vitamina K. También es útil en el control de pacientes que estén siendo tratados con anticoagulantes orales dicumarínicos (Sintrom, Warfarina).

El Tiempo de Protrombina se puede convertir a su correspondiente valor internacional denominado INR (índice o razón de normalización internacional) mediante el uso del Índice Internacional de Sensibilidad (ISI) → estandariza los valores de TP interlaboratorios.

$$\text{Tasa de PT (R)} = \frac{\text{TP del paciente en segundos}}{\text{TP del control en segundos}} \quad \text{INR} = \text{R}^{\text{ISI}}$$

71.- Indique la opción falsa:

- a) La vida media en la circulación de las plaquetas es de aproximadamente 10 días.
- b) Las plaquetas son los elementos formes más pequeños de la sangre.
- c) Además de su papel en la hemostasia, las plaquetas participan en procesos como la trombosis, la inflamación y la remodelación tisular.
- d) Intervienen en la hemostasia secundaria a través de los procesos de adhesión y agregación.

93.- De las variables a tener en cuenta para el estudio de la función plaquetaria, indique la falsa:

- a) Se aconseja no realizar deporte 24h antes de la extracción de la muestra, así como abstenerse de fumar mínimo 30 minutos antes y no consumir cafeína en las 2h previas.
- b) Se deben utilizar agujas de calibre >21G y la muestra debe recogerse en tubos con vacío o jeringas de plástico, desechando mínimo 5ml de sangre antes de recoger la que se utilizará en el ensayo.
- c) Para evitar la activación de las plaquetas, la muestra debe transportarse a temperatura ambiente, con cuidado y en posición vertical, evitando el tubo neumático.
- d) Todas las anteriores son correctas.

Comentario– Difícil (para aprender).

Idealmente se recomienda agujas de un calibre intermedio de 21G (agujas verdes). Agujas de mayor calibre pueden provocar punciones traumáticas y liberación de fragmentos vasculares que alteren la hemostasia, mientras que agujas más delgadas pueden prolongan el tiempo de recolección de la muestra, modificando el gradiente de presiones con la consecuente hemólisis o producir la activación de plaquetas y leucocitos.

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
LABORATORIO, EN LAS INTITUCIONES SANITARIAS
DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

Convocado mediante Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del SES (DOE nº 213 de 5 de noviembre de 2021)

TURNOS LIBRE Y DE DISCAPACIDAD

**FASE DE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST**

TIPO 1

(Ver Instrucciones para la realización del ejercicio)

18. La agregación plaquetaria NO está alterada en:

- a) Hemofilia B.
- b) Enfermedad de Von Willebrand.
- c) Tratamiento con aspirina.
- d) Está alterada en todas.

24. Son enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X:

- a) Daltonismo.
- b) Hemofilia A.
- c) Fibrosis quística.
- d) A) y b) son correctas.

35. ¿Cuál es la sustancia que da lugar al coágulo después de consolidar el agregado plaquetario?

- a) Plasmina.
- b) Fibrinógeno.
- c) Plasminógeno.
- d) Fibrina.

36. La trombastenia de Glanzmann es:

- a) Una trombocitopenia adquirida.
- b) Un defecto adquirido de la adherencia plaquetaria.
- c) Una alteración del metabolismo del ácido araquidónico.
- d) Un defecto congénito de la agregación plaquetaria.

87. ¿Qué factor estabiliza la formación del coágulo?

- a) Factor IX.
- b) Factor VII.
- c) Factor XIII.
- d) Factor XII.

88. Para el control de la terapia de Sintrom (dicumarínico) se emplea:

- a) TT (tiempo de trombina).
- b) TR (tiempo de reptilasa).
- c) APTT (tiempo de tromboplastina parcial activada).
- d) TP (tiempo de protrombina).

103. Los valores de INR en paciente anticoagulado oral deben oscilar (de forma general) entre:

- a) 2-3.
- b) 4-7.
- c) 8-10.
- d) 11-15.

105. En una muestra de coagulación los anticuerpos lúpicos pueden detectarse principalmente mediante:

- a) TP (tiempo de protrombina).
- b) TT (tiempo de trombina).
- c) TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada).
- d) TR (tiempo de reptilasa).

OSAKIDETZA

2021eko azaroaren 25eko 1489/2021 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa- Lehiaketarako deia (EHAA 249 Zkia. 2021eko abenduaren 15ekoa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1489/2021 de 25 de noviembre de 2021 (BOPV Nº 249 de 15 de diciembre de 2021)
--	---

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2022ko uztailaren 2an / 2 de julio de 2022

1. Ariketa / Ejercicio 1 ***A Eredua / Modelo A***

47.- En la estructura interna de las plaquetas, en lo referente a la zona de organelas, encontramos... Indicar la respuesta ERRÓNEA.

- a) Lisosomas.
- b) Masas de glucógeno.
- c) Glucocáliz.
- d) Mitocondrias.

48.- A la formación de un entramado constituido por la agregación de las plaquetas entre sí, se le denomina:

- a) Trombo rojo.
- b) Trombo blanco.
- c) Trombo rosáceo.
- d) Trombo TVP.

49.- Respecto a las alteraciones del número de plaquetas, se dice que una trombocitopenia, trombopenia o plaquetopenia puede deberse a la siguiente causa:

- a) Esplenectomía.
- b) Enfermedad de Crohn.
- c) Colitis ulcerosa.
- d) Déficit de ácido fólico o de vitamina B12.

50.- Entre las trombopatías congénitas se encuentran:

- a) Púrpura Trombocítica Trombocitopénica (PTT).
- b) Síndrome de Bernard-Soulier.
- c) Trombastenia de Glanzmann.
- d) b) y c) son correctas.

51.- Señale la respuesta correcta.

- a) En la vía intrínseca de la coagulación intervienen el factor IX, el factor XI y el factor XII.
- b) En la vía extrínseca de la coagulación intervienen el factor IX, el factor XI y el factor XII.
- c) En la vía común de la coagulación interviene el factor IX, el factor XI y el factor XII.
- d) En la vía extrínseca de la coagulación interviene el factor 3 plaquetario (f3p).

52.- Señale la respuesta correcta respecto a las pruebas que estudian las vías de la coagulación.

- a) El tiempo de tromboplastina parcial (TTP) estudia la vía intrínseca.
- b) El tiempo de protrombina (TP) estudia la vía extrínseca.
- c) El tiempo de trombina (TT) estudia la vía común.
- d) Todas son ciertas.

53.- Señale la respuesta correcta entre las pruebas parciales que estudian la fibrinólisis.

- a) Cuantificación de la α_2 – macroglobulina.
- b) Cuantificación del fibrinógeno.
- c) Cuantificación del plasminógeno.
- d) b) y c) son ciertas.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - EXAMEN APLAZADO

ADVERTENCIAS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).
 - EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.
 - ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.
 - NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
 - EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.
- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
 - El tiempo de duración de las dos pruebas es de **tres horas**.
 - Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
 - Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
 - Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
 - Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
 - Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
 - Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
 - Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
 - Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

44. Los trastornos de la coagulación pueden ser debidos a:

- A) Alteraciones de la pared vascular.
- B) Alteraciones de las plaquetas.
- C) Alteraciones de los factores de la coagulación.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

45. De las afirmaciones siguientes, señale la INCORRECTA:

- A) El tiempo de protrombina (TP), valora la vía extrínseca.
- B) El tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), valora la vía intrínseca.
- C) El tiempo de trombina (TT), valora el tiempo de lisis del coágulo.
- D) El tiempo de hemorragia, valora el funcionamiento plaquetar.

55. Para el diagnóstico de enfermedades como el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la trombosis venosa profunda (TVP), se utiliza la determinación de Dímeros D. En relación a los métodos de medida de los Dímeros D, señale la afirmación correcta:

- A) Se determinan por Aglutinación por degradación de partículas de látex.
- B) Se determinan por Unión enzimática por inmunoabsorción (ELISA).
- C) Se determinan por Unión enzimática por fluorescencia (ELFA).
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. Al tiempo que tarda en coagular el plasma al añadir trombina, se le conoce como:

- A) Tiempo de trombina.
- B) Tiempo de protrombina.
- C) Tiempo de tromboplastina.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

58. En relación con las hemofilias, señale la afirmación INCORRECTA:

- A) Son trastornos hemorrágicos hereditarios frecuentes causados por deficiencias del factor de coagulación VIII o IX.
- B) El grado de deficiencia del factor determina la probabilidad y la gravedad de la hemorragia.
- C) La hemofilia A se debe a una deficiencia de factor VIII.
- D) La hemofilia B se debe a una deficiencia de factor XIII.

59. La prueba más idónea para controlar la acción de los anticoagulantes orales es:

- A) El tiempo de tromboplastina parcial activado.
- B) El tiempo de trombina.
- C) El tiempo de protrombina.
- D) El nivel plasmático del fibrinógeno.

61. El factor de Stuart Prower es el factor:

- A) VI.
- B) X.
- C) XII.
- D) XV.

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE
TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA.**

**Resolución de 19 de abril de 2021, de la directora general de Recursos Humanos
(DOGV núm. 9077/06.05.2021)**

**TURNO DE ACCESO LIBRE CON RESERVA PARA DIVERSIDAD
FUNCIONAL**

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD A

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 65 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD B

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 70 minutos

11/12/2022

58.-¿Qué trastorno genético se hereda de una forma autosómica recesiva y consiste en la ausencia o disminución del receptor plaquetario GPIIb/IIIa.?

- a) Trombastenia de Glanzmann.
- b) Síndrome de Bernard-Soulier.
- c) Síndrome de plaquetas grises.
- d) Síndrome de Chediak-Higashi.

**CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN DEL
PUESTO DEL TRABAJO DE
TECNICO ESPECIALISTA EN
LABORATORIO**

(Resolución 2649E/2022, de 9 de noviembre, del "director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

25 de noviembre de 2023

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

27.- ¿Qué test es utilizado en el laboratorio de urgencias para una detección rápida de porfobilinógeno en una orina de micción aislada?:

- a. Test de O'Sullivan.
- b. Test de Hoesch.
- c. Test de Apgar.
- d. Test de Coombs.

42.- ¿Cuál de los siguientes es un factor vitamina K dependiente?:

- a. II.
- b. III.
- c. V.
- d. XIII.

45.- Señale la respuesta correcta, la TTPA estudia:

- a. La vía intrínseca.
- b. La vía extrínseca.
- c. La común y la extrínseca.
- d. La común y la intrínseca.

46.- Un motivo de exclusión de un tubo de citrato para la determinación de coagulación es:

- a. Que el volumen extraído supera la marca del tubo.
- b. Menos volumen del marcado en el tubo.
- c. A y B son ciertas.
- d. El volumen de muestra extraído no interfiere en la realización de la muestra.



OSAKIDETZA

2022ko azaroaren 24ko 1827/2022 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa- Lehiaketarako deia (EHAA 246 Zkia. 2022ko abenduaren 27koa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1827/2022 de 24 de noviembre de 2022 (BOPV Nº 246 de 27 de diciembre de 2022)
--	---

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

Proba eguna / Fecha prueba
2023ko irailaren 29an / 29 de septiembre de 2023

43.- ¿Cuál es la secuencia normal en el proceso de trombopoyesis?

- a) Promegacariocito, megacarioblasto, megacariocito y trombocito.
- b) Megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito y plaqueta.
- c) Megacarioblasto, trombocito, promegacariocito y plaqueta.
- d) Megacarioblasto, megacariocito, promegacariocito y plaqueta.

45.- La hemocromatosis:

- a) Puede producirse por una absorción intestinal de hierro excesiva.
- b) Puede darse en anemias hemolíticas.
- c) Puede aparecer por transfusiones sanguíneas múltiples.
- d) Todas son ciertas.

53.- ¿Qué es la anisocitosis plaquetaria?

- a) Un aumento en el número de plaquetas.
- b) Una disminución en el número de plaquetas.
- c) Presencia, en sangre periférica, de plaquetas gigantes.
- d) Presencia, en sangre periférica, de plaquetas de distintos tamaños.

54.- ¿En qué estructura de las plaquetas se encuentra la reserva principal del calcio empleado en la contracción de algunos componentes de las plaquetas?

- a) En la membrana.
- b) En los lisosomas.
- c) En las mitocondrias.
- d) En el sistema tubular denso.

55.- El Factor de von Willebrand:

- a) Se encuentra en los gránulos alfa de los trombocitos.
- b) Interviene en la activación de la vía extrínseca de la coagulación.
- c) Se denomina también f3p (Factor 3 plaquetario).
- d) Es un factor inhibidor de la coagulación.

56.- La plasmina:

- a) Se obtiene tras la activación del plasminógeno.
- b) Destruye los coágulos de fibrina.
- c) Es un enzima poco específico que puede atacar a diversos factores como el factor V y el factor VIII.
- d) Todas son ciertas.

57.- Para realizar el control del tratamiento anticoagulante con dicumarínicos administrados vía oral, se emplea la siguiente prueba:

- a) Determinación enzimática del factor XIII.
- b) TR (Tiempo de Reptilasa).
- c) TP (Tiempo de Protrombina).
- d) TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada).

58.- ¿A qué tipo de alteración se debe la Hemofilia A?

- a) Déficit de factor XI.
- b) Déficit de factor VIII.
- c) Exceso de Fibrinógeno.
- d) Déficit de factor V.

59.- Respecto al fibrinógeno:

- a) Es un factor de coagulación presente en el suero.
- b) Es el factor II de la coagulación.
- c) No es sensible a la trombina.
- d) Es una glucoproteína cuya fracción proteica está constituida por tres pares de cadenaspolipeptídicas.

60.- En las determinaciones cronométricas para el estudio de la coagulación ES FALSO QUE:

- a) Cada prueba está diseñada para que la formación del coágulo dependa de un factor o grupo de factores.
- b) El instrumento utilizado es el coagulómetro.
- c) La mayoría de ellas necesita el uso de una solución de cloruro cálcico para poner en marcha el proceso coagulatorio.
- d) El tiempo de coagulación se acorta si el plasma carece del factor o factores analizados.



27. La deficiencia congénita o disfunción de GPIb-IX-V, está asociada a:

- a. Enfermedad de Von Willebrand.
- b. Hemofilia.
- c. Tromboastenia de Glanzmann.
- d. Síndrome de Bernard-Soulier.

28. Un tiempo de protrombina prolongado nos indica:

- a. Déficit de factor VIII.
- b. Posible existencia de anticoagulante lúpico.
- c. Déficit aislado de factor II.
- d. Enfermedad de Von Willebrand.

29. Ante una alteración prolongada del tiempo parcial de tromboplastina activada(TTPA) podemos encontrar:

- a. Heparina no fraccionada en el plasma.
- b. Posible existencia de anticoagulante lúpico.
- c. Alteración de factores de la vía intrínseca.
- d. Todas son correctas.

84. En la determinación del fibrinógeno en plasma:

- a. Con una concentración elevada de trombina, el tiempo de coagulación del plasma es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno.
- b. Con una concentración disminuida de trombina, el tiempo de coagulación del plasma es directamente proporcional a la concentración de fibrinógeno.
- c. Con una concentración elevada de trombina, el tiempo de coagulación del plasma es directamente proporcional a la concentración de fibrinógeno.
- d. Con una concentración disminuida de trombina, el tiempo de coagulación del plasma es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno.

 Comunidad de Madrid	Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales CONSEJERÍA DE SANIDAD	PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).
CATEGORÍA: T. S. ESP. EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (examen 10-03-2024)		ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA		
ADVERTENCIAS: • No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuademillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). • Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas). • El cuestionario consta de 80 preguntas, más 10 de reserva, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE EXAMEN". • Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. • Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante. • Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. • Las respuestas erróneas serán penalizadas, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas. • Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la "HOJA DE EXAMEN" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. • Para la realización del ejercicio dispone Vd. de 95 minutos desde la señal de comienzo.		

63.- La coagulación intravascular diseminada es una causa de trombocitopenia adquirida de origen periférico debida a:

- A) Distribución anormal.
- B) Hiperconsumo.
- C) Etiología inmune.
- D) A y C son correctas.

PRUEBA ÚNICA:
CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELÉFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.**

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla.**
- **El tiempo de duración de la prueba es de dos horas.**
- **Para abrir este cuadernillo de preguntas, rompa el precinto cuando se indique.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
 - **PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.**
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «prueba teórico-práctica».

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

- Esta prueba consta de **75 preguntas**, numeradas de la 1 a la 75, y **3 preguntas más de reserva**, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica/práctica deben ser contestadas en la

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

45.- ¿Cuál NO se considera una prueba básica para el diagnóstico de una hemofilia?

- A) Hemograma.
- B) Estudio de factores de coagulación.
- C) TTPA.
- D) Dímeros D.

46.- ¿El déficit de qué factor de la coagulación produce la hemofilia A?

- A) Trombina.
- B) Factor IX.
- C) Factor XIII.
- D) Factor VIII.

151.- Cuando se produce agregación plaquetaria, dichas plaquetas segregan una sustancia que se denomina:

- A) Insulina.
- B) Renina.
- C) Bromelina.
- D) Serotonina.



GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Sanidad



salud
servicio aragonés de salud

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 2 de diciembre de 2022 (B.O.A. número 246, de 22 de diciembre de 2022)

CATEGORÍA:
TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **1:50 HORAS**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



99.- Respecto al factor XIII de la coagulación, señale la respuesta correcta:

- A) Es un factor de contacto.
- B) Es el factor estabilizante de la fibrina.
- C) No puede ser activado por la trombina.
- D) Es el factor de contacto predominante en suero.

102.- Las trombopenias pueden ser debidas a varios de los siguientes mecanismos EXCEPTO:

- A) Trombopoyesis ineficaz.
- B) Destrucción de plaquetas circulantes por autoanticuerpos.
- C) Hiperesplenismo.
- D) Trombocitosis plaquetaria por estrés.

Respuestas correctas.

La Rioja – 2019

28.- b)

29.- b)

30.- b)

31.- b)

32.- d)

Andalucía – 2017

62.- a)

63.- c)

Navarra – 2019

67.- b)

68.- d)

69.- b)

Madrid – 2019

1.- d)

18.- c)

66.- ANULADA.

71.- d)

96.- b)

Extremadura – 2022

18.- a)

24.- d)

35.- d)

36.- d)

87.- c)

88.- d)

103.- a)

105.- c)

País Vasco - 2022

47.- b)

49.- d)

50.- d)

51.- a)

52.- d)

53.- d)

Andalucía - 2022

44.- d)

45.- c)

55.- d)

56.- a)

58.- d)

59.- c)

61.- b)

Comunidad Valenciana - 2022

58.- d)

Navarra - 2023

27.- b)

42.- a)

45.- a)

46.- c)

País Vasco - 2023

43.- b)

45.- d)

53.- d)

54.- d)

55.- a)

56.- d)

57.- c)

58.- b)

59.- d)

60.- d)

Castilla y León - 2023

27.- d)

28.- c)

29.- d)

84.- a)

Madrid – 2024

63.- b)

Andalucía – 2024

45.- d)

46.- d)

151.- d)

Aragón – 2024

99.- b)

102.- d)