

F5 인계 요약 보고서 — VP-001

핵심 요약

- 환자: 김서연 (VP-001) — 11회차 (2027-01-12), 총 11세션 · 183일
- 주호소: 잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속
- 위험 플래그: 자살사고 문항(9번) 양성 3회 확인 (1회차, 3회차, 7회차) — 임상 확인 권장
- 최신 설문: PHQ-9 17/27 (중등도-중증) ↓ (22→17, 1회차 대비)
- 주요 우려: 설문 위험 신호와 CTRS 불일치 3회 — 임상 확인 권장

면책 조항

- 자가보고(AI 대화형 문진) 기반 비공식 문서이며 공식 의무기록·의학적 진단이 아닙니다.
- AI 예상질환(하단)은 유사도 기반 참고 정보일 뿐 확률·가능성·진단이 아닙니다.
- 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

위험/안전 평가

당해 세션(11회차, 2027-01-12) 위험평가: 자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아, 그런 생각은 없어요. 그냥 좀 힘들 뿐이지 그 정도는 아니에요. 요즘도 가끔 가슴이 답답하거나 어깨가 뻣근하긴 한데, 죽고... (상세 부록 1 참조). 위기 단계(CTRS) 4/5 — 경도 우려 (준안정). 과거 3회 세션에서 설문 자살사고 문항(9번) 양성/안전 의뢰 신호가 동일 세션 CTRS 상승에 반영되지 않아 불일치가 확인됩니다 — 임상 확인이 권장됩니다.

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

세션	일자	점수	9번 문항	판정
1	2026-07-13	22/27	양성	불일치
3	2026-07-27	22/27	양성	불일치
7	2026-09-14	19/27	양성	불일치

최신 시행 척도 안내: 당해 세션에 F3 문진이 시행되어 별도 최신성 안내가 필요하지 않습니다.

주호소 및 현병력

주호소: 잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속

현병력: 잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 아무것도 하고 싶지 않고 운동도 거의 하지 않음. 가슴 답답함, 어깨·목 뻣근함은 주 2-3회, 큰 일 있을 때 발생하며, 여행 후 기분 개선되었으나 스트레스가 완전히 사라지지 않고 회복이 느린 느낌

정신상태검사 (MSE)

텍스트 문진 특성상 관찰 기반 MSE는 평가 불가; 대화에서 도출된 소견 없음

전체 세션 요약

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상과의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

슬롯	최신값
주호소	잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속
현병력	잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 아무것도 하고 싶지... (상세 부록 2 참조)
정신과 과거력	정신과 진료나 심리상담을 받아본 적 없음
신체질환/신경학적 병력	건강검진에서 혈압이 높게 나온 적이 있으나 병원 진료나 약 복용은 없음
개인사/사회력	회사 동료 2-3명과 점심 시간에 스트레스 관련 대화, 집에서 일할 때 상황 공유. 어머니와는 주 2회 통화하며 위로와 이야기 나눔. 혼자 감당... (상세 부록 3 참조)
가족력	미수집

음주·흡연·물질사용	주 1-2회 맥주 한 캔 정도 마심, 카페인은 평소보다 조금 줄였으나 수면제나 진정제는 전혀 사용하지 않음
위험평가	자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아, 그런 생각은 없어요. 그냥 좀 힘들 뿐이지 그 정도는 아니에요. 요즘도 가끔 가슴이 답… (상세 부록 4 참조)

주요 경과

- 주소: S1: '잠을 잘 못 자서 눕자마자 바로 자는 게 아니라 한 시간은 뒤척이고, 새벽에 두세 번 깨며 아침에 일어나도…' → S6: '잠들기 전 머릿속 복잡함과 새 프로젝트로 인한 긴장 지속' → S11: '잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번…'

- 병력: S1: '회사 프로젝트 데드라인이 다가오면서부터 시작된 수면 문제로, 아침을 자주 거르게 되고 식욕이 줄었으며, 회사…' → S6: '새 프로젝트 시작 후 데드라인이 빡빡해지면서 긴장이 풀리지 않고, 잠들기 전 머릿속이 복잡하며 아침에 눈 뜨…' → S10: '잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과…'

- 개인사/사회력: S1: '회사 동료 2-3명과 괜찮은 편, 어머니와 주 2회 통화' → S5: '회사 동료 2-3명과 점심 시간에 스트레스 관련 대화, 집에서 일할 때 상황 공유. 어머니와는 주 2회 통화…'

시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 17/27 (중등도-중증) — 11회차 (2027-01-12)

응답: 2,2,3,3,2,2,1,0

자살사고 문항(9번): 음성 | 문진 방식: natural

종단 추세 — 전체 방향: 개선

전체 방향은 척도·위기단계·정서 방향의 다수결로 계산되며, 악화 신호가 하나라도 있으면 악화로 우선 판정합니다. 정서 포함 여부에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

항목	방향	근거
PHQ-9 총점	개선	PHQ-9: 세션 1→11: 22 → 17 (-5)
위기 단계(CTRS)	변화 없음	세션 1→11: 4 → 4 (+0)
감성 점수	개선	세션 1→11: -0.477273 → -0.35 (+0.127)
문진 항목 충족도	개선	세션 1→11: 4 → 7 (+3)

- 위기 반응 발생 세션 없음
- 위험 고조 세션 중 설문 미시행 사례 없음
- 종단 추세 일관성(설문·CTRS·감성): 일치

추세 차트

VP-001_20260715_120304_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 종단 추이 — VP-001 VP-001




그림 1. 설문 총점·위기 단계(CTRS)·정서·문진 충족도 추이 (11세션, 183일) — 위기 단계는 값이 낮을수록(1에 가까울수록) 위험이 높습니다.

VP-001_20260715_120304_temporal_ctrs_zoom.png

F4 위기단계(CTRS) 확대 — VP-001

VP-001





그림 2. 위기 단계(CTRS) 확대 추이 — 1(최긴급)에 가까울수록 위험, 5(안정)에 가까울수록 안정적입니다.

VP-001_20260715_120304_temporal_disease_similarity.png

질환 유사도 추이 (F4, 질환별) VP-001




점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호. VAL-014(미해결): F2 질환 후보 산출의 타당성이 아직 검증되지 않았습니다 — 이 추이는 노이즈가 포함된 입력을 기반으로 계산되며, 임상적 추이 해석 용도로 사용할 수 없습니다.

그림 3. 세션별 질환 유사도 추이 — 점선·저채도 선은 참고용 유사도 신호일 뿐이며 확률·가능성·진단이 아닙니다.

VP-001_20260715_120304_temporal_domain_confidence.png

진료과 후보 신뢰도 추이 (F4, 진료과별) VP-001



점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호.

그림 4. 세션별 진료과 후보 신뢰도 추이 — 값이 높을수록 해당 진료과 매칭 신뢰도가 높습니다.

AI 참고 정보 (비진단)

⚠ 유사도(similarity)일 뿐 확률·가능성·신뢰도가 아닙니다 — 임상 판단 대체 불가.

순위	질환	유사도
공동 1위	계절성 정동장애	0.485
공동 1위	월경전 불쾌장애	0.485
3	범불안장애	0.477

기타 후보: 우울 삽화(우울증)(0.457), 소아·청소년 우울증(0.457)

disclaimer: 이 정보는 AI가 생성한 참고용 예상 질환 후보이며 의학적 진단이 아닙니다. 함께 제공되는 설문

추천(recommended_questionnaire) 역시 초기 상담(인테이크) 지원을 위한 척도 제안일 뿐, 진단적 판단이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

권장 진료과 및 후속 조치

이번 실행에서는 진료과 후보가 산출되지 않았습니다(후보 검증 단계에서 제외됨). 원 데이터는 각주 참조.

추천 설문: PHQ-9 — PHQ-9 screens depressive-symptom burden only, does not screen manic/hypomanic symptoms — bipolar-spectrum presentations need clinician follow-up regardless of score.

약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

임상 종합 소견

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

상세 부록

1. 위험평가 발화 원문 (당해 세션)

자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아, 그런 생각은 없어요. 그냥 좀 힘들 뿐이지 그 정도는 아니예요. 요즘도 가끔 가슴이 답답하거나 어깨가 뻐근하긴 한데, 죽고 싶다거나 스스로..."

2. 현병력 최신값 전문

잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 아무것도 하고 싶지 않고 운동도 거의 하지 않음. 가슴 답답함, 어깨·목 뻐근함은 주 2-3회, 큰 일 있을 때 발생하며, 여행 후 기분 개선되었으나 스트레스가 완전히 사라지지 않고 회복이 느린 느낌

3. 개인사/사회력 최신값 전문

회사 동료 2-3명과 점심 시간에 스트레스 관련 대화, 집에서 일할 때 상황 공유. 어머니와는 주 2회 통화하며 위로와 이야기 나눔. 혼자 감당하려는 것보다는 동료와의 대화가 도움이 된다고 생각함

4. 위험평가 최신값 전문

자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아, 그런 생각은 없어요. 그냥 좀 힘들 뿐이지 그 정도는 아니예요. 요즘도 가끔 가슴이 답답하거나 어깨가 뻐근하긴 한데, 죽고 싶다거나 스스로..."

슬롯별 전체 변화 이력 (미압축)

주호소

S1: '잠을 잘 못 자서 눕자마자 바로 자는 게 아니라 한 시간은 뒤척이고, 새벽에 두세 번 깨며 아침에 일어나도 피로함이 가시지 않음' → S4: '잠을 잘 자고 업무 집중도 개선되었으나 가끔 '다음엔 어쩌지' 하는 생각이 스쳐감' → S5: '새 프로젝트 시작 후 일정 뻘뻘함으로 인한 긴장 지속, 잠들기 전 머릿속 복잡함, 아침 기상 시 '또 시작이네' 하는 생각' → S6: '잠들기 전 머릿속 복잡함과 새 프로젝트로 인한 긴장 지속' → S7: '가슴 답답함, 어깨·목 뻐근함, 수면 문제' → S10: '잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간 정도 뒤척이고 새벽에도 두세 번 깨며, 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 일상까지 힘겹게 느껴짐' → S11: '잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속'

현병력

S1: '회사 프로젝트 데드라인이 다가오면서부터 시작된 수면 문제로, 아침을 자주 거르게 되고 식욕이 줄었으며, 회사에서 집중이 잘 안 되어 실수가 늘고 선임에게 지적을 받음. 퇴근 후에는 무기력해져 운동도 거의 하지 못함' → S2: '회사 프로젝트 데드라인이 다가오면서 시작된 수면 문제로, 아침을 자주 거르고 식욕이 줄었으며, 회사에서 집중이 잘 안 되어 실수가 늘고 선임에게 지적을 받음. 퇴근 후에는 무기력해져 운동도 거의 하지 못함. 프로젝트 데드라인 종료 후에도 완전히 마음이 풀리지 않고 '다음엔 어쩌지' 하는 걱정이 남아 긴장이 풀리지 않으며, 수면과 기분에도 영향을 미치고 있음. 아침을 자주 거르고 식욕이 조금 줄어든 상태' → S5: '새 프로젝트 시작 후 데드라인이 더 뻘뻘해지면서 긴장이 풀리지 않고, 잠들기 전 머릿속이 복잡하며 아침에 눈 뜨면 '또 시작이네' 하는 생각이 먼저 들. 지난번 프로젝트 종료 후에는 긴장이 풀렸으나 이번에는 끝날 때까지 긴장이 지속될 것 같아 걱정됨. 아침을 거르는 날이 많고 식욕이 줄어듦. 가슴 답답함과 목 뻐근함이 동반됨' → S6: '새 프로젝트 시작 후 데드라인이 뻘뻘해지면서 긴장이 풀리지 않고, 잠들기 전 머릿속이 복잡하며 아침에 눈 뜨면 '또 시작이네' 하는 생각이 들. 가슴 답답함과 어깨·목 뻐근함이 동반되며 식욕이 줄어듦. 지난번 프로젝트 종료 후에는 긴장이 풀렸으나 이번에는 끝날 때까지 긴장이 지속될 것 같아 걱정됨' → S8: '프로젝트 마감 시 긴장 및 수면 장애, 목·어깨 뻐근함 발생. 현재는 여행 후 기분 개선되었으나 잠들기 전 머릿속 복잡함으로 1시간 정도 뒤척임. 가슴 답답함과 목 뻐근함은 주 2-3회, 큰 일 있을 때 발생. 스트레스가 완전히 사라지지 않고 회복이 느린 느낌' → S10: '잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 아무것도 하고 싶지 않고 운동도 거의 하지 않음. 가슴 답답함, 어깨·목 뻐근함은 주 2-3회, 큰 일 있을 때 발생하며, 여행 후 기분 개선되었으나 스트레스가 완전히 사라지지 않고 회복이 느린 느낌'

개인사/사회력

S1: '회사 동료 2-3명과 괜찮은 편, 어머니와 주 2회 통화' → S5: '회사 동료 2-3명과 점심 시간에 스트레스 관련 대화, 집에서 일할 때 상황 공유. 어머니와는 주 2회 통화하며 위로와 이야기 나눔. 혼자 감당하려는 것보다는 동료와의 대화가 도움이 된다고 생각함'

모델: solar-pro3-260323 · 생성 시각: 2026-07-15T12:03:05.827233 · 세션ID: f1_VP-001_followup

설문 문항 출처: v1, verbatim Pfizer/phqscreeners.com Korean PHQ-9 PDF, retrieved 2026-07-13 (item_bank_v1_sources.md § 1.2/ § 1.3, appendix § A1); translation chosen per ADR-033 decision 1 (Seo & Park 2015's Korean validation study administered this same translation)

시스템 참고 (내부 감사용, 임상 판단 근거 아님)

중단 추세 판정 근거: overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4:._overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는

trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.

권장 진료과 미산출 원문(감사용): 정보 없음 — 후보가 스키마 검증 오류로 제외됨 (validation_errors 존재, VAL-016/BUG-031 계열). 모델이 후보를 찾지 못했다는 의미가 아니라, 상위 F2 단계에서 이미 생성된 후보가 스키마 검증 실패로 삭제되었을 가능성이 있습니다.