
(a)
$|\boldsymbol{\kappa}|^2 n_c(\boldsymbol{\kappa}, t_f)$
$|\boldsymbol{\kappa}|$
$\alpha = 0.8$
$\alpha = 0.9$
circular, valley K
circular, valley K'
linear, $\boldsymbol{\kappa} \perp \mathbf{e}_1$
analytical C_α
(b)
$n_c(\boldsymbol{\kappa}, t_f)$, linear polarisation
$|\boldsymbol{\kappa}|$
$\alpha = 0.8$, $\boldsymbol{\kappa} \perp \mathbf{e}_1$
$\alpha = 0.8$, $\boldsymbol{\kappa} \parallel \mathbf{e}_1$
$\alpha = 1$, $\boldsymbol{\kappa} \perp \mathbf{e}_1$
$\alpha = 1$, $\boldsymbol{\kappa} \parallel \mathbf{e}_1$
−2
−4
−6
(c)
circular polarisation ($\zeta = 1$)
density at t_f $((\omega_0/v_F)^2)$
cutoff κ_c
$\alpha = 1$
$\alpha = 0.9$
$\alpha = 0.8$
$N_K + N_{K'}$
$N_K - N_{K'}$
dotted: slope $2\langle C_\alpha \rangle / \pi$
(d)
circular polarisation, $\boldsymbol{\kappa} \parallel x$
$C_\alpha(t_f) = \lim |\boldsymbol{\kappa}|^2 n_c$
window length $\omega_0(t_f - t_0)$
$\alpha = 0.8$
$\alpha = 0.9$
analytical, rates of the benchmark
analytical, $\tilde{\Gamma}_\downarrow = \tilde{\Gamma}_\phi = 0$
simulation, $|\boldsymbol{\kappa}| = 32$