AMWC CHINA AESTHETIC & ANTI-AGING MEDICINE WORLD CONGRESS | AMWC China 2026 世界美容抗衰老大会

RETOXIN 2026

芮妥欣®在中国真实世界注射中的短期疗效、安全性及注射实践特征

Information Classification: General

声明：

本文件为欣可丽美学（上海）医疗科技有限公司版权所有，禁止拍摄、拷贝或者以任何形式进行传播。本文件仅供与医学专业人士科学交流使用，禁止他用。医疗卫生专业人士应当结合其所在的司法辖区的相关法律法规的规定、个人经验进行甄别借鉴。您阅读本文件将视为您同意遵守保密义务，不得将本文件所涉内容对外传播，针对违反本约定行为，欣可丽美学（上海）医疗科技有限公司保留追究权利。

Information Classification: General

稀释研究概述

1 研究目的

评估芮妥欣®在真实世界美学注射中的有效性、安全性及受试者满意度。


2 数据来源

回顾性分析了2026年4月28日至2026年6月11日14家中国医美机构及医院中接受芮妥欣®美容注射治疗且完成至少1次随访的受试者患者的临床资料。

3 入组标准

1. 年龄≥18岁；
2. 接受注射用重组A型肉毒毒素芮妥欣®注射治疗；
3. 有完整基线数据；
4. 至少完成1次疗效随访；
5. 已签署机构要求的知情同意文件（如适用）。

4 分析流程图



Confidential information

Information Classification: General

1.
2. * onabotulinumtoxinA （ona）

人口统计学资料及既往医美治疗史分析

人口统计学资料

年龄

32.82 ± 5.70

性别




BMI（kg/m²）


22.48± 5.11

既往医美治疗史


既往医美治疗史




肉毒毒素治疗史




光声电治疗史




既往注射频次



填充类项目治疗史



其他



Confidential information

Information Classification: General

治疗人群以中重度皱纹为主，逾50%受试者接受上面部（眉间纹、额纹、鱼尾纹）联合治疗


评分	上面部动态纹评分细则
0分（无）	最大表情状态下无可见动态皱纹
1分（轻度）	最大表情状态下可见可见纹路，但褶皱不明显
2分（中度）	最大表情状态下可见可见纹路和褶皱
3分（重度）	最大表情状态下无法从表面看到皱纹的底部

中重度皱纹是治疗的主要人群


- 分析的92名受试者中有**81**名接受了上面部皱纹注射，眉间纹、额纹、鱼尾纹的注射人数分别为**76人**、**62人**、**51人**，同时注射了上面部3个部位的人数为**44人**。
- 临床研究中**中重度**皱纹为入选标准，各皱纹类型中均存在一定比例的轻度受试者注射的需求，但整体仍以中重度为主。眉间纹、额纹、鱼尾纹的中重度比例分别为**97.4%**、**87.1%**、**92.2%**。

Confidential Information


动态眉间纹严重程度评分



动态额纹的严重程度评分



动态鱼尾纹的严重程度评分



Information Classification: General


中度及以上咬肌肥大的受试者是接受治疗的主要人群

中度及以上严重程度的受试者是接受注射的主要人群

- 共有**33**人接受咬肌肥大的注射。
- 咬肌肥大严重程度以中度及以上为主，**中度及以上**占整体人群的**93.9%**。
- 临床研究主要纳入咬肌肥大程度为显著或非常显著的受试者，而在真实世界临床实践中，**中度**咬肌肥大患者是接受治疗的主要人群


咬肌严重程度评分

轻微　轻度　中度　显著　非常显著



Confidential information

咬肌严重程度评分



Information Classification: General


50%以上的动态皱纹人群伴有静息时皱纹

评分	上面部静态纹评分细则
0分（无）	放松状态下无可见静息时皱纹
1分（轻度）	放松时可见浅表细纹，不连续，皮肤拉伸后完全消失
2分（中度）	放松时可见清晰皱纹，连续或多条，皮肤拉伸后部分减轻但仍存在
3分（重度）	放松时存在深刻、固定性皱纹，呈沟状，皮肤拉伸后改善不明显或无改善


超过半数的人群和合并静息时皱纹

- 有***61.8%***合并静息时眉间纹。
- 有***54.8%***合并静息时额纹。
- 有***62.7%***合并静息时鱼尾纹。


静息时眉间纹严重程度评分



静息时额纹的严重程度评分



静息时鱼尾纹的严重程度评分



Confidential information

Information Classification: General

不同稀释浓度组人群基线特征保持一致

稀释治疗组间基线无统计学差异

- 92例受试者中，21名受试者采用100U/1.25ml浓度稀释治疗，58名受试者采用100U/2.5ml浓度稀释治疗，其余受试者以其他浓度稀释。
- 本回顾性研究分析了两组的基线特征：最大皱眉时研究者评估的**眉间纹**基线的严重程度存在一定**不平衡**，在基线人口学数据及其他动态皱纹及咬肌肥大的严重程度评分上无统计学差异。

P值与SMD

- P值：评估差异是否由随机误差导致？但高度依赖样本量。
- SMD：样本量较小时，需要采用基线特征组间比较采用标准化均数差（SMD）评估均衡性
- **鉴于本研究样本量有限且组间例数不平衡，P值可能因检验效能不足而存在假阴性风险，故以SMD作为主要判定依据**

Confidential information

表1 稀释浓度的组间基线数据

	100U/1.25ml (n=21)	100U/2.5ml (n=58)	P 值	SMD
人口学数据				
年龄，均值±标准差	32.86 (3.76)	33.29 (6.34)	0.802	0.030
性别（女），例数（比例）	16 (76.2%)	44 (78.6%)	0.766	0.075
BMI，均值±标准差	22.45 (5.64)	22.44 (5.35)	0.629	0.017
严重程度评分				
眉间纹，均值±标准差	2.59 (0.49)	2.29 (0.54)	0.072	0.526
额纹，均值±标准差	2.43 (0.62)	2.15 (0.70)	0.315	0.327
鱼尾纹，均值±标准差	2.42 (0.64)	2.36 (0.64)	0.808	0.079
咬肌肥大严重程度评分	3.57 (0.90)	3.50 (0.92)	0.976	0.073

Information Classification: General

常见100U使用场景为下颌缘与其他部位的联合治疗组合

表1 单部位注射剂量

	眉间纹 (n=76)	额纹 (n=62)	鱼尾纹 (n=51)	咬肌 (n=33)	下颌缘 (n=39)
注射剂量					
均值±标准差	18.46(6.64)	14.26(5.56)	16.55(6.39)	54.03(21.31)	52.00(21.17)
中位数(Q1,Q3)	16 (14.75, 20)	14 (8.5, 19.5)	16 (12, 21)	56 (36, 66)	50 (40, 69)
最小值，最大值	6, 40	4, 30	1, 32	16, 100	16, 96

表2 组合部位注射剂量

	上面部 (n=44)	咬肌&下颌缘 (n=7)	上面部&下颌缘 (n=20)	上面部&咬肌&下颌缘 (n=10)
注射剂量				
均值（标准差）	48.82 (13.21)	88.57 (13.76)	95.10 (22.74)	117.40 (25.91)
中位数(Q1,Q3)	50(40, 58.5)	96(80, 100)	100(80, 103)	100(100, 144.5)
最小值,最大值	15, 73	64, 100	56, 136	94, 160

Confidential information

Information Classification: General

有效性：研究者评估治疗1个月，近100%受试者皱纹严重程度评分达到无或轻

有效性数据:

- 注射后1周，各部位严重程度达到无/轻度的比例已超过85%，严重程度评分改善≥1级的比例均超过98%；
- 注射后1月，最大微笑时的鱼尾纹严重程度评分均达到100%的受试者实现无/轻度状态及改善≥1级，最大皱眉时眉间纹严重程度评分相应比例分别达到97.4%和98.7%；最大抬眉时额纹严重程度评分相应比例分别达到100%和98.4%；




图1. 研究者评估严重程度达到无/轻度的比例




图2. 研究者评估严重程度改善≥1级的比例

Confidential information

Information Classification: General

有效性：受试者评估治疗1个月，超过90%受试者皱纹严重程度评分达到无或轻

有效性数据:

- 注射后1周，各部位严重程度达到无/轻度的比例已超过70%，严重程度评分改善≥1级的比例均超过80%；
- 注射后1月，最大皱眉时眉间纹、最大抬眉时额纹和最大微笑时的鱼尾纹严重程度评分均超过90%的受试者实现无/轻度状态及改善≥1级。




图1. 受试者评估严重程度达到无/轻度的比例




图2. 受试者评估严重程度改善≥1级的比例

Confidential information

Information Classification: General

100%同时接受上面部皱纹(GFL/HFL/LCL)受试者治疗1月后严重程度均达到无或轻

有效性数据:

- 共44名受试者同时接受上面部眉间纹、额纹、鱼尾纹治疗，治疗1周时，超过95%的受试者3个部位皱纹的严重程度评分均达到改善≥1级。
- 治疗1月后，100%的受试者同时达到达到最大皱眉时眉间纹，最大抬眉时额纹、最大微笑时鱼尾纹无或轻的严重程度评分。




图1. 同时达到严重程度达到无或轻的受试者比例




图2. 同时达到严重程度改善≥1级的受试者比例

Confidential information

Information Classification: General

起效迅速：最快当日起效，中位起效时间仅2天

起效速度迅速：

- 1/6的受试者注射当日起效，中位起效时间仅2天
- 注射后第3日，超过95%的受试者已观察到疗效改善





图1. 起效时间

N=79

Confidential information



最快起效时间

注射当日　　注射后第 *1* 日

中位起效时间

注射后第 *2* 日　　注射后第 *3* 日

Information Classification: General

*：REFINE研究为芮妥欣（重组A型肉毒毒素）注册III期临床试验

100U/2.5mL 与 100U/1.25mL 稀释方案对上面部皱纹有效性呈现一致性改善趋势

有效性影响结果：

不同稀释浓度在动态额纹、鱼尾纹及咬肌肥大治疗中的疗效比较结果显示，两种稀释方案在注射后短期及中期随访中均表现出一致的临床改善趋势。100U/2.5ml治疗组中眉间纹的有效性改善显著优于100U/1.25ml稀释组的数据，眉间纹评分的组间差异可能部分归因于基线严重程度不均衡。

表1 稀释浓度对皱纹改善≥1级的影响

	100U/1.25ml (n=21)	100U/2.5ml (n=58)	P 值
注射后1周			
眉间纹，n（%）	16 (100.0%)	48 (98.0%)	0.565
额纹，n（%）	13 (100.0%)	39 (100.0%)	-
鱼尾纹，n（%）	12(100.0%)	33 (100.0%)	-
注射后1月			
眉间纹，n（%）	15 (93.8%)	50 (100.0%)	0.075
额纹，n（%）	13 (100.0%)	38 (97.4%)	0.560
鱼尾纹，n（%）	12 (100.0%)	33 (100.0%)	-

表2 稀释浓度对皱纹改善达到无或轻受试者比例的影响

	100U/1.25ml (n=21)	100U/2.5ml (n=58)	P 值
注射后1周			
眉间纹，n（%）	12 (75.0%)	46 (93.9%)	0.034
额纹，n（%）	9 (69.2%)	34 (87.2%)	0.138
鱼尾纹，n（%）	8 (75%)	30 (90.9%)	0.128
注射后1月			
眉间纹，n（%）	15 (87.5%)	50 (100.0%)	0.011
额纹，n（%）	13 (100.0%)	39 (100.0%)	-
鱼尾纹，n（%）	12 (100.0%)	33 (100.0%)	-

注：采用100U/1.25ml稀释浓度，治疗眉间纹、额纹、鱼尾纹的人数分别为16人，13人、12人。采用100U/2.5ml稀释浓度，治疗眉间纹、额纹、鱼尾纹的人数分别为50人、39人、33人。

Confidential information

Information Classification: General

100U/2.5mL 与 100U/1.25mL 稀释方案对咬肌肥大疗效没有显著性差异

有效性影响结果：

不同稀释浓度在咬肌肥大改善改善≥1级及达到无或轻受试者比例无统计学差异。

表1 稀释浓度对咬肌肥大改善≥1级的影响

	100U/1.25ml (n=7)	100U/2.5ml (n=20)	P 值
注射后1周			
咬肌，n（%）	7 (100.0%)	18 (90%)	0.536
注射后1月			
咬肌，n（%）	7 (100.0%)	20 (100.0%)	-

表2 稀释浓度对咬肌肥大达到无或轻受试者比例的影响

	100U/1.25ml (n=7)	100U/2.5ml (n=20)	P 值
注射后1周			
咬肌，n（%）	3 (42.9%)	4 (20%)	0.266
注射后1月			
咬肌，n（%）	5 (71.4%)	11 (55.0%)	0.446

Confidential information

Information Classification: General

超过90%的静息状态皱纹在治疗1个月后得到改善




图1.研究者评估静息眉间纹严重程度评分改善≥1级的受试者比例




图2 研究者评估静息额纹严重程度评分改善≥1级的受试者比例





图3 研究者评估静息鱼尾纹严重程度评分改善≥1级的受试者比例

Confidential information

Information Classification: General

芮妥欣 vs. 既往肉毒产品：注射部位疼痛评分显著降低

VAS（视觉模拟评分法）：是在一条0-10分的直线上，由受试者根据自身疼痛程度标记位置，0分表示"无痛"，10分表示"最剧烈的疼痛"。



Confidential information

此次注射后的注射部位疼痛评分：

2.97

既往注射后的注射部位疼痛评分：

4.16

- **与既往注射经历比较**：芮妥欣注射部位疼痛VAS评分显著低于受试者既往肉毒毒素注射时的疼痛评分（$P<0.001$）
- **组间比较**：不同稀释浓度治疗组间注射部位疼痛评分差异无统计学意义

Information Classification: General

各随访时间点均显示高患者满意度

受试者满意度评分：

- 7分制患者满意度评分量表
- 沿用REFINE III期临床研究评分
- 计算评分达到≥6分的受试者比例。

分级	满意度
1	非常不满意
2	不满意
3	有点不满意
4	勉强
5	比较满意
6	满意
7	十分满意

结果：

- 肉毒毒素治疗组受试者整体满意度评分较高
- 不同治疗组间满意度水平相当
- 与REFINE III期临床研究报道的受试者满意度结果一致




图1. 整体受试者满意度




图2. 上面部皱纹治疗的受试者满意度




图3. 组合部位治疗的受试者满意度

Confidential information

Information Classification: General

安全性

本真实世界研究中未观察到严重不良事件，不良反应类型及发生情况均未超出同类产品说明书已知安全性范围，未发现新的安全性信号。

整体而言，芮妥欣的安全性、耐受性良好。

Confidential information

Information Classification: General

AMWC CHINA
AESTHETIC & ANTI-AGING MEDICINE WORLD CONGRESS

AMWC China 2026
世界美容抗衰老大会

THANKS

获取行业及大会资讯
扫码关注官方公众号

Information Classification: General