
 <p>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</p> <p>RECEITUÁRIO – DENGUE PLANO A/B (Crianças < 13 anos)</p>	
Nome:	Reg.:
<p>Uso Oral:</p> <p>1. Paracetamol 200mg/ml mg _____ (____) frasco(s) Tomar _____ gotas de 6 x 6 horas se febre ou dor.</p> <p>ou</p> <p>2. Dipirona 500mg/ml _____ (____) frasco(s) Tomar _____ gotas de 6 x 6 horas se febre ou dor.</p> <p>3. Ondansetrona 4mg (comprimido orodispersível) ____ (____) comprimidos Tomar 1 comprimido de 8x8 horas se presença de náuseas e/ou vômitos.</p> <p>4. Solução salina (reidratação oral) _____ (____) envelopes</p> <p>TOTAL DE LÍQUIDOS A SEREM TOMADOS POR DIA: _____ litros.</p> <p>Desse total, um terço (1/3) ____ litro(s) será de reidratante oral (o líquido que você dissolveu do envelope) e os dois terços restantes (2/3) ____ litros, serão de <u>líquidos caseiros</u> (que você pode ter em casa ou fazer para criança).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ATENÇÃO: Logo após sair do primeiro atendimento, ofereça à criança ____ ml nas primeiras 4 a 6 horas e distribua o restante, ____ ml, ao longo do dia. Nos dias seguintes você pode ir fracionando e oferecer aos poucos, como desejar.</p> <p>Líquidos caseiros podem ser: água, sucos de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc. Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas após o desaparecimento da febre.</p> <p>Receita de Soro caseiro: Em 1 litro de água mineral, filtrada ou fervida (depois de esfriar), misture 1 colher de sopa de açúcar (20g) e 1 colher de café de sal (3,5g). Mexa bem!</p> </div> <p>ESTEJA ATENTO AOS SINAIS DE ALARME DESCRITOS NO CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO!</p>	
Data:	Assinatura e Carimbo

 <p>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</p> <p>RECEITUÁRIO – DENGUE PLANO A/B (Crianças < 13 anos)</p>	
Nome:	Reg.:
<p>Uso Oral:</p> <p>1. Paracetamol 200mg/ml mg _____ (____) frasco(s) Tomar _____ gotas de 6 x 6 horas se febre ou dor.</p> <p>ou</p> <p>2. Dipirona 500mg/ml _____ (____) frasco(s) Tomar _____ gotas de 6 x 6 horas se febre ou dor.</p> <p>3. Ondansetrona 4mg (comprimido orodispersível) ____ (____) comprimidos Tomar 1 comprimido de 8x8 horas se presença de náuseas e/ou vômitos.</p> <p>4. Solução salina (reidratação oral) _____ (____) envelopes</p> <p>TOTAL DE LÍQUIDOS A SEREM TOMADOS POR DIA: _____ litros.</p> <p>Desse total, um terço (1/3) ____ litro(s) será de reidratante oral (o líquido que você dissolveu do envelope) e os dois terços restantes (2/3) ____ litros, serão de <u>líquidos caseiros</u> (que você pode ter em casa ou fazer para criança).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ATENÇÃO: Logo após sair do primeiro atendimento, ofereça à criança ____ ml nas primeiras 4 a 6 horas e distribua o restante, ____ ml, ao longo do dia. Nos dias seguintes você pode ir fracionando e oferecer aos poucos, como desejar.</p> <p>Líquidos caseiros podem ser: água, sucos de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc. Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas após o desaparecimento da febre.</p> <p>Receita de Soro caseiro: Em 1 litro de água mineral, filtrada ou fervida (depois de esfriar), misture 1 colher de sopa de açúcar (20g) e 1 colher de café de sal (3,5g). Mexa bem!</p> </div> <p>ESTEJA ATENTO AOS SINAIS DE ALARME DESCRITOS NO CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO!</p>	
Data:	Assinatura e Carimbo