

IDADES	VACINAS	LOCAIS
AO NASCER	BCG ¹	ID-INSERÇÃO INFERIOR DO DELTÓIDE DIREITO
	HEPATITE B ²	IM – V.L.C. DIREITA
2 MESES	PENTA ³	IM – V.L.C ESQUERDA
	VIP ⁴	IM – V.L.C. DIREITA
	PNEUMOCÓCICA 10 ⁶	IM – V.L.C. DIREITA
	ROTAVIRUS ⁵	ORAL
3 MESES	MENINGITE C ⁷	IM – V.L.C ESQUERDA
4 MESES	PENTA ³	IM – V.L.C. DIREITA
	VIP ⁴	IM – V.L.C ESQUERDA
	PNEUMOCÓCICA 10 ⁶	IM – V.L.C ESQUERDA
	ROTAVIRUS ⁵	ORAL
5 MESES	MENINGITE C ⁷	IM – V.L.C. DIREITA
6 MESES	PENTA ³	IM – V.L.C ESQUERDA
	VIP ⁴	IM – V.L.C. DIREITA
9 MESES	FEBRE AMARELA ⁹	SC – DELTÓIDE DIREITO
12 MESES	TRÍPLICE VIRAL ¹⁰	SC – DELTÓIDE ESQUERDO
	PNEUMOCÓCICA 10 ⁶	IM – V.L.C ESQUERDA
	MENINGITE C ⁷	IM – V.L.C. DIREITA
15 MESES	DTP ³	IM – V.L.C. DIREITA
	HEPATITE A ¹²	IM – V.L.C ESQUERDA
	TRÍPLCE VIRAL ¹⁰	SC – DELTÓIDE ESQUERDO
	VARICELA ¹⁸	SC – DELTÓIDE DIREITO
	VOP ⁴	ORAL
4 ANOS	DTP ³	IM – V.L.C ESQUERDA
	VARICELA ¹⁸	SC – DELTÓIDE ESQUERDO
	FEBRE AMARELA ⁹	SC – DELTÓIDE DIREITO
	VOP ⁴	ORAL
9 ANOS A 14 ANOS	HPV ¹³	IM – DELTÓIDE DIREITO
11 ANOS E 12 ANOS	MENINGITE ACWY ⁸	IM – DELTÓIDE ESQUERDO
ADULTOS	HEPATITE B ²	IM – DELTÓIDE DIREITO
	FEBRE AMARELA ⁹	SC – DELTÓIDE DIREITO
	DT ¹⁴	IM – DELTÓIDE ESQUERDO
	TRÍPLICE VIRAL ¹⁰	SC – DELTÓIDE ESQUERDO
GESTANTES	DTPA	IM – DELRÓIDE ESQUERDO
	HEPATITE B	IM – DELTÓIDE DIREITO
IDOSOS (60 anos e mais) IMUNOCOMPROMETIDOS	PNEUMOCÓCICA 23 ¹⁷ INFLUENZA ¹⁶	IM – DELTÓIDE IM – DELTÓIDE

OBSERVAÇÕES:

- (1) **Vacina BCG:** Administrar o mais precocemente possível, a partir de 2 kg. Na rotina dos serviços administrar até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
- (2) **Vacina Hepatite B (recombinante):** Administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento, ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos menores de 33 semanas de gestação ou menor de 2 kg, seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses de vida. Adolescentes, adultos e idosos, independentemente da idade e ou condições de vulnerabilidade devem receber 3 doses, seguindo o esquema de 0, 1 e 6 meses. As gestantes não vacinadas, independentemente da faixa etária e idade gestacional, devem receber três doses da vacina com esquema 0,1 e 6 meses. Aquelas que apresentarem esquema vacinal incompleto devem apenas completar o esquema já iniciado.
- (3) **Vacina Penta (DTP/Hib/Hep.B):** Administrar aos 2, 4 e 6 meses de idade. Intervalo entre as doses de 60 dias e, mínimo de 30 dias. Os reforços aos 15 meses (1º) e 4 anos (2º) devem ser feitos com a vacina DTP. Importante: a idade máxima para administrar esta vacina é 6 anos 11 meses e 29 dias.
- (4) **Vacina contra Poliomielite:** Administrar 1ª, 2ª e 3ª doses com VIP e os reforços aos 15 meses (1º) e 4 anos (2º) com VOP. Manter o intervalo entre as doses de 60 dias e, mínimo de 30 dias. Considerar para o reforço o intervalo mínimo de 6 meses após a última dose.
- (5) **Vacina Oral Rotavirus Humano:** Administrar duas doses (2 e 4 meses) seguindo rigorosamente os limites de faixa etária. Primeira dose a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Segunda dose a partir de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias. O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias. Nenhuma criança poderá receber a segunda dose sem ter recebido a primeira. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação não repetir dose.
- (6) **Vacina Pneumocócica 10 valente:** Administrar 2 doses aos 2 e 4 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias, e mínimo de 30 dias. Fazer um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrado até aos 4 anos de idade. Para crianças de 12 meses a 4 anos não vacinados, administrar dose única.
- (7) **Vacina Meningocócica C:** Administrar duas doses aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias. Fazer um reforço preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrado até aos 04 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinados, administrar dose única.
- (8) **Vacina Meningocócica ACWY:** Administrar para meninos e meninas uma dose entre 11 e 12 anos, para fins de registro considerar dose única ou reforço conforme situação vacinal.
- (9) **Vacina Febre Amarela:** Administrar duas doses: aos 9 (nove) meses e um reforço aos 4 anos de idade, podendo ser administrada em pessoas até 59 anos de idade. Aos viajantes para as áreas com recomendação, administrar a vacina 10 dias antes da data da viagem. A vacina é contra indicada para gestantes e deve ser adiada em mulheres que estão amamentando até o 6º mês de vida da criança. Nos casos de risco de contrair o vírus buscar orientação médica. A aplicação da vacina para pessoas a partir de 60 anos depende da avaliação do risco da doença e benefício da vacina.
- (10) **Vacina Tríplice Viral (SCR):** Administrar uma dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses de idade com a vacina tetra viral. Em situação de surto, fazer uma dose aos 6 meses de idade, e manter o esquema vacinal de duas doses e a idade preconizada no calendário. Considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. De 1 a 29 anos, todo indivíduo deve ter esquema vacinal de 2 doses. Indivíduos de 30 a 59 anos de idade que não apresentarem comprovação vacinal administrar 1 dose. É contra indicada para gestantes.
- (11) **Vacina contra Sarampo, Rubéola, Caxumba e Varicela (Tetra Viral):** Administrar uma dose aos 15 meses de idade em crianças que já tenham recebido a 1ª dose da tríplice viral. Na rotina do serviço público a vacina está disponível para as crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
- (12) **Vacina contra Hepatite A:** Administrar uma dose aos 15 meses. A idade máxima para administrar é de 4 anos, 11 meses e 29 dias.
- (13) **Vacina contra Papilomavirus Humano (HPV):** Administrar duas doses (0-6 meses) em meninas e meninos a partir de 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Intervalo mínimo da primeira dose para a segunda é de seis meses.
- (14) **Vacina Dupla Adulto:** indivíduo sem vacinação ou sem comprovação de três doses da vacina, seguir o esquema de três doses (0, 2 e 4 meses). O intervalo entre as doses é de 60 dias e o mínimo de 30 dias. Os vacinados anteriormente com 3 doses das vacinas DTP, DT, dTpa, penta ou dT, administrar reforço, a cada dez anos da data da última dose. Em caso de gravidez e ferimentos graves antecipar a dose de reforço se a última dose foi administrada há mais de 5 anos. A mesma deve ser administrada preferencialmente 20 dias antes da data provável do parto.
- (15) **Vacina Adsorvida Difteria, Tétano e Coqueluche tipo adulto (dTpa):** Administrar uma dose da vacina a partir da vigésima (20ª) semana de gestação, preferencialmente, podendo ser administrada até dias antes da data provável do parto. As mulheres que perderem a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, devem receber uma dose de dTpa no puerpério (até 45 dias após o parto). Deve ser administrada a cada gestação, considerando que os anticorpos têm curta duração, portanto, a vacinação durante a gravidez não manterá alto nível de anticorpos protetores em gestações subsequentes.
- (16) **Vacina Influenza:** revacinação anual. Esta vacina é oferecida anualmente por ocasião da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para grupos prioritários definidos pelo PNI/MS.
- (17) **Vacina Pneumocócica 23 Valente:** Administrar uma dose nos indivíduos com 60 anos ou mais que vivem em instituições fechadas, tais como asilos, hospitais, casas de repouso. Administrar apenas 1 dose adicional após 5 anos.
- (18) **Vacina Varicela (atenuada):** Administrar uma segunda dose da vacina varicela (atenuada) para crianças de 4 anos até 6 anos, 11 meses e 29 dias.