

DEFINICIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS

Nexus-Probability

CURSO 1 (PROBABILIDAD I)

PARTE 3 / LECCIÓN 1

Frecuentemente sucede que al realizar un experimento estamos más interesados en algunas funciones del resultado en lugar del resultado en sí. Por ejemplo, al lanzar dados, a menudo nos interesa la suma de los dos dados y no nos preocupamos por el resultado exacto. Es decir, podemos estar interesados en saber que la suma es siete y no preocuparnos por si el resultado real fue (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) o (6, 1). Estas cantidades de interés, o más formalmente, estas funciones reales definidas sobre el espacio muestral, se conocen como **variables aleatorias**.

Dado que el valor de una variable aleatoria está determinado por el resultado del experimento, podemos asignar probabilidades a los posibles valores de la variable aleatoria.

Definición 1 (Variable Aleatoria) Una **variable aleatoria** es una función que asigna un número real a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Existen dos tipos principales de variables aleatorias: discretas y continuas. Formalmente, si (Ω, \mathcal{F}, P) es un espacio de probabilidad, una variable aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función que es medible, es decir, cumple con la condición de que:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Propiedades de Variables Aleatorias

A continuación se inunciarán unos conceptos que se profundizarán en lecciones posteriores, pero servirá para los entusiastas.

- **Esperanza Matemática o Valor Esperado.** La esperanza matemática de una variable aleatoria X , denotada por $E(X)$, es el valor promedio ponderado que X tomaría a lo largo de muchas repeticiones del experimento aleatorio.

- **Varianza.** La varianza de una variable aleatoria X , denotada $\text{Var}(X)$, mide la dispersión de los valores de X respecto a su esperanza.
- **Función de distribución acumulativa.** La función de distribución acumulada de una variable aleatoria X es una función que da la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a x . Se denota como $F(x)$.
- **Independencia.** Dos variables aleatorias X y Y son **independientes** si el hecho de que una tome un valor particular no afecta la distribución de probabilidad de la otra. Esto se formaliza como:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y) \quad \text{para todo } x, y$$

Si las variables son independientes, se cumple también:

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$$

- **Covarianza.** La covarianza entre dos variables aleatorias X y Y mide cómo varían conjuntamente.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Si $\text{Cov}(X, Y) = 0$, se dice que X y Y son incorreladas, pero esto no implica que sean independientes.

Ejercicios

Los siguientes ejercicios propuestos tendrán solución en **Python**, por lo que te invitamos a ejecutar el código en tu computadora.

Ejercicio 1 *Vamos a realizar una simulación en Python que modele el lanzamiento de una moneda, donde $X = 1$ representa que salió águila, y $X = 0$ que salió sol.*

Solución.

```

1  import random
2
3  # Funcion que simula un lanzamiento de moneda
4  def lanzar_moneda():
5      resultado = random.choice(["Aguila", "Sol"])
6      if resultado == "Aguila":
7          return 1 # Representa el valor de X(Aguila)
8      else:
```

```

9         return 0 # Representa el valor de X(Sol)
10
11     # Simulamos n lanzamientos
12     n = 1000
13     lanzamientos = [lanzar_moneda() for _ in range(n)]
14
15     # Resultados de los lanzamientos
16     aguilas = sum(lanzamientos)
17     soles = n - aguilas
18
19     print(f"Total de lanzamientos: {n}")
20     print(f"Aguilas: {aguilas}")
21     print(f"Soles: {soles}")
22

```

Ejercicio 2 Consideremos un examen de opción múltiple con 10 preguntas, cada una con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. Si un estudiante selecciona las respuestas al azar, podemos modelar el número de respuestas correctas como una variable aleatoria.

Sean:

- X : número de respuestas correctas.
- $n = 10$: número de preguntas.
- $p = \frac{1}{4}$: probabilidad de acertar una pregunta.

Solución.

En este caso, X sigue una distribución binomial con parámetros n y p . La probabilidad de obtener k respuestas correctas es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

La variable aleatoria X puede tomar valores de 0 a 10, dependiendo de cuántas respuestas correctas obtiene el estudiante al azar.

```

1     # Examen de opcion multiple (Distribucion Binomial)
2
3     def binomial_probability(n, k, p):
4         """Calcula la probabilidad binomial P(X = k)"""
5         coef_binom = math.comb(n, k)
6         return coef_binom * (p ** k) * ((1 - p) ** (n - k))
7

```

```

8     # Parametros del ejemplo 1
9     n = 10 # Numero de preguntas
10    p = 1/4 # Probabilidad de acertar una pregunta
11    k_values = np.arange(0, n+1) # Valores de k (respuestas
correctas)

12
13    # Calculo de la probabilidad para cada valor de k
14    binomial_probabilities = [binomial_probability(n, k, p) for
k in k_values]
15

```

Ejercicio 3 Consideremos el número de coches que pasan por una intersección en una hora. Este número puede variar cada día y es un ejemplo de una variable aleatoria discreta.

Sean:

- Y : número de coches que pasan por la intersección en una hora.
- El valor de Y puede variar dependiendo del tráfico, pero asumiendo que en promedio pasan 150 coches por hora, podemos modelar este proceso utilizando una distribución de Poisson.

Solución.

La probabilidad de observar k coches en una hora es:

$$P(Y = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

donde $\lambda = 150$ es el número promedio de coches que pasan por la intersección en una hora.

```

1     def poisson_probability(lambd, k):
2         """Calcula la probabilidad de Poisson P(Y = k)"""
3         return (lambd ** k) * math.exp(-lambd) / math.factorial(k)
4
5     # Parametros del ejemplo 2
6     lambda_poisson = 150 # Numero promedio de coches por hora
7     k_values_poisson = np.arange(0, 300, 10) # Valores de k
para el numero de coches
8
9     # Calculo de la probabilidad para cada valor de k
10    poisson_probabilities = [poisson_probability(lambda_poisson,
k) for k in k_values_poisson]
11

```