БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ:
СИРОП, ИНГАЛЯЦИЯ ИЛИ НИЧЕГО?

5 ошибок, которые родители часто совершают, пытаясь помочь ребёнку при кашле

И 3 вещи, которые важно проверить до того, как снова дать ребёнку что-нибудь «от кашля».

Вадим Нурисламов
Международный тренер по первой помощи и СЛР.
17 лет работы на скорой медицинской помощи.
10 тыс. вызовов к детям и взрослым.
Автор онлайн-школы «ОРВИ под контролем».



Вадим Нурисламов
Международный тренер по первой помощи и СЛР

РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ. И ПЕРВАЯ МЫСЛЬ:

«НУЖНО ЧТО-НИБУДЬ ДАТЬ»

1. Дать сироп?
2. Сделать ингаляцию?
3. Подышать физраствором?
4. Достать небулайзер?
5. Дать ещё что-нибудь от кашля?

Все эти действия кажутся логичными.

Но здесь и возникает главная проблема.

КАШЕЛЬ — ЭТО НЕ ОДНА БОЛЕЗНЬ.

Ребёнок может кашлять по разным причинам. И поэтому одно и то же средство не может одинаково подходить при любом кашле.

Сначала важно понять, какая причина кашля.

И только потом решать, нужно ли вообще что-то делать.

5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ТАКТИКУ

1

ОШИБКА №1

«ЕСТЬ КАШЕЛЬ — ЗНАЧИТ НУЖЕН СИРОП»

На упаковке написано: «от кашля».

И кажется: ребёнок кашляет — значит нужен сироп.

Но кашель бывает разным. Например, ребёнок может кашлять из-за насморка, когда слизь стекает по задней стенке горла. Кашель может появиться при воспалении горла — фарингите или ларингите. Может измениться голос и появиться грубый, лающий кашель. А иногда вместе с кашлем ребёнку становится тяжело дышать.

Это уже совершенно разные ситуации.

Поэтому вопрос «Какой сироп дать?» не должен быть первым. Сначала нужно понять, почему ребёнок кашляет.

2

ОШИБКА №2

«ЕСЛИ РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ — НУЖНО СДЕЛАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ»

У многих семей дома есть небулайзер. И со временем появляется простая привычка:

кашель — значит нужно начать ингаляции.

Ребёнок закашлял — достаём аппарат.

Но небулайзер нужен не потому, что у ребёнка просто появился кашель.

Ингаляция должна решать конкретную задачу.

Есть ситуации, когда ингаляции действительно нужны. А есть кашель, при котором они не решают причину проблемы.

Поэтому вопрос «Чем подышать?» тоже не должен быть первым. Сначала нужно понять: зачем вообще сейчас нужна ингаляция.

ЕЩЁ 2 ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ

3 **ОШИБКА №3**

«ПОДЫШИМ ФИЗРАСТВОРОМ — ХУЖЕ НЕ БУДЕТ»

Физраствор кажется безопасным. И поэтому родители иногда делают такие ингаляции просто при любом кашле.

Логика понятная: «Это ведь не лекарство. Что плохого?»

Но проблема не в том, что физраствор опасный. Проблема в другом.

Вы можете делать ингаляции, которые вообще не помогут при кашле. Потому что нужно точно понимать, когда и зачем их делать.

Ребёнок продолжает кашлять. Вы снова делаете ингаляцию. Потом ещё одну. А ответа на главный вопрос всё ещё нет: почему ребёнок кашляет?

Даже у самого простого действия должна быть понятная цель.

4 **ОШИБКА №4**

«НОЧЬЮ КАШЕЛЬ УСИЛИЛСЯ — ЗНАЧИТ МОКРОТА СПУСТИЛАСЬ В БРОНХИ»

Очень знакомая ситуация.

Днём ребёнок почти не кашляет. Ложится спать — и начинается сильный кашель.

Родители пугаются: «Всё, пошло в бронхи».

Но усиление кашля ночью ещё не означает бронхит.

Например, кашель ночью может усиливаться из-за насморка. Когда ребёнок лежит, слизь из носа может стекать по горлу и провоцировать кашель. Причины могут быть и другими.

Поэтому по одному только ночному кашлю нельзя понять, что произошло с ребёнком.

Нужно смотреть на всю ситуацию целиком.

ОШИБКА №5 — САМАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

5

«ГЛАВНОЕ — КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОСТАНОВИТЬ КАШЕЛЬ»

Кашель очень раздражает — чаще всего именно вас, родителей.

Особенно если ребёнок не спит ночью.

И естественное желание родителей:

«Сделайте хоть что-нибудь, чтобы он перестал кашлять».

Но кашель не всегда нужно просто остановить.

Кашель помогает организму очищать дыхательные пути.

Поэтому наша задача не в том, чтобы любой ценой сделать так, чтобы ребёнок больше не кашлял.

Сначала нужно понять причину кашля.

И ещё важнее — понять, нет ли сейчас признаков, при которых ребёнку нужна помощь врача.

Главная задача первых минут — не заглушить кашель любой ценой, а понять, что происходит с ребёнком и что действительно важно сейчас.

ХОРОШО. А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Вот 3 вещи, которые можно проверить ещё до того, как вы снова потянетесь за сиропом или небулайзером.

1 ПОСМОТРИТЕ, КАК РЕБЁНОК ДЫШИТ

Не слушайте только сам кашель. Посмотрите на ребёнка.

Ему легко дышать или тяжело?

Обратите внимание:
— ребёнок дышит спокойно или заметно тяжелее обычного;
— не появилось ли свистящее или необычное шумное дыхание;
— не втягивается ли кожа между рёбрами во время вдоха;
— обычного ли цвета губы и нос.

Если ребёнку становится тяжело дышать, вопрос уже не в том, какой сироп дать. Здесь важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

2 ПОСМОТРИТЕ, КОГДА ИМЕННО РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ

Не пытайтесь самостоятельно поставить диагноз. Просто обратите внимание на детали:

— кашель сильнее ночью;
— усиливается после сна;
— есть насморк;
— изменился голос;
— кашель стал грубым и лающим;
— появились свистящие хрипы при дыхании;
— кашель начался резко или постепенно.

Фраза «у ребёнка сильный кашель» даёт мало информации. А эти детали помогают понять, что может происходить и что

3 ПЕРЕД МЫСЛЬЮ ДАТЬ ЛЕКАРСТВО ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ОДИН ВОПРОС

«Зачем я сейчас это даю?»

Вы достали сироп. Зачем?
Вы собираетесь делать ингаляцию. Зачем?
Вы решили дать ещё одно средство от кашля. Какую проблему оно должно решить?

Если единственный ответ — «потому что ребёнок кашляет», этого недостаточно. Сначала нужно понять ситуацию. И только потом выбирать действие.

ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ ГЛАВНОЕ

- не каждый кашель требует сиропа;
- не каждый кашель требует ингаляции;
- ингаляция с физраствором не является универсальным решением;
- ночной кашель не означает автоматически бронхит;
- цель не всегда в том, чтобы любой ценой остановить кашель.

И вы уже знаете три вещи, которые стоит проверить: как ребёнок дышит; когда и как он кашляет; какую задачу должно решить ваше следующее действие.

НО ТЕПЕРЬ ВОЗНИКАЕТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:

«ХОРОШО. А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?»

- Что делать, если кашель усиливается ночью?
- Что делать, если появился лающий кашель?
- Что делать, если осип голос?
- Что делать, если ребёнок начал тяжело дышать?
- Что делать, если вместе с кашлем высокая температура?
- Когда действительно нужна ингаляция?
- Когда нужен сироп?
- А когда вообще ничего «от кашля» давать не нужно?

Вот здесь простого чек-листа уже недостаточно.

Дальше нужно понимать не одну ошибку. Нужно понимать последовательность действий во время болезни ребёнка.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР

ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ПРОВЕДУ

«ОРВИ И ГРИПП: ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»

На вебинаре мы пойдём дальше. Не будем разбирать только кашель. Потому что когда ребёнок болеет, обычно всё начинается не с одного симптома.

Сегодня появился насморк.

Ночью начался кашель.

Потом поднялась температура.

А утром ребёнок стал вялым.

И каждый раз появляется один и тот же вопрос: «ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?»

НА БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ РАЗБЕРЁМ:

01 Что делать в первые 24 часа болезни — С чего начинать, на что смотреть и почему не нужно сразу лечить всё одновременно.

02 Какие ошибки родители совершают чаще всего — Почему привычные действия иногда не помогают, а только создают ещё больше путаницы.

03 Что делать при кашле и температуре — Когда нужна ингаляция, почему кашель бывает разным и на что смотреть кроме цифры на градуснике.

04 Как не пропустить опасные признаки — Когда можно наблюдать дома, когда нужен врач и когда ждать уже нельзя.

05 Что действительно нужно иметь в домашней аптечке — Не десятки лекарств «на всякий случай», а понятный набор под конкретные задачи.

Вам не нужно становиться врачом. Вам нужно научиться понимать следующий шаг: когда наблюдать, когда действовать, а когда ребёнку

ПЕРЕЙТИ К БЕСПЛАТНОМУ ВЕБИНАРУ

Важно: чек-лист создан для обучения родителей и не заменяет осмотр врача и индивидуальные назначения. Если ребёнку становится тяжело дышать, он резко становится очень вялым, появляется синева губ или состояние быстро ухудшается — нужна медицинская помощь.