БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ: СИРОП, ИНГАЛЯЦИЯ ИЛИ НИЧЕГО?

5 ошибок, которые родители часто совершают, пытаясь помочь ребёнку при кашле.

И 3 вещи, которые важно проверить до того, как снова дать ребёнку что-нибудь «от кашля».



Вадим Нурисламов

Международный тренер по первой помощи и СЛР. 17 лет работы на скорой медицинской помощи. Более 10 тыс. вызовов к детям и взрослым. Автор онлайн-школы «ОРВИ под контролем».

РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ. И ПЕРВАЯ МЫСЛЬ:

«НУЖНО ЧТО-НИБУДЬ ДАТЬ»

01 Дать сироп?

02 Сделать ингаляцию?

03 Подышать физраствором?

04 Достать небулайзер?

05 Дать ещё что-нибудь от кашля?

Все эти действия кажутся логичными. Но здесь и возникает главная проблема.

КАШЕЛЬ — ЭТО НЕ ОДНА БОЛЕЗНЬ.

Ребёнок может кашлять по разным причинам. Поэтому одно и то же средство не может одинаково подходить при любом кашле.

Сначала важно понять, какая причина кашля.

И только потом решать, нужно ли вообще что-то делать.

5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ТАКТИКУ

ОШИБКА №1. «ЕСТЬ КАШЕЛЬ — ЗНАЧИТ НУЖЕН СИРОП»

На упаковке написано: «от кашля». И кажется: ребёнок кашляет — значит нужен сироп.

Но кашель бывает разным. Например, ребёнок может кашлять из-за насморка, когда слизь стекает по задней стенке горла. Кашель может появиться при воспалении горла — фарингите или ларингите. Может измениться голос и появиться грубый, лающий кашель. А иногда вместе с кашлем ребёнку становится тяжело дышать.

Это уже совершенно разные ситуации.

Поэтому вопрос «Какой сироп дать?» не должен быть первым. Сначала нужно понять, почему ребёнок кашляет.

ОШИБКА №2. «ЕСЛИ РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ — НУЖНО СДЕЛАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ»

У многих семей дома есть небулайзер. И со временем появляется простая привычка: кашель — значит нужно начать ингаляции.

Ребёнок закашлял — достаём аппарат. Но небулайзер нужен не потому, что у ребёнка просто появился кашель.

Ингаляция должна решать конкретную задачу.

Есть ситуации, когда ингаляции действительно нужны. А есть кашель, при котором они не решают причину проблемы.

Поэтому вопрос «Чем подышать?» тоже не должен быть первым. Сначала нужно понять: зачем вообще сейчас нужна ингаляция.

ЕЩЁ 2 ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ

ОШИБКА №3. «ПОДЫШИМ ФИЗРАСТВОРОМ — ХУЖЕ НЕ БУДЕТ»

Физраствор кажется безопасным. И поэтому родители иногда делают такие ингаляции просто при любом кашле.

Логика понятная: «Это ведь не лекарство. Что плохого?»

Но проблема не в том, что физраствор опасный. Проблема в другом.

Вы можете делать ингаляции, которые вообще не помогут при кашле. Нужно понимать, когда и зачем их делают.

Ребёнок продолжает кашлять. Вы снова делаете ингаляцию. Потом ещё одну. А ответа на главный вопрос всё ещё нет: почему ребёнок кашляет?

Даже у самого простого действия должна быть понятная цель.

ОШИБКА №4. «НОЧЬЮ КАШЕЛЬ УСИЛИЛСЯ — ЗНАЧИТ МОКРОТА СПУСТИЛАСЬ В БРОНХИ»

Днём ребёнок почти не кашляет. Ложится спать — и начинается сильный кашель.

Родители пугаются: «Всё, пошло в бронхи». Но усиление кашля ночью ещё не означает бронхит.

Например, кашель ночью может усиливаться из-за насморка. Когда ребёнок лежит, слизь из носа может стекать по горлу и провоцировать кашель. Причины могут быть и другими.

По одному ночному кашлю нельзя определить причину. Нужно смотреть на всю ситуацию целиком.

ОШИБКА №5 — САМАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

«ГЛАВНОЕ — КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОСТАНОВИТЬ КАШЕЛЬ»

Кашель очень раздражает — чаще всего именно вас, родителей. Особенно если ребёнок не спит ночью.

И естественное желание родителей: «Сделайте хоть что-нибудь, чтобы он перестал кашлять».

Но кашель не всегда нужно просто остановить.

Кашель помогает организму очищать дыхательные пути.

Поэтому наша задача не в том, чтобы любой ценой сделать так, чтобы ребёнок больше не кашлял.

Сначала нужно понять причину кашля.

И ещё важнее — понять, нет ли сейчас признаков, при которых ребёнку нужна помощь врача.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Задача первых минут — не заглушить кашель любой ценой, а понять, что происходит с ребёнком и что действительно важно сейчас.

ХОРОШО. А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Вот 3 вещи, которые можно проверить ещё до того, как снова потянуться за сиропом или небулайзером.

1. ПОСМОТРИТЕ, КАК РЕБЁНОК ДЫШИТ

Не слушайте только сам кашель. Посмотрите на ребёнка: ему легко дышать или тяжело?

Обратите внимание: ребёнок дышит спокойно или заметно тяжелее обычного; не появилось ли свистящее или необычное шумное дыхание; не втягивается ли кожа между рёбрами во время вдоха; обычного ли цвета губы и нос.

Если ребёнку тяжело дышать, вопрос уже не в сиропе: здесь важна своевременная медицинская помощь.

2. ПОСМОТРИТЕ, КОГДА ИМЕННО РЕБЁНОК КАШЛЯЕТ

Не пытайтесь самостоятельно поставить диагноз. Обратите внимание на детали:

— кашель сильнее ночью или после сна;
— есть насморк;
— изменился голос, кашель стал грубым и лающим;
— появились свистящие хрипы при дыхании;
— кашель начался резко или постепенно.

Фраза «сильный кашель» даёт мало информации. Детали помогают понять ситуацию и следующий шаг.

3. ПЕРЕД ЛЕКАРСТВОМ ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ОДИН ВОПРОС

«Зачем я сейчас это даю?»

Вы достали сироп — зачем? Собираетесь делать ингаляцию — зачем? Решили дать ещё одно средство — какую проблему оно должно решить?

Если единственный ответ — «потому что ребёнок кашляет», этого недостаточно. Сначала нужно понять ситуацию, потом выбирать действие.

ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ ГЛАВНОЕ

- Не каждый кашель требует сиропа.
- Не каждый кашель требует ингаляции.
- Физраствор через небулайзер — не универсальное решение.
- Ночной кашель не означает автоматически бронхит.
- Не всегда нужно любой ценой останавливать кашель.

Вы уже знаете, что проверить: **как ребёнок дышит; когда и как он кашляет; какую задачу должно решить следующее действие.**

НО ТЕПЕРЬ ВОЗНИКАЕТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:

«ХОРОШО. А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?»

Что делать, если кашель усиливается ночью?

Что делать, если появился лающий кашель или осип голос?

Что делать, если ребёнок начал тяжело дышать?

Что делать, если вместе с кашлем высокая температура?

Когда действительно нужны ингаляция или сироп?

А когда вообще ничего «от кашля» давать не нужно?

Вот здесь одного чек-листа уже недостаточно.
Дальше нужна последовательность действий во время болезни ребёнка.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР

ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ПРОВЕДУ «ОРВИ И ГРИПП: ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»

На вебинаре мы пойдём дальше. Не будем разбирать только кашель: когда ребёнок болеет, симптомы могут меняться один за другим.

Сегодня появился насморк. Ночью начался кашель. Потом поднялась температура. А утром ребёнок стал вялым.

И каждый раз появляется один вопрос: «ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?»

НА БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ РАЗБЕРЁМ:

01. Первые 24 часа: с чего начинать и на что смотреть.

02. Частые ошибки: почему привычные действия иногда не помогают.

03. Кашель и температура: ингаляции и ориентиры кроме цифры на градуснике.

04. Опасные признаки: когда наблюдать дома, когда нужен врач, а когда ждать нельзя.

05. Домашняя аптечка: разумный набор под конкретные задачи.

Родителю не нужно становиться врачом.

Важно знать следующий шаг: когда наблюдать, когда действовать, а когда нужна медицинская помощь.

ПЕРЕЙТИ К БЕСПЛАТНОМУ ВЕБИНАРУ

Важно: чек-лист не заменяет осмотр врача и индивидуальные назначения. Если ребёнку трудно дышать, он резко становится очень вялым, синеют губы или состояние быстро ухудшается — необходима медицинская помощь.