
БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РЕБЁНОК ЗАБОЛЕЛ: ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА

5 вещей,которыенужносделать,
и 7 ошибок, которых лучше не совершать

Короткий чек-лист для родителей, когда температура уже поднялась, появился насморк, кашель или ребёнок просто стал вялым - а вы пока не понимаете, с чего начинать.



Вадим Нурисламов

Международный тренер по первой помощи и СЛР с 17 летним стажем работы на скорой медицинской помощи

РЕБЁНОК ЗАБОЛЕЛ. И ПЕРВАЯ МЫСЛЬ О

«Что ему сейчас дать?»

1. Жаропонижающее?
2. Что-нибудь противовирусное?
3. Сироп от кашля?
4. Сделать ингаляцию?
5. Начать лечить нос?

И именно в этот момент родители чаще всего начинают делать слишком много действий одновременно.

Но первые часы болезни лучше начинать не с домашней аптечки.

Сначала нужно понять, что происходит с ребёнком и какая задача сейчас главная.

Ниж е - 5 базовых действий, к оторые помогут не растеряться в первыесутки.

Ниже - 5 базовыхдействий,которыепомогутнерастеряться в первые сутки.

Это не схема лечения и не попытка поставить диагноз дома.
Это ваша точка старта.

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТ

В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА

01

Сначала оцените не какая температура, а ребёнка

Температура - только один из показателей.

Обратите внимание: как ребёнок дышит; насколько он активен и реагирует на вас; пьёт воду, сосет грудь; мочится как обычно или реже.

Важно видеть не только симптом, но и общее состояние ребёнка.

02

Определите, какой симптом сейчас главный

Что беспокоит ребёнка больше всего? Температура? Насморк и заложенность носа? Кашель? Боль в горле? Осиплость или лающий кашель? Изменение дыхания?

Не нужно пытаться одновременно «лечить всё». У каждого симптома - своя причина, требуются свои задачи и свои действия.

03

Создайте ребёнку нормальные условия для восстановления

Впервыечасы особенноважныпростыевещи:питьё,отдых, комфортные условия и наблюдение за состоянием.

Не пытайтесь любой ценой сделать ребёнка «полностью здоровым» за несколько часов. Ваша задача сейчас - помочь ему переносить заболевание и следить за изменением состояния.

04

Наблюдайте за динамикой

Полезно запомнить или записать: когда появились первые симптомы; какая была температура; как ребёнок пьёт; как меняется его самочувствие; какие препараты уже получал ребёнок.

Важнее понимать: ребёнку становится лучше, так же, или хуже?

05

Знайте границу домашних действий

Есть ситуации, когда задача родителя - уже не выбирать очередное средство дома.

Срочная медицинская помощь необходима, если: выраженное затруднение дыхания; синюшность носогубного треугольника; ребёнка трудно разбудить или он необычно вялый; ребёнок практически не пьёт; судороги; быстрое выраженное ухудшение состояния.

Если состояние ребёнка вызывает у вас серьёзное беспокойство - лучше обратиться за медицинской помощью.

7 ОШИБОК, КОТОРЫЕ ЧАСТО СОВЕРШ

В ПЕРВЫЕ СУТКИ

1

ОШИБКА №1

Лечить цифру на градуснике, а не состояние ребёнка

Высокая температурапугает.

Но сама цифра не отвечает на главный вопрос: как ребёнок переносит заболевание?

2

ОШИБКА №2

Начать сразу несколько препаратов

«От температуры». «От вируса». «От кашля». «Для иммунитета». «На всякий случай».

Чем больше препаратов получает ребёнок, тем сложнее понять, какую задачу каждый из них вообще должен решать.

Перед любым лекарством задайте себе вопрос: «Зачем именно я сейчас его даю?»

3

ОШИБКА №3

Начать антибиотик «чтобы не было осложнений»

Большинство обычных респираторных инфекций у детей вызываются вирусами.

Антибиотики действуют на бактерии и должны использоваться тогда, когда для них действительно есть показания.

4

ОШИБКА №4

Искать универсальное средство «от кашля»

Кашель - это симптом.

И кашель при стекании слизи из носа, ларингите, бронхообструкции или другой инфекции - это не одна и та же ситуация.

Поэтому сначала нужно понять причину и задачу, а уже потом выбирать действие.

ЕЩЁ 3 ОШИБКИ,
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ТАКТИКУ

НЕ ЛЕЧИМ «НА АВТОМАТЕ» - СМОТРИМ НА СИТУАЦИЮ

5

ОШИБКА №5

Делать ингаляцию просто потому, что ребёнок кашляет

Небулайзер - неуниверсальноесредствоот любогокашля.

Для разных состояний используются разные подходы.

И фраза: «У ребёнка кашель - давайте подышим» сама по себе ещё не является показанием к ингаляции.

6

ОШИБКА №6

Пытаться убрать каждый симптом как можно быстрее

Насморк.Кашель. Температура.Слабость.

Родителям хочется убрать всё сразу. Но симптом - это ещё не диагноз.

И гораздо важнее понимать: что сейчас происходит с ребёнком и какое действие действительно необходимо.

7

ОШИБКА №7

Продолжать лечить дома, когда состояние ребёнка меняется

Домашнийпланработает только до техпор,покасостояние ребёнка позволяет оставаться дома.

Если появляется затруднённое дыхание, выраженная вялость, ребёнок перестаёт пить или состояние заметно ухудшается - стратегия должна меняться.

! Главная задача первых суток - не сделать всё подряд, а понять, что сейчас действительно важно.

ВОТ ЧТО ВАЖНО ПОНЯТЬ

Теперь вы знаете, с чего начинать первые сутки болезни.
Но обычно спустя несколько часов у родителей появляются уже совсем другие вопросы:

- Температура снова поднялась. Что делать?
- Когда и какое жаропонижающее использовать?
- Как правильно рассчитать дозировку по весу?
- Почему ребёнок начал сильнее кашлять ночью?
- Нужен ли сироп от кашля?
- Когда действительно нужен небулайзер?
- Что делать, если появился лающий кашель и осип голос?
- Как действовать при сильной заложенности носа?
- Как отличить ситуацию, которую можно наблюдать дома, от той, где ребёнка уже должен увидеть специалист?

И вот здесь одного универсального чек-листа уже недостаточно.

Потому что заболевание развивается. Симптомы меняются.

И следующее действие зависит уже от конкретной ситуации.

РОДИТЕЛЮ НЕ НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ ВРА

Вам не нужно запоминать десятки диагнозов и сотни лекарств.
Вам нужно понимать следующий шаг.

Именно поэтому я создал полный интерактивный навигатор:

«ОРВИ И ГРИПП - ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»

Не энциклопедию о простуде. Не очередную лекцию о вирусах.

А маршрут, которым можно пользоваться тогда, когда ребёнок уже заболел.

температура	кашель
насморк	ларингит
затруднённое дыхание	другие симптомы

- и понять, что делать дальше.

Какие действия нужны. Когда они нужны. Когда домашней помощи достаточно. И где проходит граница, после которой уже необходима медицинская помощь.

ПОТОМУ ЧТО САМАЯ СЛОЖНАЯ ЧАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ НЕ В ПЕРВЫЙ ЧАС

А когда наступает ночь. Температура снова растёт. Кашель усиливается. Ребёнок просыпается. Нос перестаёт дышать. И вы снова открываете телефон и начинаете искать: «Что делать?»

В этот момент вам нужен не ещё один совет из интернета. Вам нужен понятный маршрут действий.

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ НАВИГАТОР

Важно. Материал носит образовательный характер и не заменяет очную медицинскую помощь, диагностику или индивидуальные назначения врача. При тяжёлом или быстро ухудшающемся состоянии ребёнка обращайтесь за медицинской помощью.