HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH PHÚ THỌ

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM:


1. C	**2. D**	**3. C**	**4. B**	**5. D**	**6. A**
7. B	**8. D**	**9. A**	**10. A**	**11. B**	**12. C**

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (1,5 điểm)	a)	**Giải hệ phương trình** $\begin{cases}3x-y=7\\2x+y=8\end{cases}$ **Cách giải:** Cộng hai phương trình của hệ theo từng vế tương ứng, ta được: $(3x-y)+(2x+y)=7+8$ $5x=15$ $x=3$ Thay $x=3$ vào phương trình $2x+y=8$, ta có: $2.3+y=8$ $6+y=8$ $y=2$ Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(3;2)$.
	b)	**Rút gọn biểu thức** $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{a}+1}\right).\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$ **với** $a\ge 0, a\ne 1$. **Cách giải:** Với điều kiện $a\ge 0, a\ne 1$, ta có: $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{a}+1}\right).\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$ $A=\left(\dfrac{\sqrt{a}+1}{(\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}+1)}+\dfrac{\sqrt{a}-1}{(\sqrt{a}+1)(\sqrt{a}-1)}\right).\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$ $A=\dfrac{\sqrt{a}+1+\sqrt{a}-1}{(\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}+1)}.\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$ $A=\dfrac{2\sqrt{a}}{(\sqrt{a}-1)(\sqrt{a}+1)}.\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$

		$A=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}$ Vậy $A=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}$ với $a\geq 0, a\neq 1$
Câu 2: (0, 5 điểm)		**Trong một hộp chứa 30 viên bi giống nhau về kích thước và chất liệu, mỗi viên bi được ghi một số tự nhiên từ 1 đến 30 (hai viên bi khác nhau ghi hai số khác nhau). Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đã cho. Tính xác suất của biến cố: "Bạn An lấy được viên bi ghi số chia hết cho 3".** **Cách giải:** Vì trong hộp có 30 viên bi được đánh số từ 1 đến 30 và An lấy ngẫu nhiên một viên bi, nên có tất cả 30 kết quả có thể xảy ra. Các kết quả này là đồng khả năng. Số phần tử của tập hợp các kết quả có thể xảy ra là $n=30$. Gọi A là biến cố: "Bạn An lấy được viên bi ghi số chia hết cho 3". Các số tự nhiên từ 1 đến 30 và chia hết cho 3 bao gồm: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30. Suy ra số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A)=10$. Xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{30}=\dfrac{1}{3}$ Vậy xác suất của biến cố "Bạn An lấy được viên bi ghi số chia hết cho 3" là $\dfrac{1}{3}$.
Câu 3: (0,5 điểm)		Một cốc thuỷ tinh chứa nước, bên trong có dạng hình trụ với bán kính đáy $R=4$ cm. Chiều cao mực nước ban đầu bên trong cốc bằng 8 cm. Sau đó người ta thả từ từ một viên bi đặc không ngấm nước có dạng hình cầu bán kính $r=3$ cm vào trong cốc sao cho viên bi chìm hoàn toàn trong nước và nước không tràn ra ngoài. Tính chiều cao theo đơn vị centimét của mực nước trong cốc sau khi thả viên bi. **Cách giải:** Thể tích nước ban đầu trong cốc là: $V_1=\pi\cdot R^2\cdot h_1=\pi\cdot 4^2\cdot 8=128\pi\ (\text{cm}^3)$ Thể tích của viên bi hình cầu là: $V_2=\dfrac{4}{3}\cdot\pi\cdot r^3=\dfrac{4}{3}\cdot\pi\cdot 3^3=36\pi\ (\text{cm}^3)$ Khi thả viên bi chìm hoàn toàn vào nước, tổng thể tích của nước và viên bi là:

		$V = V_1 + V_2 = 128\pi + 36\pi = 164\pi \ (\text{cm}^3)$ Gọi h_2 là chiều cao mực nước trong cốc sau khi thả viên bi. Do hình dạng bên trong cốc là hình trụ nên ta có: $V = \pi \cdot R^2 \cdot h_2$ $164\pi = \pi \cdot 4^2 \cdot h_2$ $16 \cdot h_2 = 164$ $h_2 = \dfrac{164}{16} = 10,25 \ (\text{cm})$ Vậy chiều cao của mực nước trong cốc sau khi thả viên bi là $10,25$ cm.
Câu 4: (1,0 điểm)		**Một công ty nhận được đơn đặt hàng 4000 sản phẩm. Mỗi máy của công ty sản xuất được 50 sản phẩm trong một giờ. Khi thực hiện đơn hàng, mỗi giờ công ty cần trả 600 nghìn đồng chi phí cho nhân công. Ngoài ra, chi phí bảo trì cho một máy trong đơn hàng trên là 400 nghìn đồng. Giả sử hệ thống máy của công ty làm việc với công suất như nhau.**
	a)	**Gọi x là số lượng máy công ty sử dụng cho đơn hàng trên (điều kiện $x \in \mathbb{N}^*$). Biểu diễn theo x các đại lượng sau: số sản phẩm của công ty làm được trong một giờ và tổng số giờ công ty làm xong đơn hàng.** **Cách giải:** Vì mỗi máy sản xuất được 50 sản phẩm trong một giờ, nên khi sử dụng x máy, số sản phẩm làm được trong một giờ là: $50x$ (sản phẩm/giờ). Đơn hàng có tổng cộng 4000 sản phẩm. Với năng suất của toàn hệ thống là $50x$ sản phẩm trong một giờ, tổng thời gian để làm xong đơn hàng là: $\dfrac{4000}{50x} = \dfrac{80}{x}$ (giờ).
	b)	**Công ty dự kiến tổng chi phí nhân công và bảo trì máy thực hiện đơn hàng là 11920 nghìn đồng. Hỏi công ty phải sử dụng bao nhiêu máy để thực hiện xong đơn hàng trên?** **Cách giải:** Mỗi giờ công ty cần trả 600 nghìn đồng. Tổng thời gian làm việc là $\dfrac{80}{x}$ giờ. Vậy tổng chi phí nhân công là: $600.\dfrac{80}{x} = \dfrac{48000}{x}$ (nghìn đồng).

		Chi phí bảo trì cho mỗi máy trong suốt đơn hàng là 400 nghìn đồng. Công ty sử dụng x máy, nên tổng chi phí bảo trì là: $400x$ (nghìn đồng). Theo đề bài, tổng chi phí dự kiến là 11920 nghìn đồng, ta có phương trình: $\frac{48000}{x}+400x=11920$ $\frac{1200}{x}+10x=298$ $\frac{600}{x}+5x=149$ $5x^2-149x+600=0$. Giải phương trình trên, ta được $x_1=25$ (thoả mãn) và $x_2=4,8$ (loại). Vậy công ty phải sử dụng 25 máy để thực hiện xong đơn hàng trên.
Câu 5: (3,0 điểm)		**Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB cố định. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O) (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt các tiếp tuyến tại A, tại B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.** 
	a)	**Chứng minh rằng bốn điểm A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn.** **Cách giải:** Vì AC là tiếp tuyến của (O) tại A nên $OA\perp AC$ hay $\angle OAC=90^\circ$. Suy ra A, O, C nội tiếp đường tròn đường kính OC. Vì MC là tiếp tuyến của (O) tại M nên $OM\perp MC$ hay $\angle OMC=90^\circ$. Suy ra O,C,M nội tiếp đường tròn đường kính OC.

Vậy A, O, C, M nội tiếp đường tròn đường kính OC.

b) **Đường thẳng BC cắt OD, OM lần lượt tại K, N. Đường thẳng OC cắt AN tại H. Hai đường thẳng AC và OD cắt nhau tại E. Chứng minh rằng $\frac{HN}{HA}=\frac{ON}{OA}$ và EH vuông góc với CK.**

Cách giải:

+) Chứng minh $\frac{HN}{HA}=\frac{ON}{OA}$:

Ta có CA, CM là tiếp tuyến cắt nhau tại C nên OC là tia phân giác của góc AOM.

Suy ra $\angle AOC=\angle MOC$.

Vì N nằm trên tia OM nên $\angle AOC=\angle NOC$.

Xét tam giác AON có OH là đường phân giác trong của góc O.

Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có: $\frac{HN}{HA}=\frac{ON}{OA}$ (đpcm).

+) Chứng minh EH vuông góc với CK:

Tương tự như trên ta có OK là phân giác của $\angle NOB$ nên $\frac{NK}{KB}=\frac{ON}{OB}$

Mà $OA=OB$ nên $\frac{HN}{HA}=\frac{NK}{KB}$

Theo định lý Thales đảo suy ra $HK \parallel AB$

Mà $AB \perp AC$ nên $HK \perp AC$

Ta có $\angle AOC=\angle COM$ và $\angle MOD=\angle DOB$

Nên $\angle COM+\angle MOD=\angle AOC+\angle DOB$

Mà $\angle COM+\angle MOD+\angle AOC+\angle DOB=180^0$

Suy ra $\angle COM+\angle MOD=\angle AOC+\angle DOB=90^0$ hay $\angle COD=90^0$

Suy ra $OC \perp EK$

Xét ΔCKE có HK, OC là hai đường cao cắt nhau tại H nên H là trực tâm ΔCKE.

Suy ra $EH \perp CK$

c) **Đường thẳng EH cắt AB, BC lần lượt tại T, S. Tính độ dài AM theo R khi diện tích tam giác BST đạt giá trị lớn nhất.**

Cách giải:

Xét ΔATE và ΔSTB có $\angle TAE=\angle TSB=90^0$ và $\angle ATE=\angle STB$ (đối đỉnh)

Suy ra $\angle AET=\angle SBT$

Suy ra $\Delta ATE \sim \Delta ACB(g.g)$ nên $\frac{TA}{AC}=\frac{AE}{AB}$ hay $TA.AB=AC.AE$

Ta có $\angle OAC=\angle OAE=90^0$

và $\angle AOE=\angle OCA$ (do cùng cộng $\angle AOC$ bằng 90^0)

Suy ra $\Delta OAC \sim \Delta EAO(g.g)$ nên $\frac{OA}{AE}=\frac{AC}{AO}$ hay $AE.AC=AO^2$

Suy ra $TA.AB=AO^2$ hay $TA=\frac{AO^2}{AB}=\frac{R^2}{2R}=\frac{R}{2}$

Khi đó T là trung điểm của AO và $TB=OB+TO=\frac{3}{2}R$

Ta có $S_{BST}=\frac{1}{2}BS\cdot ST$.

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có

$$BS\cdot ST\le\frac{BS^2+ST^2}{2}=\frac{TB^2}{2}=\frac{\left(\frac{3}{2}R\right)^2}{2}=\frac{9R^2}{8}.$$

Suy ra $S_{BST}\le\frac{9R^2}{16}$.

Dấu "=" xảy ra (diện tích lớn nhất) khi và chỉ khi $BS=ST$

Suy ra ΔBST vuông cân tại S suy ra $\angle SBT=45^\circ$ hay $\angle CBA=45^\circ$

Xét ΔCAB vuông tại A có $\angle CBA=45^\circ$ nên ΔCAB vuông cân tại A.

Suy ra $CA=AB=2R$

Gọi P là giao điểm của AM và OC.

Vì OM = OA và CM = CA nên OC là trung trực của AM hay $AM\perp OC$ tại P

Khi đó ta có $\Delta CAP \sim \Delta COA(g.g)$ nên $AC^2=CP.CO$

Mà $CO^2=OA^2+AC^2=R^2+(2R)^2=5R^2$ hay $CO=R\sqrt{5}$

Suy ra $CP=\frac{AC^2}{CO}=\frac{4R^2}{R\sqrt{5}}=\frac{4}{\sqrt{5}}R$

Khi đó $AP^2=AC^2-CP^2=4R^2-\left(\frac{4}{\sqrt{5}}R\right)^2=\frac{4}{5}R^2$ nên $AP=\frac{2}{\sqrt{5}}R$

Suy ra $AM=2AP=\frac{4R}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}R$.

Câu 6:
(0,5 điểm)

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{1}{2-xy}+\frac{1}{2-yz}+\frac{1}{2-zx}$.

Cách giải:

Từ giả thiết $x^2+y^2+z^2=2$, ta thay vào mẫu số của $\frac{1}{2-xy}$:

$2-xy=x^2+y^2+z^2-xy$

$2(2-xy)=2x^2+2y^2+2z^2-2xy$

$2(2-xy)=(x^2-2xy+y^2)+(x^2+y^2+2z^2)$

$2(2-xy)=(x-y)^2+(x^2+y^2+2z^2)$

Vì $(x-y)^2\geq 0$ với mọi số thực, ta có $2(2-xy)\geq x^2+y^2+2z^2$

Xét: $\frac{1}{2-xy}=\frac{2}{2(2-xy)}=\frac{(2-xy)+xy}{2(2-xy)}=\frac{1}{2}+\frac{xy}{2(2-xy)}$

Do $x,y>0$ nên $xy>0$, ta có:

$\frac{1}{2-xy}\leq\frac{1}{2}+\frac{xy}{x^2+y^2+2z^2}$

$\frac{1}{2-xy}\leq\frac{1}{2}+\frac{xy}{(x^2+z^2)+(y^2+z^2)}$

Theo BĐT Cô-si cho 2 số dương, áp dụng vào mẫu số:

$$\frac{xy}{(x^2+z^2)+(y^2+z^2)}\leq\frac{xy}{2\sqrt{(x^2+z^2)(y^2+z^2)}}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+z^2}}\right)\cdot\left(\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)$$

Áp dụng BĐT Cô-si chiều ngược lại $ab\leq\frac{a^2+b^2}{2}$:

$$\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+z^2}}\right)\cdot\left(\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)\leq\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{x^2+z^2}+\frac{y^2}{y^2+z^2}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{x^2}{x^2+z^2}+\frac{y^2}{y^2+z^2}\right)$$

Thay vào $\frac{1}{2-xy}\leq\frac{1}{2}+\frac{xy}{(x^2+z^2)+(y^2+z^2)}$, ta được:

$$\frac{1}{2-xy}\leq\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left(\frac{x^2}{x^2+z^2}+\frac{y^2}{y^2+z^2}\right)$$

Bằng cách chứng minh tương tự, ta có:

$$\frac{1}{2-yz} \le \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\left(\frac{y^2}{y^2+x^2} + \frac{z^2}{z^2+x^2}\right)$$

$$\frac{1}{2-zx} \le \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\left(\frac{z^2}{z^2+y^2} + \frac{x^2}{x^2+y^2}\right)$$

Cộng vế theo vế cả 3 bất đẳng thức trên, ta nhóm các phân thức có cùng mẫu số lại với nhau:

$$P \le \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\left[\left(\frac{x^2}{x^2+z^2} + \frac{z^2}{x^2+z^2}\right) + \left(\frac{y^2}{y^2+x^2} + \frac{x^2}{y^2+x^2}\right) + \left(\frac{z^2}{z^2+y^2} + \frac{y^2}{z^2+y^2}\right)\right]$$

$$P \le \frac{3}{2} + \frac{1}{4}(1+1+1) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = y = z$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ hay $x = y = z = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Vậy giá trị lớn nhất của P là $\frac{9}{4}$.

—HẾT—

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT, GDTX
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).

Thí sinh trả lời câu hỏi từ 1 đến 12, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, D, viết vào tờ giấy thi một phương án đúng mà thí sinh chọn.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y?

A. $x^3+y=0$. **B.** $xy^2=1$. **C.** $2x+y=2$. **D.** $-x+3y+y^2=0$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} x+3y=6 \\ -x-y=0 \end{cases}$ có một nghiệm duy nhất $(x_0;y_0)$. Giá trị của x_0 bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 6. **D.** −3.

Câu 3. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x-2026}$ là

A. $x>2026$. **B.** $x<2026$. **C.** $x\geq 2026$. **D.** $x\neq 2026$.

Câu 4. Biểu thức $P=\sqrt{5}\left(\sqrt{125}-\sqrt{80}\right)$ có giá trị bằng

A. 45. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 3.

Câu 5. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y=3x^2$?

A. $(-3;-1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(1;3)$.


Câu 6. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn x?

A. $5x^2+x+3=0$. **B.** $x+\sqrt{x-1}=0$. **C.** $x^4-x+6=0$. **D.** $2x^2+x^3-3=0$.

Câu 7. Biết phương trình $x^2-6x+5=0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Tích hai nghiệm x_1x_2 bằng

A. 6. **B.** 5. **C.** −6. **D.** −5.

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M.



Giá trị $\cos\widehat{MNP}$ bằng

A. $\dfrac{MP}{NP}$. **B.** $\dfrac{MN}{MP}$. **C.** $\dfrac{NP}{MP}$. **D.** $\dfrac{MN}{NP}$.

Câu 9. Cho hàm số $y=2x^2$ có đồ thị là (P). Khẳng định nào sau đây đúng?


A. (P) là một parabol có đỉnh là gốc tọa độ.

B. (P) là một parabol nằm phía dưới trục Ox.

C. (P) là một parabol nhận trục Ox làm trục đối xứng.

D. (P) là một đường thẳng.

Câu 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và $\widehat{BOC}=80°$.



Số đo $\widehat{BAC}$ bằng

A. 40°. **B.** 80°. **C.** 160°. **D.** 100°.

Câu 11. Cho hai điểm O và O' cách nhau một khoảng 8 cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn $(O;3\,\text{cm})$ và $(O';5\,\text{cm})$ là

A. cắt nhau. **B.** tiếp xúc ngoài. **C.** tiếp xúc trong. **D.** ngoài nhau.

Câu 12. Thống kê chiều cao (đơn vị tính là cm) của 40 học sinh lớp 9A thu được bảng số liệu sau

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;170)$	$[170;180)$	$[180;190)$
Số học sinh	15	16	8	1

Số lượng học sinh có chiều cao từ 160 cm đến dưới 170 cm bằng

A. 31. **B.** 24. **C.** 16. **D.** 10.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).


Câu 1 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-y=7 \\ 2x+y=8 \end{cases}$

b) Rút gọn biểu thức $A=\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}+\dfrac{1}{\sqrt{a}+1}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{a}-1}{2}$ với $a\geq 0, a\neq 1$.

Câu 2 (0,5 điểm). Trong một hộp chứa 30 viên bi giống nhau về kích thước và chất liệu, mỗi viên bi được ghi một số tự nhiên từ 1 đến 30 (hai viên bi khác nhau ghi hai số khác nhau). Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đã cho. Tính xác suất của biến cố: "Bạn An lấy được viên bi ghi số chia hết cho 3".

Câu 3 (0,5 điểm). Một cốc thuỷ tinh chứa nước, bên trong có dạng hình trụ với bán kính đáy $R=4$ cm. Chiều cao mực nước ban đầu bên trong cốc bằng 8 cm. Sau đó người ta thả từ từ một viên bi đặc không ngấm nước có dạng hình cầu bán kính $r=3$ cm vào trong cốc sao cho viên bi chìm hoàn toàn trong nước và nước không tràn ra ngoài. Tính chiều cao theo đơn vị centimét của mực nước trong cốc sau khi thả viên bi.



Câu 4 (1,0 điểm). Một công ty nhận được đơn đặt hàng 4000 sản phẩm. Mỗi máy của công ty sản xuất được 50 sản phẩm trong một giờ. Khi thực hiện đơn hàng, mỗi giờ công ty cần trả 600 nghìn đồng chi phí cho nhân công. Ngoài ra, chi phí bảo trì cho một máy trong đơn hàng trên là 400 nghìn đồng. Giả sử hệ thống máy của công ty làm việc với công suất như nhau.

a) Gọi x là số lượng máy công ty sử dụng cho đơn hàng trên (điều kiện $x\in\mathbb{N}^*$). Biểu diễn theo x các đại lượng sau: số sản phẩm của công ty làm được trong một giờ và tổng số giờ công ty làm xong đơn hàng.

b) Công ty dự kiến tổng chi phí nhân công và bảo trì máy thực hiện đơn hàng là 11920 nghìn đồng. Hỏi công ty phải sử dụng bao nhiêu máy để thực hiện xong đơn hàng trên?

Câu 5 (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB cố định. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O) (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt các tiếp tuyến tại A, tại B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh rằng bốn điểm A,C,M,O cùng thuộc một đường tròn.

b) Đường thẳng BC cắt OD, OM lần lượt tại K,N. Đường thẳng OC cắt AN tại H. Hai đường thẳng AC và OD cắt nhau tại E. Chứng minh rằng $\dfrac{HN}{HA}=\dfrac{ON}{OA}$ và EH vuông góc với CK.

c) Đường thẳng EH cắt AB, BC lần lượt tại T, S. Tính độ dài AM theo R khi diện tích tam giác BST đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6 (0,5 điểm). Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\dfrac{1}{2-xy}+\dfrac{1}{2-yz}+\dfrac{1}{2-zx}$.

.....**Hết**.....