



Câu 1. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

A. Vô số **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

D. 2

D. $(4; +\infty)$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+5}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

- A. $(5; +\infty)$ B. $(5; 8]$ C. $[5; 8)$ D. $(5; 8)$

A. $(-\infty; 1]$ B. $(-\infty; 4]$ C. $(-\infty; 1)$ D. $(-\infty; 4)$

A. $(-\infty; 2)$ **B.** $(-\infty; 5)$ **C.** $(-\infty; 5]$ **D.** $(-\infty; 2]$

A. $(-\infty; -1]$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-\infty; -1)$ **D.** $(-\infty; 2]$

D. $m \geq 2$

D. 3

Câu 12. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

- A. $\frac{5}{2}$ B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$