

Chủ đề: định kì



## Đề kiểm tra định kì lần 2

Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 1)$       B.  $(-\infty; -1)$       C.  $(1; 3)$       D.  $(3; +\infty)$

**Câu 2. [STER]** Tìm giá trị cực tiểu của hàm số  $y = -x^3 + 3x - 4$ .

- A. -6      B. -1      C. -2      D. 1


**Câu 3. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{4 - x} + \sqrt{3}$  trên tập xác định của nó là

- A.  $2 + \sqrt{3}$       B.  $2\sqrt{3}$       C. 0      D.  $\sqrt{3}$

**Câu 4. [STER]** Phương trình  $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$  có nghiệm là:

- A.  $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$       B.  $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$   
C.  $x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$       D.  $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$


**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  như hình vẽ sau.



Hàm số  $g(x) = f(x)$  có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3                                      B. 5                                      C. 4                                      D. 2

**Câu 6. [STER]** Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  $f(x) = 1$  là



- A. 0                                      B. 3                                      C. 1                                      D. 2

**Câu 7. [STER]** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  biết  $u_1 = 2$ , công sai  $d = -5$ . Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó là

- A. -410                                      B. -205                                      C. 245                                      D. -230


**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$  thỏa mãn  $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 2$ . Giá trị của biểu thức  $f(-1) + f(3)$  bằng

- A.  $2 + \ln 15$                                       B.  $3 + \ln 15$                                       C.  $\ln 15$                                       D.  $4 + \ln 15$

**Câu 9. [STER]** Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:  $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$

- A. 2                                      B. 3                                      C. 1                                      D. 0

**Câu 10. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  có đồ thị như sau.



**D.**  $ad > 0$ ;  $bd < 0$

D.  $a^{\frac{3}{10}}$


## D. 2

3

**Câu 14. [STER]** Nhà máy  $A$  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy  $B$ . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng nhà máy  $A$  cung cấp cho nhà máy  $B$  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy  $B$ . Nếu số lượng đặt hàng là  $x$  tấn sản phẩm thì giá bán mỗi tấn sản phẩm là  $P(x) = 45 - 0,001x^2$  (triệu đồng). Chi phí để nhà máy  $A$  sản xuất  $x$  tấn sản phẩm trong một tháng là  $C(x) = 100 + 30x$  (triệu đồng).


| STT | Mệnh đề                                                                                                                                            | Đúng                  | Sai                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | Chi phí để nhà máy $A$ sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Số tiền nhà máy $A$ thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy $B$ là 600 triệu đồng.                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Lợi nhuận mà nhà máy $A$ thu được khi bán $x$ tấn sản phẩm ( $0 \leq x \leq 100$ ) cho nhà máy $B$ là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$ (triệu đồng). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Để thu được lợi nhuận lớn nhất thì mỗi tháng nhà máy $A$ bán cho nhà máy $B$ khoảng 70,7 tấn sản phẩm (số tấn làm tròn đến hàng phần chục).        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 15. [STER]** Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng để nhanh và phát triển chiều cao trước khi làm đồng, trở bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số  $v(t) = -0,1t^3 + 1,1t^2$ , trong đó  $t$  tính theo tuần,  $v(t)$  tính bằng cm/tuần. Gọi  $h(t)$  là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ  $t$  ( $t \geq 0$ ).



| STT | Mệnh đề                                                                         | Đúng                  | Sai                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | $h(t) = -\frac{1}{40}t^4 + \frac{11}{30}t^3 + 20$ .                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần.                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Chiều cao tối đa của cây lúa là 150cm.                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80cm. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |


**Câu 16. [STER]** Một nhà sản xuất muốn thiết kế một hộp đựng kẹo dạng hình tròn xoay gồm hai phần: Phần thứ nhất được tạo thành khi quay "nửa" hình elip quanh một trục; phần thứ hai là nửa hình cầu có bán kính bằng 4 cm. Nếu xét trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị trên trục là cm thì "nửa" hình elip quay quanh trục Ox để tạo thành phần thứ nhất có phương trình là  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$  với  $-8 \leq x \leq 0$  (xem hình minh họa).



| STT | Mệnh đề                                                                                                                                                | Đúng                  | Sai                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ hai (nửa khối cầu) bằng $\frac{32}{3}\pi$ (cm <sup>3</sup> ).                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)  | Đường thuộc góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}}$ , $-8 \leq x \leq 0$ .                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)  | Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-8}^0 \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}} dx$ (cm <sup>3</sup> ). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)  | Thể tích phần không gian bên trong của hộp đựng kẹo cần thiết kế là $24\pi$ (cm <sup>3</sup> ).                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.**


**Câu 17. [STER]** Để tích trữ nước ngọt sinh hoạt chuẩn bị cho mùa hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, một hộ dân muốn xây một bể nước không nắp dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng  $200\text{ m}^3$ . Đáy bể là hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chi phí xây bể là 850 nghìn đồng/ $\text{m}^2$ . Hãy tính chi phí thấp nhất mà hộ gia đình cần bỏ ra để xây dựng bể chứa nước ngọt dự trữ (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 18. [STER]** Nhà bác Ba có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài  $2\text{ m}$  và chiều rộng  $1\text{ m}$ . Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm được sơn màu xanh, phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 120 nghìn đồng/ $\text{m}^2$  và chi phí sơn màu trắng là 110 nghìn đồng/ $\text{m}^2$ . Hỏi, để sơn toàn bộ số cửa sắt trên, bác Ba phải tốn bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng).



Đáp án:


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 19. [STER]** Trận chung kết Ansean cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 55 000 khán giả. Ban tổ chức bán vé với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình đến sân xem bóng đá là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3 000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất với đơn vị tính giá vé là nghìn đồng?

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|


**Câu 20. [STER]** Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí  $A$  và  $B$  cách nhau  $4km$ . Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí  $C$  nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$ , cách trung điểm  $M$  của đoạn thẳng  $AB$  một khoảng  $4km$ . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước  $C$  đến một vị trí  $I$  nằm giữa đoạn thẳng  $MC$  sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy  $A$  và  $B$  (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu  $km$ ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|


**Câu 21. [STER]** Để chế tác một hạt cường, người ta lấy một khối vật thể có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi trục  $Ox$  và nửa trên của elip  $\frac{x^2}{1,5^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$  (một đơn vị dài trên mỗi trục tọa độ tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế) quanh trục  $Ox$ ; sau đó khoan dọc theo trục xoay (xem hình dưới). Lỗ khoan có dạng hình trụ với bán kính  $0,2\text{ cm}$  và có trục nằm trên trục xoay. Phần còn lại sau khi khoan là hạt cường, có dạng một khối tròn xoay. Thể tích của hạt cường đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Lưu ý: Các kích thước trong hình minh họa có thể không đúng tỉ lệ thực tế.

Đáp án:

**Câu 22. [STER]** Ở một vịnh biển, ngoài khơi xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây dựng khu đô thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ  $Oxy$  với đơn vị tương ứng 1km có hòn đảo ở  $O$  thì đường bao của phần đất lấn biển có dạng là một phần của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 + 2}{x}$ . Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp án: