

## Dãy số Fibonacci và các tính chất


**Định nghĩa** *Dãy Fibonacci là dãy các số tự nhiên, kí hiệu  $F_0, F_1, F_2, \dots, F_n, \dots$  thỏa mãn*

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, \dots, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ với mọi } n \geq 2.$$

Ta có thể liệt kê một loạt các số hạng đầu của dãy Fibonacci, chú ý đến tính chất tổng 2 số hạng liên tiếp nhau bằng số hạng đứng liền kề ngay sau 2 số hạng đó

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

1. Hoàn toàn tương tự như việc sử dụng tam giác Pascal để tính các hệ số khi khai triển *nhị thức Newton*, các số hạng của dãy Fibonacci cũng được tính bằng việc *cộng các số nằm dọc theo các đoạn thẳng chéo xiên song song* (màu đỏ) trong tam giác Pascal, xem hình vẽ bên dưới



Chú ý đến tính chất của các số tổ hợp  $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$ , ta có thể kiểm tra tổng các số nằm trên đoạn thẳng kẻ xiên cuối cùng bằng tổng các số nằm trên 2 đoạn thẳng kẻ trên nó.

$$1 + 8 = 9, 7 + 21 = 28, 15 + 20 = 35, 10 + 15 = 25.$$

Tính chất này của dãy Fibonacci có thể viết dưới dạng  $F_{n+1} = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_{n-i}^i$ .

2. Bây giờ chúng ta sẽ tính số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci. Kí hiệu véc tơ  $\{\mathbf{a}_n = (F_{n-1}, F_n)\}$  và ma trận  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  Hiển nhiên  $\mathbf{a}_2 = A\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3 = A\mathbf{a}_2 = A^2\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n = A^{n-1}\mathbf{a}_1$ . Để tính  $A^{n-1}$  ta chéo hóa

ma trận  $A$ ,  $A = P \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} P^{-1}$  (trong đó  $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$  là 2 giá trị riêng của  $A$ ). Vậy

$$A^n = P \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Từ đẳng thức  $\mathbf{a}_n = A^{n-1}\mathbf{a}_1$ , suy ra  $F_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ . Thay  $n = 0$  và  $n = 1$  vào đây ta tính được  $C_1, C_2$ . Vậy số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n. \quad (*)$$

3. Sử dụng (\*) hoặc bằng phương pháp quy nạp ta có thể chứng minh nhiều hệ thức khác của các số Fibonacci. Chẳng hạn

$$F_{n-1} \cdot F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n \text{ hay } F_{n+1} = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} F_i.$$

4. Chuỗi lũy thừa  $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} F_k x^k = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \dots$  được gọi là *hàm sinh* của dãy Fibonacci. Để dàng chứng minh bằng quy nạp  $F_n < 2^n$  suy ra chuỗi hội tụ tuyệt đối với mọi  $|x| < \frac{1}{2}$ . Tổng của chuỗi được tính như sau

$$\begin{aligned} F(x) &= F_0 + F_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} F_k x^k \\ &= x + \sum_{k=2}^{\infty} (F_{k-1} x^k + F_{k-2} x^k) \\ &= x + x \sum_{k=2}^{\infty} F_{k-1} x^{k-1} + x^2 \sum_{k=2}^{\infty} F_{k-2} x^{k-2} \\ &= x + (x + x^2) F(x) \end{aligned}$$

Suy ra

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

5. Khai triển hàm sinh thành chuỗi Maclaurin  $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{x}{(1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}x)(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{(1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}x)} - \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^k - \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^k \right] x^k. \end{aligned}$$

Đây là một cách khác sử dụng khai triển hàm sinh để tính số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci như đã chỉ ra trong (\*).

6. Gọi  $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n + F_{n-1}}{F_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = 1 + \frac{1}{\frac{F_n}{F_{n-1}}} = 1 + \frac{1}{x}$  hay  $x^2 - x - 1 = 0, x > 0$ .

Suy ra  $x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ . Người ta còn gọi giới hạn này là *tỉ số vàng*. Nó xấp xỉ 1,618034...

Tam giác cân  $ABC$  trích từ ngũ giác đều như hình dưới đây có tỉ số các độ dài giữa cạnh bên và đáy  $\frac{b}{a} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  là tỉ số vàng.

