TEAM DỰ ÁN LÝ THẦY QUYẾT
ĐỀ SỐ 1

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn thi: VẬT LÍ 12

Họ, tên thí sinh:.....

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: [NB] Đặc điểm nào sau đây là của chất rắn kết tinh:

A. có cấu trúc mạng tinh thể. **B.** không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. có tính đẳng hướng. **D.** các phân tử chuyển động hỗn loạn không có vị trí cân bằng.

Câu 2: [NB] Hiện tượng thăng hoa là quá trình chuyển thể từ

A. rắn sang lỏng. **B.** lỏng sang khí. **C.** rắn sang khí. **D.** khí sang lỏng.

Câu 3: [TH] Chọn phát biểu **đúng** về sự bay hơi, sự sôi và tốc độ bay hơi:

A. Sự bay hơi chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng, còn sự sôi xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng.

B. Sự bay hơi và sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi xác định.

C. Tốc độ bay hơi chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng và gió.

D. Tốc độ bay hơi càng nhanh khi diện tích mặt thoáng lớn, nhiệt độ cao, tốc độ gió mạnh và độ ẩm của môi trường thấp.

Câu 4: [NB] Nội năng của một vật là

A. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. nhiệt lượng mà vật nhận được.

C. công mà vật thực hiện. **D.** tổng động năng của vật và thế năng của vật trong trọng trường.

Câu 5: [TH] Một khối khí trong cylinder (xy-lanh) nhận nhiệt lượng $100\ \text{J}$ đồng thời bị nén bởi một công là $50\ \text{J}$. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu?

A. $50\ \text{J}$. **B.** $-150\ \text{J}$. **C.** $150\ \text{J}$. **D.** $-50\ \text{J}$.

Câu 6: [NB] Nhiệt kế y tế thường được sử dụng trong các cơ sở y tế nước ta hiện nay là nhiệt kế thủy ngân. Loại nhiệt kế này hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào?

A. Sự thay đổi màu sắc của vật theo nhiệt độ. **B.** Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

C. Sự thay đổi điện trở của vật theo nhiệt độ. **D.** Hiện tượng bức xạ nhiệt.

Câu 7: [NB] Trong thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ tại đó mà động năng phân tử bằng 0 và thế năng tương tác giữa các phân tử tối thiểu. Nhiệt độ này gọi là

A. điểm sôi của nước. **B.** điểm nóng chảy của nước đá.

C. độ không tuyệt đối. **D.** nhiệt độ phòng.

Câu 8: [NB] Nhiệt dung riêng của một chất cho biết

A. nhiệt lượng cần thiết để làm cho $1\ \text{kg}$ chất đó nóng chảy hoàn toàn.

B. nhiệt lượng cần thiết để làm cho $1\ \text{kg}$ chất đó tăng thêm $1°\text{C}$ (hoặc $1\ \text{K}$).

C. khả năng dẫn nhiệt của chất đó.

D. tổng nhiệt lượng mà vật có thể chứa được.

Câu 9: [NB] Nhiệt lượng cần cung cấp để làm $1\ \text{kg}$ chất rắn chuyển hoàn toàn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt lượng này dùng để phá vỡ cấu trúc tinh thể chứ không làm tăng nhiệt độ của vật gọi là

A. nhiệt dung riêng. **B.** nhiệt nóng chảy riêng. **C.** nội năng. **D.** nhiệt độ nóng chảy.

Câu 10: [TH] Trong suốt quá trình một khối nước đá đang tan thành nước ở nhiệt độ $0°\text{C}$, nhiệt độ của hệ

A. tăng dần. **B.** giảm dần. **C.** không thay đổi. **D.** tăng rồi giảm.

Câu 11: [NB] Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng trong hệ SI là

A. $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$. **B.** $\text{J}\cdot\text{kg}$. **C.** $\frac{\text{J}}{\text{K}}$. **D.** $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.

Câu 12: [TH] Bị bỏng do hơi nước sôi ở $100°\text{C}$ thường nặng hơn bị bỏng do nước sôi ở $100°\text{C}$., là vì

A. hơi nước có nhiệt dung riêng lớn hơn nước.


B. hơi nước truyền nhiệt tốt hơn nước.

C. khi ngưng tụ, hơi nước tỏa ra một nhiệt lượng bằng nhiệt hóa hơi riêng.

D. hơi nước có khối lượng riêng nhỏ hơn nên linh động hơn.

PHẦN II. Thí sinh chọn đúng hoặc sai cho các ý a), b), c), d) trong 2 câu hỏi dưới đây.

Câu 1: Một ấm đun nước pha trà có công suất không đổi và có nhiệt kế hiển thị nhiệt độ tức thời của nước trong ấm. Một bạn học sinh dùng ấm này để đun nước với lượng nước có sẵn ở trong ấm, nhiệt độ hiển thị ban đầu là $t_0 = 20°C$. Sau khoảng thời gian đun $\tau_1 = 1$ phút thì nhiệt độ của nước tăng lên tới $t_1 = 40°C$ và bạn học sinh bắt đầu thêm nước ở nhiệt độ t_x vào trong ấm. Tại thời điểm $\tau_2 = 3,5$ phút thì nhiệt độ của nước đạt $t_2 = 50°C$. Sau khoảng thời gian 5 phút kể từ thời điểm τ_2 thì nước bắt đầu sôi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước trong ấm trong quá trình đun. Bỏ qua mất mát nhiệt ra môi trường và quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh chóng.



a) [NB] Khi nhiệt độ của nước tăng lên thì nội năng của nước cũng tăng lên.

b) [NB] Tốc độ tăng nhiệt độ của nước trong giây thứ nhất lớn hơn trong giây thứ 8.

c) [TH] Nếu công suất của ấm là $\mathrm{P} = 2100\,\mathrm{W}$ thì nhiệt lượng do ấm cung cấp từ thời điểm ban đầu đến lúc nước bắt đầu sôi là $714\,\mathrm{kJ}$.

d) [VD] Nhiệt độ ban đầu của lượng nước thêm vào là $t_x = 10°C$.

Câu 2: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm khảo sát khả năng làm nguội nước nhờ gió ở điều kiện nhiệt độ phòng $25°C$. Nhóm sử dụng 2 kg nước có nhiệt độ ban đầu là $50°C$. Dùng quạt thổi qua chậu nước ở các chế độ khác nhau và đo nhiệt độ của nước sau mỗi phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là $C = 4200\ \mathrm{J/kg \cdot K}$. Kết quả đo được ghi vào bảng như sau:

Chế độ hoạt động	Nhiệt độ nước ($°C$) thay đổi theo thời gian.				
	1 phút	2 phút	3 phút	4 phút	5 phút
Không có gió	46	43,5	41,5	40	39
Tốc độ gió nhỏ	45	42	39,5	37,8	36,5
Tốc độ gió lớn	43	39	36	34	32,3

a) [NB] Tốc độ gió càng mạnh thì nhiệt độ nước giảm càng chậm.

b) [NB] Khi tốc độ gió lớn thì nội năng của nước cũng tăng nhanh hơn so với khi tốc độ gió nhỏ.


c) [TH] Trong 5 phút, tốc độ giảm nhiệt độ trung bình của nước khi tốc độ gió nhỏ là $2,7\ \mathrm{K/phút}$.

d) [VD] Trong 5 phút, nhiệt lượng $2\,\mathrm{kg}$ nước mất đi khi tốc độ gió lớn nhiều hơn $31,08\,\mathrm{kJ}$ so với khi không có gió.

PHẦN III. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: [TH] Một lượng khí nhận một nhiệt lượng $35,4\,\mathrm{kJ}$ do được đun nóng, khí giãn ra và thực hiện một công $20,0\,\mathrm{kJ}$ ra môi trường xung quanh. Nội năng của khối khí này đã biến thiên một lượng bao nhiêu kilôjun (kJ)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).


Câu 2: [VD] Hình dưới đây là đồ thị mô tả nhiệt độ tại một địa điểm ở vùng ôn đới vào một ngày mùa đông. Biết nhiệt độ đóng băng của nước theo thang nhiệt độ Kelvin là $273\,\mathrm{K}$.




Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ghi nhận theo thang đo nhiệt độ Kelvin là bao nhiêu?

Câu 3: [VD] Trong thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của của rượu, lúc đầu lượng rượu trong nhiệt lượng kế có khối lượng là $100\ g$ và bắt đầu sôi. Khi cung cấp nhiệt lượng $42\ kJ$, sau một thời gian, lượng rượu trong bình giảm còn $50\ g$. Theo kết quả thí nghiệm trên, nhiệt hóa hơi riêng của rượu có giá trị bằng bao nhiêu kJ/kg?

Câu 4: [VD] Một nhóm học sinh lớp 12 thực hiện thí nghiệm thực hành đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Họ đã lựa chọn bộ dụng cụ thí nghiệm như hình. Họ cho viên nước đá có khối lượng $0{,}02\ kg$ và một ít nước vào bình nhiệt lượng kế sao cho dây điện trở chìm trong hỗn hợp nước và nước đá. Sau đó tiến hành thí nghiệm và thu được kết quả thí nghiệm như bảng dưới:



Thời gian τ (s)	Nhiệt độ t (°C)	Công suất P (W)
0	0	11,13
120	0	11,09
240	0	11,10
350	0	11,14
480	0	11,18
600	0	11,13
720	0,3	11,12
840	0,6	11,15
960	1,1	11,12



Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá trong thí nghiệm trên bằng bao nhiêu 10^5 (J/kg)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 3

Câu 1: Người ta cung cấp nhiệt lượng $20{,}6\ J$ cho một lượng khí trong xilanh đặt nằm ngang. Lượng khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều đi được $4\,cm$. Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là $15\ N$. Q và A là nhiệt lượng và công mà hệ nói trên nhận từ vật khác hoặc truyền cho vật khác, Q và A tuân theo quy ước dấu của định luật I của nhiệt động lực học.

a) [VD] Xác định độ lớn của công mà chất khí thực hiện để pít-tông chuyển động đều.

b) [TH] Xác định độ biến thiên nội năng của khí.

Câu 2: Một ấm điện có công suất $1000\,W$ chứa $300\,g$ nước ở $20°C$ được đun sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4{,}2\cdot10^3\,J/kg\cdot K$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Xác định:

a) [TH] nhiệt lượng để làm nóng $300\,g$ nước từ $20°C$ đến $100°C$.

b) [VD] thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi.

Câu 3: Để đúc các vật bằng thép, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào lò có nhiệt độ $20°C$. Hiệu suất của lò là $60\,\%$, .Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết $200\,kg$ than đá có năng suất tỏa nhiệt là $29\cdot10^6\,J/kg$. Cho biết thép có nhiệt nóng chảy riêng là $\lambda = 83{,}7\cdot10^3\,J/kg$; nhiệt độ nóng chảy là $1400°C$; nhiệt dung riêng ở thể rắn là $0{,}46\,kJ/kg\cdot K$. Xác định:

a) [TH] Nhiệt lượng than đá cung cấp.

b) [VD] Khối lượng của mẻ thép nấu chảy.

---HẾT---

TEAM DỰ ÁN LÝ THẦY QUYẾT
ĐỀ SỐ 2

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn thi: VẬT LÍ 12

Họ, tên thí sinh:.....

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: [NB] Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng vì

A. phân tử khí không có khối lượng. **B.** khoảng cách giữa các phân tử khí quá gần nhau.

C. lực tương tác giữa các phân tử quá nhỏ. **D.** các phân tử khí luôn đẩy nhau.

Câu 2: [NB] Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

A. Có hình dạng và thể tích riêng. **B.** Có các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

C. Có thể nén được dễ dàng. **D.** Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương

Câu 3: [NB] Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi?

A. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh.

B. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.

C. Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng.

D. Đưa nước vào trong tủ lạnh để làm đá.

Câu 4: [NB] Nội năng của một vật phụ thuộc vào

A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng. **B.** nhiệt độ và áp suất.

C. nhiệt độ và thể tích của vật. **D.** nhiệt độ, áp suất và thể tích.

Câu 5: [NB] Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của Nguyên Lý I nhiệt động lực học?

A. $\Delta U = A + Q$. **B.** $\Delta U = Q$. **C.** $\Delta U = A$. **D.** $A + Q = 0$.

Câu 6: [NB] Nội năng của một vật là

A. tổng động năng và thế năng của vật.

B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 7: [NB] Kết luận nào dưới đây là **không** đúng với thang nhiệt độ Celsius?

A. Kí hiệu của nhiệt độ là t. **B.** Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất $1\ \text{atm}$ là $0°\text{C}$.

C. $1°\text{C}$ tương ứng với $273\ \text{K}$. **D.** Đơn vị đo nhiệt độ là $°\text{C}$.

Câu 8: [NB] Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm $6\ \text{K}$ thì

A. nhiệt độ Celsius tăng thêm hơn $6°\text{C}$. **B.** nhiệt độ Celsius tăng thêm $279°\text{C}$.

C. nhiệt độ Celsius tăng thêm $6°\text{C}$. **D.** nhiệt độ Celsius tăng thêm $267°\text{C}$.

Câu 9: [NB] Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Kelvin và nhiệt độ theo thang Celsius (khi làm tròn số) là

A. $T\ \text{K} = t\ °\text{C} + 273$. **B.** $T\ K = t\ °C - 273$.

C. $T\ \text{K} = \dfrac{t\ °\text{C}}{273}$. **D.** $T\ K = 273 \cdot t\ °\text{C}$.

Câu 10: [NB] Biết nhiệt dung riêng của nước và của nước đá lần lượt là $c_1 = 4200\ \text{J/kg} \cdot \text{K}$ và $c_2 = 2100\ \text{J/kg} \cdot \text{K}$. Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

A. Để $1\ \text{kg}$ nước tăng thêm $1°\text{C}$ thì cần cung cấp cho nước nhiệt lượng $4200\ \text{J}$.

B. Để $1\ \text{kg}$ nước đá tăng thêm $1°\text{C}$ thì cần cung cấp cho nước đá nhiệt lượng $2100\ \text{J}$.

C. Với cùng một khối lượng, khi cung cấp nhiệt lượng như nhau thì độ tăng nhiệt độ của nước đá và nước như nhau.

D. Nếu được cung cấp cùng một nhiệt lượng và độ tăng nhiệt độ của nước đá và nước là như nhau thì khối lượng nước đá gấp đôi khối lượng nước.

Câu 11: [NB] Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó

A. hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi. **B.** hoá hơi hoàn toàn.


C. tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi và hoá hơi hoàn toàn. **D.** tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi.

Câu 12: [TH] Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5\ \text{J/kg}$. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn $100\ \text{g}$ nước đá ở $0°\text{C}$ bằng

A. $0,34 \cdot 10^3\ \text{J}$. **B.** $340 \cdot 10^5\ \text{J}$. **C.** $34 \cdot 10^7\ \text{J}$. **D.** $34 \cdot 10^3\ \text{J}$.

PHẦN II. Thí sinh chọn đúng hoặc sai cho các ý a), b), c), d) trong 2 câu hỏi dưới đây.

Câu 1: Đốt nóng khối khí trong xi lanh đặt nằm ngang bằng ngọn lửa đèn cồn như hình vẽ. Khí giãn nở đẩy pít - tông từ vị trí (1) đến vị trí (2).



a) [NB] Khối khí trong xi lanh nhận nhiệt lượng Q $(Q > 0)$.

b) [NB] Khí giãn nở và nhận công A $(A > 0)$.

c) [NB] Lượng khí bên trong xilanh nhận nhiệt và sinh công làm biến đổi nội năng.

d) [TH] Khi khối khí trong xi lanh nhận được một nhiệt lượng $150\ \text{J}$ thì khối khí giãn nở thực hiện một công $5\ \text{J}$ đẩy pittong dịch chuyển. Nội năng của khối khí trong quá trình này tăng $145\ \text{J}$.

Câu 2: Trong các nhận định sau, nhận định nào **đúng**, nhận định nào **sai** khi nói về thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Kelvin?

a) [NB] Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó động năng chuyển động nhiệt của phân tử là bằng không và thế năng tương tác phân tử là tối thiểu.

b) [NB] Ở nước ta thang nhiệt độ Celsius được sử dụng phổ biến trong đời sống.

c) [TH] $1°\text{C}$ tương ứng với $273\ \text{K}$.

d) [TH] Nếu trong thang Celsius, nhiệt độ của vật tăng $3°\text{C}$ thì theo thang nhiệt độ của Kelvin, nhiệt độ tuyệt đối của vật cũng tăng tương ứng là $3\ \text{K}$.

PHẦN III. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: [TH] Hình dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất X.



Nhiệt độ đông đặc của chất X tính theo đơn vị K là bao nhiêu?

Câu 2: [VD] Khi một lượng nước nhất định chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi, công do các phân tử thực hiện chống lại áp suất bên ngoài là $450\ \text{J}$. Trong quá trình này, nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống là $7100\ \text{J}$. Bao nhiêu $\%$ tổng nhiệt lượng làm tăng nội năng của các phân tử (làm tròn đến phần nguyên)?

Câu 3: [VD] Một nhân viên spa muốn pha nước tắm cho các bé, nhân viên này mở vòi nước nóng ở $90°\text{C}$ và vòi nước lạnh ở $10°\text{C}$ đồng thời chảy vào bể đã chứa sẵn 50 lít nước ở $20°\text{C}$. Biết lưu lượng của mỗi vòi là $0,25$ lít/giây. Hệ thống massage được mở liên tục trong quá trình bơm nước vào bể để tạo dòng nước, khuấy đều để nhiệt độ nước tăng đều. Bỏ qua sự truyền nhiệt với bể chứa và môi trường. Xem khối lượng riêng của nước nóng và lạnh đều bằng $997\ \text{kg/m}^3$. Để thu được nước có nhiệt độ $40°\text{C}$ thì nhân viên cần mở hai vòi chảy liên tục trong bao nhiêu giây? (kết quả lấy đến chữ số hàng đơn vị).


Câu 4: [TH] Người ta thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của đồng với một miếng đồng kim loại có khối lượng $850\ \text{g}$. Lúc đầu, nhiệt độ của miếng đồng là $15°\text{C}$. Ghi lại thời gian từ khi bật bộ phận đốt nóng đến khi nhiệt độ miếng đồng tăng tới $30°\text{C}$. Sau đó, miếng đồng được làm nguội về nhiệt độ ban đầu và thí nghiệm được lặp lại. Kết quả đo được ghi lại và tính trung bình như sau:

Công suất trung bình của bộ phận đốt nóng (W)	Thời gian đốt nóng trung bình (s)
80	73

Theo kết quả của thí nghiệm này, nhiệt dung riêng của đồng bằng bao nhiêu $\text{J/kg} \cdot \text{K}$ (làm tròn đến phần nguyên)?

PHẦN IV. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 3

Câu 1: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian.




a. [TH] Mô tả sự chuyển thể của nước từ $t = 0$ phút đến $t = 3,5$ phút?

b. [VD] Xác định nhiệt độ nóng chảy của nước?

Câu 2: Một động cơ xăng đốt trong 4 kỳ cấu tạo như hình bên, sẽ sinh công thông qua 4 hành trình của piston: nạp, nén, nổ, xả.

1. **Nạp**: Van nạp mở, piston đi xuống, khí và nhiên liệu được hút vào xi lanh.
2. **Nén**: Tất cả các van được đóng, piston đi lên nén khí, bugi đánh lửa.
3. **Nổ**: Khí và nhiên liệu nén phát nổ, đẩy piston đi xuống.
4. **Xả**: Van xả mở, piston đi lên đẩy khí thải ra ngoài.



a) [TH] Xác định hành trình sinh công của động cơ?

b) [VD] Một động cơ xăng 4 kỳ gắn vào một xe máy có hiệu suất đạt 30 %. Cho biết năng suất tỏa nhiệt của xăng $q = 44,8$ MJ/kg, xăng có khối lượng riêng $D = 700$ kg/m^3. Biết trung bình để xe máy đi 1 km cần cung cấp năng lượng 190 kJ. Nếu động cơ tiêu thụ hết 1 lít xăng thì xe máy đã đi một quãng đường là bao nhiêu km?

Câu 3: Một ấm điện chứa đầy $1,3$ kg nước ở nhiệt độ 20°C. Công suất của ấm là 2 kW. Sau khi đóng công tắc 220 s thì nước bắt đầu sôi. Nếu ấm vẫn tiếp tục đun thì sau khoảng thời gian Δt kể từ lúc sôi thì khối lượng nước còn lại trong ấm là 200 g (phần còn lại đã hóa hơi). Biết điểm sôi của nước là 100°C và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,26$ kJ/g. Cho rằng toàn bộ nhiệt lượng mà ấm tạo ra đều được nước hấp thụ.

a) [VD] Xác định nhiệt dung riêng của nước trong ấm?

b) [VD] Tìm khoảng thời gian Δt.

---HẾT---

TEAM DỰ ÁN LÝ THẦY QUYẾT
ĐỀ SỐ 3

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn thi: VẬT LÍ 12

Họ, tên thí sinh:.....

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. [NB] Lực liên kết giữa các phân tử trong chất rắn

A. yếu hơn trong chất lỏng. **B.** mạnh hơn thể lỏng và thể khí.
C. yếu hơn trong chất khí. **D.** yếu hơn thể lỏng và thể khí.

Câu 2. [NB] Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ chuyển thành tơ nhện. Quá trình protein chuyển thành tơ nhện là

A. sự bay hơi. **B.** sự nóng chảy. **C .** sự ngưng tụ. **D.** sự đông đặc.

Câu 3: [TH] Trong các chất rắn, lỏng, khí, chất khó nén là

A. chất rắn, chất lỏng. **B.** chất khí, chất rắn. **C.** chỉ có chất rắn. **D.** chất khí, chất lỏng

Câu 4: [TH] Tại sao khi cầm vào vỏ bình gas mini đang sử dụng ta thường thấy có một lớp nước rất mỏng trên đó?

A. Do hơi nước từ tay ta bốc ra.
B. Do vỏ bình gas lạnh hơn nhiệt độ môi trường nên hơi nước trong không khí ngưng tụ trên đó.
C. Nước từ trong bình ga thấm ra.
D. Do vỏ bình ga hút nước.