# 三维空间刚体运动

# 旋转矩阵


### 1.点,向量和坐标系

- 点是指空间中的基本元素,向量是指某点指向某点的有方向的箭头,而点和向量都只有在坐标系中 讨论才有意义。
- 复习一下线代的知识,关于向量的运算!
  - 。 基底:不共线的向量 $e_1$ , $e_2$ 叫做这一平面内所有向量的一组基底,平面上任何向量(包括零向量)都可以用基底表示。

空间中也是如此,任意向量a在空间的一组基 $(e_1,e_2,e_3)$ 有这样一个坐标:

$$a=egin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}egin{bmatrix} a_1\ a_2\ a_3\end{bmatrix}=a_1e_1+a_2e_2+a_3e_3$$

○ 坐标系:右手系为伸开右手,大拇指是X轴正方向,食指是Y轴正方向,其他三个手指是Z轴正方向,左手系同理。



○ 向量内积:内积可理解为第一个向量投影到第二个向量上(无所谓向量的顺序),可以表示为

$$a \cdot b = a^T b = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = |a||b|cos < a,b > \ a,b \in R^3$$

。 向量外积,a和b的外积结果是一个法向量,垂直于a和b构成的平面。 还有一个用途是通过两个向量的外积,生成第三个垂直于a,b的法向量,从而构建X、Y、Z坐标系。

外积可以表示为
$$a imes b = egin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} b \overset{def}{=} a \wedge b$$

式中^符号,可以理解为反对称符号,将向量a写成一个矩阵,这样两个向量的乘法就变成了矩阵和向量的乘法,把它变成线性运算。

### 2.坐标系间的欧式变换

- 欧式变换:由两个坐标系间的旋转和平移运动组成。
- 描述坐标系间的运动: 旋转矩阵和平移矩阵
  - 。 书中关于旋转矩阵的推导:用一个正交正交基 $(e_1,e_2,e_3)$ 很形象的代表一个三维坐标系,现在这个坐标系动了一下,变成 $(e_1',e_2',e_3')$ ,而曾经在坐标系中有一个向量小a,自身在坐标系中的位置也随着坐标系在变化,前后变化是 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T$ 和 $\begin{bmatrix} a_1' & a_2' & a_3' \end{bmatrix}^T$ 。

接下来的推导其实很简单,正交基和这个向量在坐标系的位置相乘就等于向量本身,所以可以 得出

$$egin{bmatrix} \left[e_1 & e_2 & e_3
ight] \left[egin{matrix} a_1 \ a_2 \ a_3 \end{matrix}
ight] = \left[egin{matrix} e'_1 & e'_2 & e'_3 \end{matrix}
ight] \left[egin{matrix} a'_1 \ a'_2 \ a'_3 \end{matrix}
ight]_T$$

将等式简化,可以两边同时左乘 $\begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \end{bmatrix}^T$ ,这样左边的系数就会变为1,整个式子会变成这个样子

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T e_1' & e_1^T e_2' & e_1^T e_3' \\ e_2^T e_1' & e_2^T e_2' & e_2^T e_3' \\ e_3^T e_1' & e_3^T e_2' & e_3^T e_3' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} \stackrel{def}{=} Ra'$$

是的,中间那一大块就是旋转矩阵了。

看上去比较复杂难懂,但其实旋转矩阵就是绕三个轴的基本旋转的序列复合。

#### ○ 平移矩阵

同理,平移矩阵也是在三个轴方向不同移动的复合。坐标系1到坐标系2的平移移动中,向量a 在两个坐标系下的坐标为 $a_1, a_2$ ,它们的关系是:

$$a_1 = R_{12}a_2 + t_{12}$$

其中 $R_{12}$ 指坐标系2的向量变换到坐标系1中, $t_{12}$ 指从坐标系1到坐标系2的平移向量。

### 3.变换矩阵与齐次坐标

- ullet 变换矩阵:当我们拥有旋转矩阵和平移矩阵后,人们更喜欢用一个统一简单的形式来描述欧式变换,这就诞生了变换矩阵: $T=egin{bmatrix} R & t \ 0^T & 1 \end{bmatrix}$
- 齐次坐标: 当旋转矩阵和平移矩阵并排放在一起形成一个4X3的矩阵时,一切都显得那么不和谐, 所以我们在三维向量底部添加1,使之变为4X4的向量,称为齐次坐标。

# 旋转向量和欧拉角

用几何的方式来描述旋转

旋转向量:是一个三维向量,其方向与旋转轴一致,长度等于旋转角。相比起旋转矩阵来说可以更 紧凑简洁的描述旋转信息。

旋转向量到旋转矩阵的转换——由罗德里格斯公式完成。

$$R = cos\theta I + (1 - cos\theta)nn^T + sin\theta \hat{n}$$

转角 $heta=rccosrac{tr(R)-1}{2}$ ,转轴Rn=n,因此,转轴n是矩阵R特征值对应的特征向量。

- 欧拉角:假设一架飞机在天上飞行,飞机正前方为X轴,飞机右侧为Y轴,正上方为Z轴,那么可以 把任意的旋转分解为这三个轴上的转角。
- 1. 绕飞机的Z轴旋转,得到偏航角yaw;
- 2. 绕**旋转后的**Y轴旋转,得到俯仰角pitch;
- 3. 绕**旋转后的**X轴旋转,得到滚转角roll。 用这样三个分离的转角欧拉角,可以很形象的看到旋转的变化,不像矩阵那样难懂。
- 万向锁:选择±90°作为pitch角,就会导致第一次旋转和第三次旋转等价,整个旋转表示系统被限制在只能绕竖直轴旋转,丢失了一个表示维度。

对万向锁的理解:在网上有解释比较详细,是以手机为例,长边为X轴,短边为Y轴,屏幕方向为Z轴,假如绕Y轴不是90度,那么手机可以任意旋转;假如绕Y轴旋转了90度,接下来的旋转不管是绕X轴还是绕Z轴,Z轴会永远平行与桌面。

### 四元数

人们喜欢紧凑,精巧的表达旋转的方式,同时既不像旋转矩阵那样有兀余性,又不像欧拉角那样有 奇异性,这就诞生了四元数,其在计算机图形学,物理学上有大量的应用。

• 什么是四元数:四元数是数学家Hamilton找到的一种扩展的复数,形如 $q=q_0+q_1i+q_2j+q_3k$ (其中, $i^2=k^2=j^2=ijk=-1$ ),四元数也可以写成标量和向量的有序对形式,即实

部与虚部分开,并用一个三维的向量表示虚部。

$$q = [s,v] \ (v = egin{bmatrix} x \ y \ z \end{bmatrix} s, x, y, z \in R)$$

- 四元数的简单理解:复数的运算可以形象的表示在二维中向量的运动,两个复数相乘实际上是旋转与缩放的组合。到三维空间中,也有相应的四元数可以表示向量的旋转。
- 四元数表示旋转:

定义点p(x,y,z),点p用虚四元数表示为 $p=\begin{bmatrix}0,x,y,z\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}0,v\end{bmatrix}^T$ ,这样可以看作四元数三个虚部与空间中的三个轴对应,旋转后的点 $p'=qpq^{-1}$ ,最后把p'的虚部取出,即为旋转之后点的坐标。

- 。 四元数到旋转矩阵的变换关系: 设 $q=[s,v]^T$ 则有 $R=vv^T=s^2I+2s\hat{v}+(\hat{v})^2$
- 四元数到旋转向量的转换公式:

$$egin{cases} heta = 2 arccos q_0 \ igl[ n_x, n_y, n_z igr]^T = igl[ q_1, q_2, q_3 igr]^T / sin rac{ heta}{2} \end{cases}$$

# 相似,仿射,射影变换

• 相似变换: 允许物体均匀缩放。

$$T_s = egin{bmatrix} sR & t \ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

• 仿射变换:对物体平移+线性变换,平行关系,比例关系都不变。

$$T_A = egin{bmatrix} A & t \ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

• 射影变换(透视变换),像油画里的透视关系一样,满足近大远小。

$$T_P = egin{bmatrix} A & t \ a^T & v \end{bmatrix}$$