

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\Delta\theta_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

Vicsek

$$\theta'_i = \text{atan2}\left(\sum_j \sin \theta_j, \sum_j \cos \theta_j\right) + \Delta\theta_i(t)$$

suma sobre $j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}$

Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\})$$
$$\theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \Delta\theta_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995


Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

Movimiento y condiciones periódicas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = [\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t] \bmod L$$

Implementación


Motor



- Java. Dos buffers de θ : la regla lee $\theta(t)$, nunca θ' (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para S : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- $\eta \in \{0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; \dots; 5,5; 6,28\}\text{rad}$

Para el estudio de clusters (S)

- $\rho = \frac{1}{3\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}$ ($N = 11, 16, 32$)
Observación: $\langle k \rangle \approx \rho \pi r_c^2 < 1$.

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_V} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$


c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ($t \geq T/2$, con T la duración total), ya dentro del estacionario.

- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 seeds distintas por punto (modelo, ρ , η)
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral


Resultados

Vicsek: animación



$\eta = 0.5\text{rad}$, $v_a = 0.98$

youtu.be/P-lkSdXIhaI



$\eta = 4\text{rad}$, $v_a = 0.04$

youtu.be/ez4dm6Y6-3w


Vicsek, $\rho = 2$ ($N = 200$)

Vectores = velocidad,
color = ángulo.

Fotograma en $t = 1500\text{s}$;
los v_a son de ese instante,
no promedios.

$L = 10\text{m}$, $r_c = 1\text{m}$,
 $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$.

Vicsek: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1


Variables

$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Referencia

Trazo punteado: inicio del estacionario.

Vicsek: v_a vs η




Fijos

- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

η : 15 valores entre 0 y 6,28rad
 ρ : 6 valores entre $\frac{1}{3\pi}$ y 8

Vicsek: $S(t)$



Fijos

- Modelo: Vicsek
- $\rho = 2$ ($N = 200$)
- Seed: 1


Variables

$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Referencia

Eje vertical acotado a los datos.

Vicsek: S vs η



Fijos


- Modelo: Vicsek
- 50 seeds por punto

Variables

η : 15 valores entre 0 y 6,28 rad

ρ : 6 valores entre $\frac{1}{3\pi}$ y 8

Vicsek: v_a vs S




Fijos

Modelo: Vicsek
50 seeds por punto

Variables


Un punto por η
 ρ : bajas (izq.), exigidas (der.)

Votante: animación



$$\eta = 0.5 \text{ rad}, v_a = 0.55$$

youtu.be/tHQbmPHvScs



$$\eta = 4 \text{ rad}, v_a = 0.10$$

youtu.be/UtGcnTB9IRE


Votante, $\rho = 2$ ($N = 200$)

Vectores = velocidad,
color = ángulo.

Fotograma en $t = 1500$ s;
los v_a son de ese instante,
no promedios.

$L = 10 \text{ m}$, $r_c = 1 \text{ m}$,
 $v = 0.03 \text{ m/s}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$.

Votante: $v_a(t)$



Fijos

- Modelo: votante
- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- Seed: 1


Variables

$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Referencia

Sin trazo punteado cuando no se identifica un estacionario.

Votante: v_a vs η



Fijos


- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

η : 15 valores entre 0 y 6,28rad

ρ : 6 valores entre $\frac{1}{3\pi}$ y 8

Vicsek vs votante: v_a vs η



Fijos

- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- 50 seeds por punto

Variables


Modelo $\in \{\text{Vicsek}, \text{votante}\}$

η : 15 valores entre 0 y 6,28 rad

Referencia

Misma forma en $\rho = 2$ y 8.

Votante: $S(t)$



Fijos

- Modelo: votante
- $\rho = 2$ ($N = 200$)
- Seed: 1


Variables

$$\eta \in \{0, 0.5, 2\} \text{ rad}$$

Referencia

Eje vertical acotado a los datos.

Votante: S vs η



Fijos


- Modelo: votante
- 50 seeds por punto

Variables

η : 15 valores entre 0 y 6,28 rad

ρ : 6 valores entre $\frac{1}{3\pi}$ y 8

Votante: v_a vs S




Fijos

Modelo: votante
50 seeds por punto

Variables

Un punto por η
 ρ : bajas (izq.), exigidas (der.)

Vicsek vs votante: S vs η



Fijos

- $\rho = 4$ ($N = 400$)
- 50 seeds por punto


Variables

Modelo $\in \{\text{Vicsek}, \text{votante}\}$
 η : 15 valores entre 0 y 6,28 rad

Referencia

Eje vertical acotado a los datos.

Vicsek vs votante: v_a vs S



Fijos

50 seeds por punto


Variables

Modelo: Vicsek y votante

Un punto por η

ρ : bajas (izq.), exigidas (der.)

Tiempos del CIM



Fijos

- $L = 10\text{m}$, $M = 10$
- $r_c = 1\text{m}$, PBC
- Partículas puntuales

Variables

$N \in \{200, 400, 800\}$

Ejecución $\in \{\text{TP1, Vicsek, votante}\}$

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con $\rho = 4$ y $\eta = 2\text{rad}$, $\langle v_a \rangle \approx 0.8$ contra ≈ 0.1 ; ya con $\eta = 0.5\text{rad}$ el votante cae a 0.29 ± 0.04 mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con $\rho = 2, 4, 8$, S se mantiene ≈ 1 para todo ruido; con $\rho \leq \frac{1}{\pi}$ queda lejos de 1.
- En densidades bajas, a mayor ruido menor es el S estacionario: cae de ≈ 0.95 a ≈ 0.2 recorriendo η .

Muchas gracias