

МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.1.2

---

Моделирование оптических приборов  
и определение их увеличения

---

Студент  
Ришат ИСХАКОВ  
513 группа

Преподаватель  
Александр Александрович  
КАЗИМИРОВ



12 мая 2017 г.

**Цель работы:** изучить модели зрительных труб (астрономической трубы Кеплера и земной трубы Галилея) и микроскопа, определить их увеличения.

**В работе используются:** оптическая скамья, набор линз, экран, осветитель со шкалой, зрительная труба, линейка.

## 1. Теоретическая часть

Оптические приборы, которые моделируются в данной работе: астрономическая труба Кеплера, земная труба Галилея и микроскоп.

Опишем каждую в общих чертах.

### 1.1. Микроскоп

Микроскоп состоит из двух собирающих систем линз — объектива и окуляра, расположенных на расстоянии  $l_{12}$  друг от друга в трубе, называемой тубусом. Предмет помещается на малом расстоянии перед передним фокусом объектива.




Рис. 1: Ход лучей в микроскопе

Объектив  $L_1$  даёт действительное перевёрнутое увеличенное изображение  $A$  предмета  $P$ , которое рассматривается через окуляр  $L_2$ , действующий как лупа. Мнимое изображение  $B$ , даваемое окуляром, располагается на некотором расстоянии  $d$  от окуляра. Наводя микроскоп, как и любой другой оптический прибор, на резкость, наблюдатель автоматически устанавливает такое расстояние  $d$ , которое удобно для аккомодации глаза.

В микроскопе фокусные расстояния  $f_1$  и  $f_2$ , а также оптический интервал  $\Delta$  — положительны. Фокусное расстояние  $f_M$  всей системы, а с ним и увеличение  $N_M$  — отрицательны, так что изображение, получаемое в микроскопе, — перевёрнутое (обратное).

## 1.2. Зрительные трубы

Зрительные трубы, основными элементами которых, как и в случае микроскопа, являются объектив и окуляр, предназначены для наблюдения удалённых предметов. Уменьшенное обратное изображение  $A$  удалённого предмета, даваемое объективом, находится практически в его фокальной плоскости. Мнимое изображение  $B$ , даваемое окуляром, располагается на расстоянии  $d$  от окуляра. В теории зрительных труб для определённости считается, что глаз аккомодирован на бесконечность. При этом мнимое изображение  $B$  должно располагаться в бесконечности, и, следовательно, промежуточное изображение  $A$  должно находиться в фокальной плоскости окуляра, а задний фокус объектива должен быть совмещён с передним фокусом окуляра.

Отношение фокусных расстояний может иметь разный знак. Объективом зрительной трубы всегда является собирающая система, для которой переднее фокусное расстояние  $f_1 > 0$ . Окуляром трубы Кеплера является собирающая система, переднее фокусное расстояние которой  $f_2 > 0$ , так что труба Кеплера даёт перевёрнутое изображение предмета. Окуляром трубы Галилея, напротив, является рассеивающая система, переднее фокусное расстояние которой  $f_2 < 0$ , так что труба Галилея даёт прямое изображение. Поэтому бытовые зрительные трубы, бинокли и т. д. делаются по схеме Галилея.




Рис. 2: Ход лучей в зрительной трубе Кеплера




Рис. 3: Ход лучей в зрительной трубе Галилея




Рис. 4: Ход лучей в телескопе

## 2. Работа и обработка результатов

1. Отцентрируем элементы оптической системы и определим приближенные значения фокусных расстояний линз:

$$f_1 = 7.5 \text{ см}, \quad f_2 = 13 \text{ см}, \quad f_3 = 31 \text{ см}, \quad f_4 = 31 \text{ см}, \quad f_5 = -7.5 \text{ см}$$

2. Определим точные значения фокусных расстояний линз:

$$f_1 = 7.7 \text{ см}, \quad f_2 = 10.4 \text{ см}, \quad f_3 = 17.3 \text{ см}, \quad f_4 = 26.2 \text{ см}$$

Для рассеивающей линзы по формуле  $f = l - a_0$ , измерив  $l$ :

$$l = 22.2 \text{ см}, \quad a_0 = 30 \text{ см} \Rightarrow f_5 = -7.8 \text{ см}$$

3. Изучили телескоп Кеплера.

Определили размер изображения  $h_1$  одного миллиметра шкалы осветителя в делениях окулярной шкалы зрительной трубы без телескопа.  $h_1 = k \tan \alpha_1 \approx k \alpha_1$ , где  $k$  – некоторый коэффициент, характеризующий увеличение зрительной трубы,  $\alpha_1$  – угловой размер изображения миллиметрового деления шкалы осветителя, наблюдаемого через коллиматор.

$$h_1 =$$

Рассчитали увеличение исследуемой модели телескопа по формуле  $N_T = -\frac{f_1}{f_2} =$

Определили размер изображения  $h_2$  одного миллиметра шкалы осветителя в делениях окулярной шкалы зрительной трубы при наблюдении через телескоп.  $h_2 = k \tan \alpha_2 \approx k \alpha_2$ , где  $\alpha_2$  – угловой размер изображения миллиметрового деления шкалы осветителя, наблюдаемого через коллиматор.

$$h_2 =$$

$$\begin{aligned} &\text{Рассчитали увеличение исследуемой модели телескопа по формуле } N_T = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \\ &= -\frac{h_1}{h_2} = \end{aligned}$$

Рассчитали увеличение исследуемой модели телескопа по формуле  $N_T = -\frac{D_1}{D_2} =$

4. Изучили модель трубы Галилея.

Аналогично:

$$h_1 =$$

$$h_2 =$$

$$N_T = -\frac{f_1}{f_2} =$$

$$N_T = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = -\frac{h_1}{h_2} =$$

$$N_T = \frac{D_1}{D_2} =$$

5. Создали модель микроскопа с увеличением  $N_M = 5$ .

Рассчитали необходимый оптический интервал  $\Delta$  и длину тубуса  $l_{12}$  по формулам:

$$N_M = N_1 N_2 =$$

$$N_1 = -\frac{\Delta}{f_1} =$$

$$N_2 = \frac{L}{f_2} =$$

$$\Delta = l_{12} - f_1 - f_2 =$$

$$l_{12} =$$

Считаем  $L = 25$  см.

Измерили величину изображения  $h_2$  миллиметрового деления предметной шкалы в делениях окулярной шкалы зрительной трубы и рассчитали увеличение по формуле

$$N_M = -\frac{h_2 L}{h_1 f} =$$

### 3. Вывод