

Ejercicio 14

Teorema del invariante

- $P_c \longrightarrow I$
- $(I \wedge \neg B) \longrightarrow Q_c$
- $\{I \wedge B\}$ ciclo $\{I\}$
- $\{I \wedge B \wedge (v_0 = f_v)\}$ ciclo $\{f_v < v_0\}$
- $(I \wedge f_v \leq 0) \longrightarrow \neg B$

Demostración

Datos

- $P_c \equiv |r| = |a| + |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge i := 0 \wedge (\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]$
- $Q_c \equiv |r| = |R_0| \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |b| \longrightarrow_L r[j + |a|] = b[j])$
- $I \equiv (0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < i \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j])$
- $B \equiv i < |b|$
- $S1 \equiv r[|a| + i] = b[i]$
- $S2 \equiv i := i + 1$
- $ciclo \equiv S1; S2$
- $f_v \equiv |b| - i$

$$P_c \longrightarrow I$$

$$|r| = |a| + |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge i := 0 \wedge (\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j] \longrightarrow (0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < i \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \equiv \text{true}$$

$$(I \wedge \neg B) \longrightarrow Q_c$$

$$(0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |b| \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \wedge i \geq |b| \equiv$$

$$(i = |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |b| \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \longrightarrow (0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < i \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \equiv \text{true}$$

$$\{I \wedge B\} \text{ ciclo } \{I\}$$

- $\{I \wedge B\}$ ciclo $\{I\}$

$$wp(S1; S2; , I) \stackrel{Ax3}{\equiv} wp(S1, wp(S2, I))$$

- $wp(S2, I) \equiv wp(i := i + 1, I)$
 $\{(0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < i + 1 \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j])\}$
- $wp(S1, wp(S2, I)) \equiv wp(r[|a| + i] = b[i], wp(S2, I)) \equiv$
 $\{(0 \leq i < |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) \ 0 \leq j < i + 1 \longrightarrow_L \text{setAt}(r, |a| + j, b[i])[|a| + j] = b[j])\}$

$$(0 \leq i \leq |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < i \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \wedge i < |b| \equiv$$

$$(0 \leq i < |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < i \longrightarrow_L r[|a| + j] = b[j]) \longrightarrow$$

$$(0 \leq i < |b| \wedge |r| = |R_0| \wedge |r| = |a| + |b|) \wedge_L ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < |a| \longrightarrow_L r[j] = a[j]) \wedge ((\forall j : \mathbb{Z}) 0 \leq j < i + 1 \longrightarrow_L$$

$$setAt(r, |a| + j, b[i])(|a| + j) = b[j]) \equiv \text{true}$$

$$\{I \wedge B \wedge (v_0 = f_v)\} \text{ ciclo } \{f_v < v_0\}$$

$$wp(i : i + 1, |b| - i < v_0) \equiv |b| - i - 1 < v_0$$

$$wp(r[i] = a[i], |b| - i - 1 < v_0) \equiv 0 \leq i < |b| \wedge |b| - i - 1 < v_0$$

$$I \wedge B \wedge v_0 = |a| - i \longrightarrow 0 \leq i < |b| \wedge |b| - i - 1 < v_0 \equiv \text{true}$$

$$(I \wedge f_v \leq 0) \longrightarrow \neg B$$

$$I \wedge |b| - i \leq 0 \longrightarrow i < |b| \equiv \text{true}$$