## Análisis I - Análisis Matemático I - Matemática I - Análisis II (C)

1er. cuatrimestre 2020

Primer Parcial - 08/06/2020

Justifique todas sus respuestas.

Entreque todas las hojas escaneadas y en orden.

1. Sea  $\mathcal{C}$  la curva que se obtiene como intersección de las superficies

$$y^2 + z^2 = 4$$
,  $-x + y + z = 0$ .

- (a) Hallar una función  $r: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$  cuya imagen describa la curva  $\mathcal{C}$ .
- (b) Verificar que el punto P = (2, 2, 0) pertenece a la curva  $\mathcal{C}$  y hallar la ecuación de la recta tangente a  $\mathcal{C}$  en el punto P.
- 2. Analizar la existencia de los siguientes límites

(a) 
$$\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{(x-1)^2y}{(x-1)^3+y^3}$$
,

(b) 
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x \operatorname{sen}(y^2)}{x^2 + y^2}$$
.

- 3. Sea  $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$  definida por  $f(x,y) = \sqrt[3]{x^3 + 8y^3}$ .
  - (a) Estudiar la existencia de las derivadas parciales de f en (0,0).
  - (b) Analizar la diferenciabilidad de f en (0,0).
- 4. Sea  $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$  diferenciable tal que su plano tangente en el punto (1,4,f(1,4)) es

$$z = 3x - y + 7.$$

Sean  $x=g(s,t)=\cos(s)t^2$  e  $y=h(s,t)=(s+2t)^2$  y sea  $F\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$  definida por F(s,t)=f(g(s,t),h(s,t)).

- (a) Calcular  $\frac{\partial F}{\partial s}(0,-1)$  y  $\frac{\partial F}{\partial t}(0,-1)$ .
- (b) Calcular la ecuación del plano tangente al gráfico de F en (0, -1, F(0, -1)).