


1.    ■  $\star : r = -2 \sin(\theta)$
- $x = \cos(\theta) * r \xRightarrow{\star} x = \cos(\theta) \cdot (-2 \sin(\theta))$
- $x = \sin(\theta) * r \xRightarrow{\star} y = -2 \sin^2(\theta)$
- $$\begin{cases} x(t) = -2 \cdot \cos(t) \sin(t) \\ y(t) = -2 \sin^2(\theta) \\ 0 \leq t < \pi \end{cases}$$

$t$	$x$	$y$
$\frac{\pi}{4}$	-1	-1
$\frac{\pi}{2}$	0	-2
$\pi$	0	0
$\frac{3\pi}{4}$	1	-1



2.    ■  $\star : r = 1 - \cos(\theta)$
- $x = r \cdot \cos(\theta) \xRightarrow{\star} x = \cos(\theta) - \cos^2(\theta)$
- $y = r \cdot \sin(\theta) \xRightarrow{\star} y = \sin(\theta) - \sin(\theta) \cdot \cos(\theta)$

$$r = \sqrt{x^2 + t^2} \xRightarrow{\star}$$

$$\sqrt{x^2 + t^2} = 1 - \cos(\theta) \quad \begin{matrix} \cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \equiv \end{matrix}$$

$$\sqrt{x^2 + t^2} = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \equiv$$

$$x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} - x$$

$$\begin{cases} x(\theta) = \cos(\theta) - \cos^2(\theta) \\ y(\theta) = \sin(\theta) - \sin(\theta) \cdot \cos(\theta) \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

$t$	$x$	$y$
0	0	0
$\pi$	-2	0

