#### **Motivation**

- Erwartungswert für stetige ZV bestimmen
- Approximation von Folge diskreter ZV  $X_{(n)}$

• 
$$X_{(n)} = \frac{\lfloor n*X \rfloor}{n}$$

$$X_{(kn)}(\omega) = \frac{k}{n}$$
 falls  $\frac{k}{n} \leq X(\omega) < \frac{k+1}{n}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

#### **Definition**

Sei X eine ZV. Wir sagen, dass X einen Erwartungswert hat, falls  $X_{(p)} \in L^1$ . Wir schreiben  $X \in L^1$  und definieren

$$E(X) = \lim_{n \to \infty} E(X_{(n)}).$$

Sei X eine ZV mit Dichte  $f^X(x)$ .

(a)  $X \in L^1$  dann und nur dann, wenn  $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f^X(x) dx < \infty$ .

(b) In diesem Fall ist 
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f^X(x) dx$$
.

(c) Wenn  $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  und  $g(X) \in L^1$ , dann ist

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f^{X}(x) dx.$$

$$X_{(n)} = \frac{k}{n}$$
  $\iff$   $X \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ 

$$E(X_{(n)}) = \sum_{k} \frac{k}{n} P(X_{(n)} = \frac{k}{n})$$

$$P(X \in [\frac{k}{n}, \frac{k \cdot d}{n})) = \frac{k \cdot d}{n}$$

$$= \sum_{k} \frac{k}{n} \int_{\frac{k}{n}} f(x) dx \approx \sum_{k} \int_{\frac{k}{n}} x \int_{\frac{k}{$$

## Beispiele

• Bus

Eine Buslinie fährt in 15 minütigen Intervallen. Wir gehen zufällig zur Bushaltestelle. Sei X die Wartezeit bis der Buskommt. Bestimme EX und  $EX^2$ .

Bus beigned morell 15 min

X... Workerst 
$$X \sim \text{Unif } [9,15]$$

$$f(t) = \frac{1}{15} \quad t \in [0,15]$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t f(1) dt = \int_{0}^{15} t \cdot \frac{1}{15} dt$$

$$= \frac{1}{15} \quad \frac{t^{2}}{2} \int_{0}^{15} = \frac{1}{15} \frac{15^{2}}{2} = \frac{15}{2}.$$

• Glühbirne

Die Lebensdauer einer Glühbirne X sei verteilt gemäß  $X \sim \operatorname{Exp}(\lambda)$ . Zeige, dass

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$
 und  $E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$ .

### Seilriss

Ein 10 Meter langes Seil reißt an einer zufälligen Stelle. Das längere Stück verwenden wir weiter, das kürzere werfen wir weg. Wie lange ist das längere der ve bleibenden Seilenden im Mittel?

Seil beignik Seil 10 m Länge uch rajst refolig.   
X. Länge des längeren Shiches
$$E(X) = ?$$

$$P(X) = 10. U \qquad \text{nobsei} \quad U \sim U[2,1]$$

$$X = \max(P_110-P) = 10. \max(U_1,1-u)$$

$$E(X) = \int_0^\infty 10. \max(t_1,1-t_1) \cdot t_1^U(t_1) dt$$

$$= \int_0^\infty 10. \max(t_1,1-t_1) \cdot t_1^U(t_1) dt$$

$$10 \left(\int_0^1 1-t_1 dt + \int_0^1 t_1 d$$

# Normalverteilung

## Beispiel

Sei  $X \sim N(0,1)$ . Dann kann man zeigen, dass

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \right] dx = 0.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \right] dx = 1.$$

# Beispiel

Sei 
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
. Dann gilt

$$E(X) = \mu$$
 und  $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$ .

$$E(X) \quad \text{und} \quad E(X^{2}) \quad ?$$

$$X \sim W(\mu, \sigma^{2}) \quad \Rightarrow \quad \frac{X - \mu}{6} \sim N(0, 1)$$

$$Z := \frac{X - \mu}{6} \quad \Rightarrow \quad X = GZ + \mu \quad \text{mil} \ 2 \sim N(0, 1)$$

$$E(X) = E(GZ + \mu) = E(GZ) + E(\mu)$$

$$= GE(Z) + \mu = \mu$$

$$E(X^{2}) = E(GZ + \mu)^{2} = E(GZ^{2} + \mu^{2} + 2GZ + \mu)$$

$$= E(G^{2}Z^{2}) + E(\mu^{2}) + E(ZG\mu Z)$$

$$= G^{2}E(Z^{2}) + \mu^{2} + 2G\mu E(Z) = G^{2} + \mu^{2}$$

$$= G^{2}E(Z^{2}) + \mu^{2} + 2G\mu E(Z) = G^{2} + \mu^{2}$$