

Primitivt Algebra Brevkursus

Malte Kildelund Rosenkilde

22/02/23

Disclaimer

Jeg kommer nok til at lave en masse fejl så tag ikke alt som værende helt korrekt. Så stil endeligt spørgsmål hvis der er noget der ser forkert ud eller ikke giver mening. Stave fejl er nok også noget der kommer til at være meget af. Alt jeg ved er fra bogen Abstract Algebra, 3rd Edition af David S. Dummit og Richard M. Foote så læs i den hvis der er brug for bedre kilder.

Grupper 21/2

Det helt basele i abstract algebra er grupper hvilket er en struktur der ses overalt i matematikken.

Teori

Definition 1. Lad G være en mængde, da er en function $*$: $G \times G \rightarrow G$ en binær operation.

Som notation skrives $a * b$ istedet for $*(a, b)$.

En binær operation $*$ kaldes asociativ hvis $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$.

En binær operation $*$ kaldes kommutativ hvis $\forall a, b \in G : a * b = b * a$.

Definition 2. En tupel $(G, *)$ med en mængde G og en binær operation $*$ kaldes en gruppe hvis:

(1) $*$ er asociativ.

(2) Der eksistere et element $e \in G$ så $\forall a \in G : a * e = e * a = a$ kaldet det neutrale element.

(3) For alle elementer $a \in G$ eksistere $a^{-1} \in G$ så $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ kaldet det inverse element til a .

En gruppe kaldes abelsk hvis $*$ er kommutativ.

Ofte kalder betegner man G for gruppen istedet for $(G, *)$ og da er operationen implicit.

Som notation bruges der ofte \cdot som operation istedet for $*$ og $a \cdot b$ bliver ofte skrevet ab istedet. Det neutrale element bliver så betegnet 1. Dog er det normalt at bruge $+$ for operationen i abelske grupper og at bruge $-a$ istedet for a^{-1} . Dog er $-$ ikke en operation her men der skrives stadig $a - b$ istedet for $a + -b$.

Sætninger

Sætning 1. Neutrale elementer er unikke. Altså givet en gruppe $(G, *)$ og to elementer $e_1, e_2 \in G$ hvor $\forall a \in G : e_1 * a = a * e_1 = a$ og $e_2 * a = a * e_2 = a$ da er $e_1 = e_2$.

Proof.

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2$$

□

Vis selv

Sætning 2. Invers elementer er unikke. Altså givet en gruppe $(G, *)$ og tre element $a, a_1^{-1}, a_2^{-1} \in G$ hvor $a * a_1^{-1} = a_1^{-1} * a = e$ og $a * a_2^{-1} = a_2^{-1} * a = e$ da er $a_1^{-1} = a_2^{-1}$.

Sætning 3. Givet en gruppe $(G, *)$ og et element $a \in G$ da er $(a^{-1})^{-1} = a$.

Sætning 4. Givet en gruppe $(G, *)$ og to elementer $a, b \in G$ da er $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Homomorphier 22/2

En vigtig del af abstract algebra er at se på relationer mellem forskellige strukturer hvilket gøres ved hjælp af homomorphier og isomorphier.

Definitioner

Definition 3. Lad $(G, *)$ og (G, \diamond) være to grupper og $\varphi : G \rightarrow H$ være en function. Da kaldes φ en gruppe homomorphi hvis

$$\forall a, b \in G : \varphi(a * b) = \varphi(a) \diamond \varphi(b)$$

En bijektiv homomorphi kaldes en isomorphi.

To grupper G og H kaldes isomorfe hvis der eksisterer en isomorphi mellem dem. Dette skrives $G \cong H$.

En isomorphi $\varphi : G \rightarrow G$ mellem en gruppe G og den selv kaldes for en automorphi på G .

Definition 4. Lad G og H være to grupper med identiteter e_G og e_H og $\varphi : G \rightarrow H$ være en homomorphi. Da betegner kernen af φ mængde af elementer som bliver afbilledet til e_H .

$$\ker(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\}$$

Sætninger

Sætning 5. For to grupper $(G, *)$ og (H, \diamond) med neutrale elementer e_G og e_H og en homomorphi $\varphi : G \rightarrow H$ da er $\varphi(e_1) = e_2$.

Proof.

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G) \diamond e_H = \varphi(e_G) \diamond \varphi(e_G) \diamond \varphi(e_G)^{-1} = \varphi(e_G * e_G) \diamond \varphi(e_G)^{-1} = \varphi(e_G) \diamond \varphi(e_G)^{-1} = e_H$$

□

Vis selv

Sætning 6. For to grupper G og H , en homomorphi $\varphi : G \rightarrow H$ og et element $a \in G$ da er $\varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1})$.

Sætning 7. For to grupper G og H eksisterer der altid en homomorphi mellem dem.

At to grupper er isomorfe betyder at deres struktur er meget ens og isomorphier fungerer næsten som en ekvivalens relation hvilket ses i følgende opgave.

Sætning 8. Isomorphier opfylder kravene for en ekvivalens relation:

\cong er refleksiv altså $G \cong G$ for alle grupper G .

\cong er symmetrisk altså $G \cong H \Leftrightarrow H \cong G$ for alle grupper G og H .

\cong er transitiv altså $G \cong H \wedge H \cong K \Rightarrow G \cong K$ for alle grupper G , H og K .

Årsagen til at det ikke er en ekvivalens relations skyldes at mængde lærer ikke kan lide at konstruere en mængde af alle grupper og der dermed ikke er en mængde ekvivalens relationen kan være over.

Sætning 9 (\star) . Lad G og H være to grupper med identiteter e_G og e_H og $\varphi : G \rightarrow H$ være en homomorphi.

Da er φ injektiv hvis og kun hvis $\ker(\varphi) = \{e_G\}$.

Denne sætning er ret relevant så jeg skriver beviset i næste opdatering, det er dog stadig en ret god øvelse at vise.