



École des Ponts
ParisTech

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Recherche Opérationnelle

Projet

Nicolas Bessin

Erwann Esteve

Tidiane Polo

1 Questions

On veut linéariser des contraintes :

1. Contrainte de la forme : $\mu = \alpha\beta$ (1) avec $\alpha \in \{0, 1\}$ et $\beta \in [0, M]$

On a

$$(1) \iff 0 \leq \mu \leq \alpha M \text{ et } \beta - (1 - \alpha)M \leq \mu \leq \beta$$

2. Contrainte de la forme : $\mu = [\beta]^+$ avec $\beta \in [-M, M]$

On introduit une variable binaire α qui vaut 1 si $\beta > 0$ et 0 sinon.

Pour cela, on introduit les contraintes suivantes :

$$1 + \frac{\beta}{M} \geq \alpha \geq \frac{\beta}{M}$$

La contrainte initiale s'écrit alors :

$$\mu = \alpha\beta$$

et on peut la linéariser comme dans la question précédente.

Cas limite : $\beta = 0$, on a alors $1 \geq \alpha \geq 0$.

Ce n'est pas un problème puisque $\mu = \alpha\beta = 0$ quel que soit la valeur prise par α

3. Contrainte de la forme : $\gamma = \min(\alpha, \beta)$ avec $\alpha, \beta \in [-M, M]$

On introduit une variable binaire δ qui vaut 1 si $\beta < \alpha$ et 0 sinon.

Pour cela, on introduit les contraintes suivantes :

$$\frac{\alpha - \beta}{2M} \leq \delta \leq 1 + \frac{\alpha - \beta}{2M}$$

La contrainte initiale s'écrit alors :

$$\gamma = \delta\beta + (1 - \delta)\alpha$$

et on peut la linéariser comme dans la question 1.

4. On a le problème suivant :

$$\begin{aligned} \min_{\alpha, \beta, \gamma} & \max(\alpha, \beta) + \gamma \\ \text{s.c.} & A(\alpha, \beta, \gamma)^T \leq b \end{aligned} \tag{1}$$

On introduit la variable continue δ et les contraintes suivantes :

$$\delta \geq \alpha$$

$$\delta \geq \beta$$

Le problème initial s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \min_{\alpha, \beta, \gamma, \delta} & \delta + \gamma \\ \text{s.c.} & A(\alpha, \beta, \gamma)^T \leq b \\ & \alpha \leq \delta \\ & \beta \leq \delta \end{aligned} \tag{2}$$