

## **La desafortunada experiencia de enfermarse fuera de Lima**

Desde una experiencia personal, desafortunadamente, hace un tiempo un familiar se enfermó en una región fuera de Lima. Lo indignante fue que tuvo que trasladarse a la capital en una ambulancia, recorriendo muchos kilómetros para poder ser atendido de emergencia y seguir un tratamiento.

En ese contexto, más allá de reflexionar sobre la calidad de los servicios básicos que se ofrecen en el Perú, también me dediqué a indagar sobre el alcance de los mismos.

Es así como nace este trabajo descriptivo, en el cual utilicé la base del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRES) de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD y la ubicación geográfica de los centros poblados (CCPP) de todo el Perú.

Con relación a los mapas de calor, lo que se puede observar en el Gráfico 1 son las distancias promedio (en km) de los CCPP a los establecimientos de salud (EESS) más cercanos de nivel II y III de diferentes categorías a nivel provincial y departamental.

Sin embargo, el hecho de promediar las distancias de los CCPP a los EESS que estén ubicados en el mismo departamento limita el estudio, haciendo que regiones que no cuentan con EESS de nivel III registren distancias promedio menores a las que deberían.

En respuesta a ello, el Gráfico 2 intenta corregir la subestimación de los promedios considerando un alcance interregional de los CCPP a los EESS. Así, en el primer recuadro se promedian, a nivel regional, las distancias de los CCPP al EESS de nivel III más cercano, sin importar que el EESS esté fuera de la región a la que pertenece el CCPP.

Por otro lado, a diferencia del primer recuadro del Gráfico 2, en el segundo se promedian no solo las distancias al EESS más cercano, sino también las distancias a los EESS más cercanos de diferentes categorías del nivel III, obteniendo como resultado mayores promedios por región.



De este modo, una de las conclusiones que se pueden extraer es que las zonas nororiental y sur del Perú son gravemente afectadas debido a la lejanía de los EESS para atender a los CCPP. Asimismo, no solo se distinguen diferencias entre regiones, sino también entre provincias de una misma región, siendo notable el caso de Lima.

Finalmente, además de reconocer la alarmante situación que se vive en cuanto al alcance y calidad de los servicios de salud, es necesario identificar las medidas adoptadas por los gobiernos de turno no solo en materia de salud, sino también en relación con otros servicios básicos, donde las comunidades se ven afectadas y, muchas veces, polarizadas, propiciando escenarios de convulsión social como los que vivimos en la actualidad.

# Gráfico 1. Distancias promedio\* (km): CCPP - EESS

Nivel provincial

Nivel departamental





\*Se promedian las distancia de los CCPP a los EESS más cercanos entre los niveles II-1 y III-2.  
 \*Existen departamentos que no cuentan con EESS nivel III, lo que limita el estudio.

\*Se promedian las distancia de los CCPP a los EESS más cercanos entre los niveles II-1 y III-2.  
 \*Existen departamentos que no cuentan con EESS nivel III, lo que limita el estudio.

# Gráfico 2. Distancias promedio\* (km): CCPP - EESS

Nivel departamental



\*Se promedian las distancias de los CCPP al EESS nivel 3 más cercano

\*Se promedian las distancias de los CCPP a los EESS nivel 3 más cercanos por categorías.