BFT LARVAE: larva entera secada

Larva entera seca para aves: aceptación natural y funcionalidad digestiva

Ingrediente completo de mosca soldado negra, apto para su incorporación en el pienso o como aporte sobre el alimento en programas formulados para broilers y ponedoras.[23,24]

Su matriz natural combina proteína, grasa rica en ácido láurico, quitina y péptidos bioactivos,con interés como soporte intestinal y modulación fisiológica de la microbiota.[25-27]

En broilers: eficiencia alimentaria con una matriz funcional completa

Alta aceptación natural

La larva seca entera es consumida voluntariamente y puede utilizarse como aporte funcional sobre la ración.[28]



Mejor eficiencia alimentaria

En dietas balanceadas, la larva completa puede mejorar el índice de conversión, con una reducción de la ganancia media diaria en broilers alimentados con inclusión progresiva hasta el 20 %.[25]

Soporte intestinal

A bajas inclusiones, la larva seca se asocia a una mayor altura de vellosidades ileales, indicador de una mejor funcionalidad digestiva.[29]

Modulación inmunitaria y calidad de la carne

Se han descrito cambios favorables en células inmunitarias, aumento de IgA e IgY y menor oxidación lipídica de la pechuga.[27]

En ponedoras: producción estable y huevo de mayor valor

Productividad sostenida


La inclusión de larva seca al 3-9 % mantiene el porcentaje de puesta y el índice de conversión así como el peso y masa del huevo.[26]

Yema más intensa

A inclusiones del 6-9 %, puede aumentar de forma natural la coloración de la yema y su contenido en carotenoides, sin necesidad de elevar el nivel de maíz de la dieta.[26]

Calidad del huevo en dietas con menos soja

El 5 % de larva seca ayuda a sostener la productividad y puede mejorar las unidades Haugh frente a la misma dieta sin larva en fases iniciales.[24]



La inclusión de larva entera seca aumentó de forma dosis-dependiente la intensidad de color de la yema, sin modificar el nivel de maíz de la dieta.

Referencias:

1. Saidani *et al.*, 2025; 2. Chen *et al.*, 2025; 3. Zampiga *et al.*, 2025; 4. Lee *et al.*, 2025; 5. Schiavone *et al.*, 2017; 6. Dalmoro *et al.*, 2025; 7. Biasato *et al.*, 2020; 8. Ahmed *et al.*, 2026; 9. Baderuddin *et al.*, 2024; 10. Schiavone *et al.*, 2019; 11. Jankowski *et al.*, 2021; 12. Fikri *et al.*, 2024; 13. Yan *et al.*, 2023; 14. Chen *et al.*, 2025; 15. Patterson *et al.*, 2021; 16. Chen *et al.*, 2022; 17. Silván *et al.*, 2025; 18. Kim *et al.*, 2020; 19. Aslam *et al.*, 2025; 20. Kieronczyk *et al.*, 2022; 21. Kim *et al.*, 2022; 22. Khan *et al.*, 2024; 23. Dillard *et al.*, 2025; 24. Montalbán *et al.*, 2024; 25. Adams *et al.*, 2026; 26. Mincheva *et al.*, 2026; 27. de Souza Vilela *et al.*, 2021; 28. Saidani *et al.*, 2025; 29. Sjofjan *et al.*, 2025;

Acceda a las referencias bibliográficas completas con este QR

BioflyTech

La nutrición funcional con base científica

BioFlyTech desarrolla ingredientes de insecto autorizados en la Unión Europea. Más que sustituir materias primas tradicionales, aportan valor funcional allí donde la nutrición marca la diferencia.

BioFlyTech le ayuda a construir programas más sólidos y precisos. Solicite las fichas técnicas.

+34 965 10 66 48 | +34 606 74 86 65 | letstalk@bioflytech.com



BioflyTech

Ingredientes funcionales de insecto para avicultura

Larva de mosca soldado negra, *Hermetia illucens*

Favorecen el desarrollo temprano y apoyan la conversión alimentaria, la función intestinal y la calidad del huevo

Harina, grasa y larva seca de *Hermetia illucens* para fórmulas avícolas de alta exigencia. Una fuente de proteína digestible, energía funcional y compuestos bioactivos –ácido láurico, quitina y péptidos antimicrobianos– orientada a reforzar el rendimiento desde las primeras edades, el equilibrio intestinal y el valor productivo en pollos de engorde, pavos y ponedoras.

1. Mejora el arranque de los pollitos
2. Apoyo en los índices de conversión y eficiencia productiva
3. Favorece la función intestinal.
4. Contribuye a la calidad interna y física del huevo
5. Ayuda al mantenimiento de la producción con menor consumo en formulaciones ajustadas
6. Aporta proteína digestible y energía funcional

BFT es el *partner* ideal para las fases en las que la formulación tiene más impacto. Nuestro diferencial está en combinar producción europea, trazabilidad, utilización de sustratos vegetales, flexibilidad industrial y una propuesta avanzada de ingredientes funcionales.

PROTE-IN 50: harina proteica de *H. illucens*

(≈ 50% proteína, moderado contenido en grasa)

Proteína funcional de alta aceptación y digestibilidad. Apoya la salud intestinal y sostiene el rendimiento productivo.[1-3]

Su perfil de aminoácidos (lisina, leucina, valina e histidina) cubre las exigencias para un crecimiento rápido. Su fracción grasa aporta energía a la fórmula, especialmente interesante en las primeras fases, cuando la eficiencia de utilización de nutrientes es crítica.

En broilers y recría: arranque robusto y crecimiento más uniforme[4]

Palatabilidad y toma temprana

Las características organolépticas de **PROTE-IN 50** favorecen una ingesta regular. Su inclusión moderada en **fórmulas de inicio** reduce las diferencias tempranas entre animales y prepara el desarrollo productivo posterior.[5]

Salud intestinal y equilibrio microbiano


La combinación de ácido láurico, quitina y péptidos antimicrobianos se asocia con la modulación de la microbiota y el soporte de la barrera intestinal.[1,6]

En broilers, la harina de larva ha mostrado señales favorables sobre la población bacteriana, mucinas intestinales y ácidos grasos de cadena corta.[6,7] Estos resultados apoyan su potencial para favorecer una absorción más eficiente y la reducción de la incidencia de trastornos digestivos en fases sensibles.[6,8]

Más crecimiento con impacto positivo en la canal

Con inclusiones moderadas favorece la ganancia media diaria y el índice de conversión, con efectos positivos sobre el peso y rendimiento de la canal sin afectar a su calidad.[9,10]

Mejor índice de conversión (IC) en el arranque[6]



□ Dieta basal ■ 5% harina de larva



Pavos: soporte intestinal para un crecimiento eficiente

La evidencia en pavas comerciales muestra mejora en la ganancia diaria y el índice de conversión sin penalizar la calidad de la pechuga. En pavitos, los estudios de arranque con harina *full-fat* apuntan a una mejor utilización del pienso y señales favorables sobre fermentación cecal e inmunidad intestinal.[3,11]


En ponedoras: más calidad del huevo y mayor persistencia productiva

Más huevos con menos pienso

PROTE-IN 50 ayuda a mejorar la eficiencia productiva en ponedoras, con una respuesta positiva en tasa de puesta y aprovechamiento del pienso.[12,13]

Los datos de campo disponibles muestran, con una inclusión del 2 %:

Datos de campo






Funcionalidad intestinal y equilibrio fisiológico

La fracción funcional de **PROTE-IN 50** puede modular favorablemente la microbiota cecal y reducir el estrés fisiológico.[12,13]

Mejor calidad interna y cáscara más resistente

Los datos de campo muestran huevos con índice Haugh superior a 92 y cáscara más dura.

Las evidencias respaldan esta línea de trabajo.[12,14,15]



FAT 40 PLUS: grasa refinada de *H. illucens*

(rica en ácido láurico >40-50%)

Fuente lipídica concentrada y funcional, rica en ácido láurico –C12:0– y ácidos grasos de cadena media.

Constituye una alternativa a aceites vegetales, aceite de coco y grasas animales. Aporta energía de rápida utilización y contribuye al equilibrio intestinal, la respuesta antioxidante y la eficiencia alimentaria.[16]

La fracción grasa rica en ácido láurico ha mostrado actividad específica frente a *Campylobacter* en estudios de laboratorio, lo que refuerza su interés como ingrediente funcional en estrategias de salud intestinal y seguridad alimentaria.[17]

En broilers: energía funcional con soporte antimicrobiano desde el arranque


Fuente lipídica de alta digestibilidad

La grasa de larva aporta ácidos grasos de cadena media de rápida absorción y alto aprovechamiento energético, adecuados para apoyar las necesidades del pollito.[18]

Soporte antimicrobiano natural y modulación de la microbiota

En pollos de engorde, el aceite de larva se ha asociado con cambios favorables en microbiota, función intestinal y respuesta antioxidante.[18]

Más energía disponible en el arranque[19]



En pollitos, la grasa de larva de *H. illucens* aporta una fuente energética de rápida utilización gracias a su perfil rico en ácidos grasos de cadena media. En este ensayo la energía metabolizable a día 14 fue similar a la del aceite de soja y superior a la de grasas animales como la manteca de cerdo y el sebo bovino, reforzando su interés en primeras edades.



Energía funcional para el arranque de pavitos

Fuente lipídica alternativa al aceite de soja que mantiene el rendimiento y la digestibilidad. Las evidencias apuntan a que favorece la utilización de la grasa y la modulación intestinal.[20]

En ponedoras: fuente energética funcional para mejorar la eficiencia productiva y el equilibrio intestinal

Energía eficiente para mantener el ritmo de puesta

En formulaciones específicas, se ha asociado con un mayor índice de conversión, mayor peso del huevo y aumento de masa del huevo.[21]

Modulación de la microbiota y refuerzo de la barrera intestinal

Se describen cambios en la microbiota intestinal y en rutas funcionales microbianas que favorecen el control del estrés oxidativo.[22]

