

| | MAE | MSE | RMSE | RRMSE | ED | R2 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NOZS _{BR} | | | | | | |
| NOZS _{RC} | | | | | | |
| NOZS _{STA} | | | | | | |
| NOZS _{DBR} | | | | | | |
| MTZS _{SRE,BR} | | 9.2(5) | | | | 9.5(5) |
| MTZS _{SRE,RC} | | | | | | |
| MTZS _{SRE,STA} | | | | | | |
| MTZS _{SRE,DBR} | | | | | | |
| MTZS _{SRM,BR} | | 3.0(2) | 3.5(3) | 3.8(3) | 3.4(3) | 3.4(2) |
| MTZS _{SRM,RC} | | | | | | |
| MTZS _{SRM,STA} | 8.4(5) | 6.1(4) | 7.4(4) | 8.6(5) | 7.4(5) | 8.4(3) |
| MTZS _{SRM,DBR} | | | | | | |
| ZSMT _{SRE,BR} | 3.3(3) | 9.2(5) | | | | 9.5(5) |
| ZSMT _{SRE,RC} | | 9.2(5) | | | | 9.5(5) |
| ZSMT _{SRE,STA} | | | | | | 9.5(5) |
| ZSMT _{SRE,DBR} | 8.3(4) | | 7.9(5) | 8.2(4) | | 8.8(4) |
| ZSMT _{SRM,BR} | 3.3(3) | 3.0(2) | 3.5(3) | 3.8(3) | 3.4(3) | 3.4(2) |
| ZSMT _{SRM,RC} | 2.7(2) | 2.9(1) | 2.4(2) | 3.1(2) | 2.4(2) | 3.4(2) |
| ZSMT _{SRM,STA} | 3.3(3) | 3.0(2) | 3.5(3) | 3.8(3) | 3.7(4) | 3.4(2) |
| ZSMT _{SRM,DBR} | 2.4(1) | 3.1(3) | 2.1(1) | 1.8(1) | 2.1(1) | 2.8(1) |

Table 1: Summary of the the first five pairs of multi-target and SR methods which provides the best performance according to the different quality measures for the pollutant dataset