

Trabajo Práctico Final

Introducción a la Estadística y la Ciencia de Datos, 1er Cuatrimestre 2024

Alan Erdei, Nicolás Ian Rozenberg

2024-07-06

Sección Teórica

Inciso a)

Demostraremos que el predictor derivado del estimador de Nadaraya-Watson de la esperanza condicional

$$\hat{\mathbf{Y}} = (\hat{Y}_1 \quad \hat{Y}_2 \quad \cdots \quad \hat{Y}_n)^T$$

donde

$$\hat{Y}_i = E(Y|X = X_i) = \hat{m}_h(X_i)$$

es una transformación aplicada sobre \mathbf{Y} .

$$\begin{aligned} \hat{Y}_i &= \hat{m}_h(X_i) = \sum_{j=1}^n y_j w_{j,h}(X_i) \\ &= (w_{1,h}(X_i) \quad w_{2,h}(X_i) \quad \cdots \quad w_{n,h}(X_i)) \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \hat{Y}_1 \\ \hat{Y}_2 \\ \vdots \\ \hat{Y}_n \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{Y}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} w_{1,h}(X_1) & w_{2,h}(X_1) & \cdots & w_{n,h}(X_1) \\ w_{1,h}(X_2) & w_{2,h}(X_2) & \cdots & w_{n,h}(X_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{1,h}(X_n) & w_{2,h}(X_n) & \cdots & w_{n,h}(X_n) \end{pmatrix}}_S \underbrace{\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}}_Y$$

Entonces obtuvimos una transformación lineal en \mathbf{Y} , como se quería ver. ■

Sección Práctica