

Analiza danych przestrzennych - Modelowanie i wizualizacja

Marcin Samojluk, Gabriel Rączkowski

December 11, 2024

Plan prezentacji

Wstęp

Mapa topograficzna

Mapa azymutów (Dip Direction)

Grupowanie trójkątów - X_N, Y_N, Z_N

Grupowanie trójkątów - X_D, Y_D, Z_D

Tabele punktów skupień

Kod filtrowania i wizualizacji w R

Przefiltrowane punkty

Mapa geomorfonów

Mapa geomorfonów

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

- ▶ Celem projektu jest analiza danych przestrzennych na wybranym obszarze.
- ▶ Dane pochodzą z narzędzi:
 - ▶ QGIS - analiza danych przestrzennych.
 - ▶ GEBCO - podkład topograficzny.
 - ▶ ParaView - wizualizacja i analiza trójwymiarowa.
- ▶ Analizowane parametry:
 - ▶ Azymuty i kąty nachylenia powierzchni (Dip Direction, Dip Angle).
 - ▶ Grupowanie trójkątów w przestrzeni za pomocą algorytmu k-średnich.

Mapa topograficzna

- ▶ Podkład topograficzny przygotowano za pomocą wtyczki OpenLayersPlugin w QGIS.
- ▶ Obszar danych został zaznaczony w GEBCO, a następnie naniesiony na mapę.




Figure: Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem.

Grupowanie trójkątów - X_N , Y_N , Z_N

- ▶ Grupowanie przeprowadzono za pomocą algorytmu k-średnich.
- ▶ Analiza dla kolumn X_N , Y_N , Z_N .
- ▶ Wyniki wizualizowane w stereonet z zaznaczonymi środkami skupień.




Figure: Stereonet z zaznaczonymi środkami skupień dla X_N , Y_N , Z_N .

Grupowanie trójkątów - X_D , Y_D , Z_D

- ▶ Grupowanie przeprowadzono analogicznie jak dla X_N , Y_N , Z_N .
- ▶ Analiza dla kolumn X_D , Y_D , Z_D .




Figure: Stereonet z zaznaczonymi środkami skupień dla X_D , Y_D , Z_D .

Tabele punktów skupień

- ▶ Tabele przedstawiają wartości punktów skupień wyznaczonych w analizie.
- ▶ Zestawiono wartości przed i po przefiltrowaniu.

No.	Trend	Plunge	Label		No.	Trend	Plunge	Label	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	016,6	02,0			<input checked="" type="checkbox"/> 1	016,6	02,0		
<input checked="" type="checkbox"/> 2	145,0	02,0			<input checked="" type="checkbox"/> 2	145,0	02,0		
<input checked="" type="checkbox"/> 3	254,9	02,0			<input checked="" type="checkbox"/> 3	254,9	02,0		

Figure: Tabela punktów skupień: X_N (lewo) i X_D (prawo).

Kod filtrowania i wizualizacji w R

Filtrowanie danych

```
filter_tab1 <- dplyr::filter(tab1, Dip_ang > 0 &  
Dip_ang < 91,  
X_N > -0.05 & X_N < 0.05, Y_N > -0.05 & Y_N < 0.05)
```

Kod ggplot dla oryginalnych danych

```
ggplot(data=tab1, aes(x = Y_C, y = X_C, color =  
Dip_ang )) + geom_point()
```



Kod ggplot dla przefiltrowanych danych

```
ggplot(data=filter_tab1, aes(x = Y_C, y = X_C, color =  
Dip_ang )) + geom_point()
```

- ▶ Filtrowanie danych pozwala na wybór punktów spełniających określone kryteria.
- ▶ Wizualizacja umożliwia analizę rozkładu danych przed i po przefiltrowaniu.

Przefiltrowane punkty

- ▶ Wykresy przedstawiają dane przed i po przefiltrowaniu.
- ▶ Kolor punktów odpowiada wartości kąta nachylenia (*Dip Angle*).



Mapa geomorfonów - Opis

- ▶ Mapa geomorfonów przedstawia klasyfikację geomorficzną analizowanego obszaru.
- ▶ Wartości geomorfonów zostały przypisane na podstawie analizy zmienności terenu, uwzględniając nachylenie, azymut i krzywiznę powierzchni.
- ▶ Kolorystyka na mapie pokazuje różne typy ukształtowania terenu, w tym wzgórza, doliny oraz płaskie obszary.
- ▶ Analiza geomorfonów jest przydatna w badaniach geomorfologicznych, planowaniu przestrzennym i analizach środowiskowych.

Mapa geomorfonów - Wizualizacja




Figure: Mapa geomorfonów - Klasyfikacja geomorficzna obszaru.

Podsumowanie i wnioski

- ▶ Przeanalizowano dane przestrzenne i dokonano wizualizacji za pomocą stereonetu.
- ▶ Wyniki wskazują na różnice w rozkładzie azymutów dla różnych grup trójkątów.
- ▶ Możliwe rozszerzenia analizy:
 - ▶ Dalsza integracja z modelami 3D w ParaView.
 - ▶ Analiza błędów i ich wpływu na wyniki.
- ▶ Wnioski mogą być przydatne w analizach geologicznych i geomorfologicznych.

- ▶ GEBCO - <https://www.gebco.net/>
- ▶ QGIS - <https://qgis.org/>
- ▶ ParaView - <https://www.paraview.org/>
- ▶ Dokumentacja Stereonet - dostępna w programie.