Analiza danych przestrzennych - Modelowanie i wizualizacja

Marcin Samojluk, Gabriel Rączkowski

December 11, 2024

Plan prezentacji

Wstęp

Mapa topograficzna

Mapa azymutów (Dip Direction)

Grupowanie trójkątów - X_N, Y_N, Z_N

Grupowanie trójkątów - X_D , Y_D , Z_D

Tabele punktów skupień

Kod filtrowania i wizualizacji w R

Przefiltrowane punkty

Mapa geomorfonów

Mapa geomorfonów

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Wstęp

- Celem projektu jest analiza danych przestrzennych na wybranym obszarze.
- Dane pochodzą z narzędzi:
 - QGIS analiza danych przestrzennych.
 - GEBCO podkład topograficzny.
 - ParaView wizualizacja i analiza trójwymiarowa.
- Analizowane parametry:
 - Azymuty i kąty nachylenia powierzchni (Dip Direction, Dip Angle).
 - Grupowanie trójkątów w przestrzeni za pomocą algorytmu k-średnich.

Mapa topograficzna

- Podkład topograficzny przygotowano za pomocą wtyczki OpenLayersPlugin w QGIS.
- Obszar danych został zaznaczony w GEBCO, a następnie naniesiony na mapę.



Figure: Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem.

Mapa azymutów (Dip Direction)

- Przygotowano w QGIS z użyciem danych interpolowanych.
- Analizowano nachylenie, ekspozycję oraz azymuty powierzchni.




Figure: Ekspozycja (Exposure).




Figure: Interpolowane dane powierzchniowe.



Figure: Nachylenie powierzchni (Dip Angle).

Grupowanie trójkątów - X_N, Y_N, Z_N

- Grupowanie przeprowadzono za pomocą algorytmu k-średnich.
- Analiza dla kolumn X_N, Y_N, Z_N.
- Wyniki wizualizowane w stereonete z zaznaczonymi środkami skupień.




Figure: Stereonet z zaznaczonymi środkami skupień dla X_N , Y_N , Z_N .

Grupowanie trójkątów - X_D, Y_D, Z_D

- lacktriangle Grupowanie przeprowadzono analogicznie jak dla $X_N,\ Y_N,\ Z_N.$
- ightharpoonup Analiza dla kolumn X_D , Y_D , Z_D .




Figure: Stereonet z zaznaczonymi środkami skupień dla X_D , Y_D , Z_D .

Tabele punktów skupień

- Tabele przedstawiają wartości punktów skupień wyznaczonych w analizie.
- Zestawiono wartości przed i po przefiltrowaniu.

				No.	Trend	Plunge	Label
No.	Trend	Plunge	Label	1	016,6	02,0	
1	016,6	02,0		2	145,0	02,0	
2	145,0	02,0		☑ 3	254,9	02,0	
3	254,9	02,0					

Figure: Tabela punktów skupień: X_N (lewo) i X_D (prawo).

Kod filtrowania i wizualizacji w R

Filtrowanie danych

```
filter_tab1 <- dplyr::filter(tab1, Dip_ang > 0 & Dip_ang < 91, X_N > -0.05 & X_N < 0.05, Y_N > -0.05 & Y_N < 0.05)
```

Kod ggplot dla oryginalnych danych

```
ggplot(data=tab1, aes(x = Y_C, y = X_C, color =
Dip_ang )) + geom_point()
```

Kod ggplot dla przefiltrowanych danych


```
ggplot(data=filter_tab1, aes(x = Y_C, y = X_C, color =
Dip_ang )) + geom_point()
```

- Filtrowanie danych pozwala na wybór punktów spełniających określone kryteria.
- Wizualizacja umożliwia analizę rozkładu danych przed i po przefiltrowaniu.



Przefiltrowane punkty

- Wykresy przedstawiają dane przed i po przefiltrowaniu.
- Kolor punktów odpowiada wartości kąta nachylenia (Dip Angle).



Mapa geomorfonów - Opis

- ► Mapa geomorfonów przedstawia klasyfikację geomorficzną analizowanego obszaru.
- Wartości geomorfonów zostały przypisane na podstawie analizy zmienności terenu, uwzględniając nachylenie, azymut i krzywiznę powierzchni.
- Kolorystyka na mapie pokazuje różne typy ukształtowania terenu, w tym wzgórza, doliny oraz płaskie obszary.
- Analiza geomorfonów jest przydatna w badaniach geomorfologicznych, planowaniu przestrzennym i analizach środowiskowych.

Mapa geomorfonów - Wizualizacja




Figure: Mapa geomorfonów - Klasyfikacja geomorficzna obszaru.

Podsumowanie i wnioski

- Przeanalizowano dane przestrzenne i dokonano wizualizacji za pomocą stereonetu.
- Wyniki wskazują na różnice w rozkładzie azymutów dla różnych grup trójkątów.
- Możliwe rozszerzenia analizy:
 - Dalsza integracja z modelami 3D w ParaView.
 - Analiza błędów i ich wpływu na wyniki.
- Wnioski mogą być przydatne w analizach geologicznych i geomorfologicznych.

Bibliografia

- ► GEBCO https://www.gebco.net/
- ► QGIS https://qgis.org/
- ParaView https://www.paraview.org/
- Dokumentacja Stereonet dostępna w programie.
- Kable pod wodą https://www.submarinecablemap.com/