

## 函数项级数

### 1. 函数项级数

#### 函数项级数

设 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是定义在 $D$ 上的函数,和式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots$$

被称为定义在 $D$ 上的**函数项级数**.在 $D$ 上取定一点 $x_0$ ,如果数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$$

收敛(发散),则称 $x_0$ 为该函数项级数的**收敛点(发散点)**.因此,函数项级数的敛散性是以数项级数的敛散性为基础的.

函数项级数的收敛点的全体称为它的**收敛域**,发散点的全体称为它的**发散域**.对收敛域 $X$ 内的任意一点 $x$ ,上述级数的和记为 $S(x)$ .显然, $S$ 是定义在 $X$ 上的函数,称为级数的**和函数**.

### 2. 函数序列及函数项级数的一致收敛性

#### 2.1 函数序列的收敛性和极限函数

设有一个函数序列 $f_1(x), f_2(x), \dots$ ,其中的每一项 $f_n(x)$ 在集合 $D$ 上有定义.

若一点 $x_0 \in D$ 使得序列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛,即极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$ 存在,则称序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $x_0$ 处**收敛**, $x_0$ 称为该序列的**收敛点**,该序列的全体收敛点构成的集合称作序列的**收敛域**.

另外,序列 $\{f_n(x)\}$ 在其收敛域 $X$ 内定义了一个函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in X$$

称 $f(x)$ 为该序列的**极限函数**.

显然,函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 的收敛域就是其部分和序列的收敛域,其和函数就是部分和序列的极限函数.

#### 2.2 一致收敛

设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $X$ 上收敛于极限函数 $f(x)$ .若对于任意 $\varepsilon > 0$ ,都存在一个只依赖于 $\varepsilon$ 而不依赖于 $x$ 的正整数 $N$ 使得 $\forall n > N$ 都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对任意 $x \in X$ 成立,则称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上**一致收敛**于 $f(x)$ ,记作 $f_n(x) \Rightarrow f(x), x \in X (n \rightarrow \infty)$ .

一致收敛的几何意义是,对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ,都存在足够大的 $n$ 使得 $f_n(x)$ 落在带状区域

$$f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon$$

中.需要注意的是,上述定义中的 $X$ 不一定是序列的收敛域,可能只是收敛域的一个子集.

### 2.3 一致收敛的判据I

设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $X$ 上收敛于极限函数 $f(x)$ ,若存在序列 $\{a_n\}$ 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n \quad x \in X, n \geq N$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,则 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上一致收敛于 $f(x)$ .

#### Proof.

对于任意 $\varepsilon > 0$ ,由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,则存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得对任意 $n \geq N$ 有

$$|a_n| < \varepsilon$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$ ,考虑满足上述条件的 $N$ ,对任意 $n \geq N$ 和 $x \in X$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n < \varepsilon$$

因而 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ .

### 2.4 不一致收敛的判据I

设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上收敛到极限函数 $f(x)$ .若存在常数 $l > 0$ 及点列 $x_n \in X (n = 1, 2, \dots)$ 使得当 $n \geq N (N \in \mathbb{N}^*)$ 时有

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \geq l$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上不一致收敛.

这一定理还有一极限版本.

设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上收敛到极限函数 $f(x)$ .若存在常数 $l > 0$ 及点列 $x_n \in X (n = 1, 2, \dots)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f_n(x_n) - f(x_n)] = k \neq 0$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $X$ 上不一致收敛.