

三重积分引论

1. 三重积分的定义

仿照二重积分的定义,我们定义三重积分如下.

1.1 定义:三重积分

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭空间 Ω 上有定义.对于 Ω 的任意分割 $\{\Omega_1, \dots, \Omega_n\}$ 及任意选定的 $(x_i, y_i, z_i) \in \Omega_i (i = 1, \dots, n)$, 令 λ 为 Ω_i 的直径的最大值, ΔV_i 为 Ω_i 的体积.当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,若和式

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

总有极限,则称该极限为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的**三重积分**,记作

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \quad \text{或} \quad \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

三重积分的基本性质是和二重积分很相似的,在此就不再赘述.我们主要关注三重积分的计算.

2. 三重积分的计算

三重积分和二重积分一样,可以通过累次积分的方式求得.然而,根据划分方式的不同,可能导致外层积分为二重积分,内层积分为一元函数的定积分,或正好相反.我们分别介绍这两种情况对 D 的要求和计算方法.

2.1 直角坐标系下三重积分的计算I

设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续,且存在有界闭区域 D 使得 Ω 满足如下形式

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

即 Ω 是以 $z_1(x, y)$ 为底,以 z_2 为顶的柱面,其在 (x, y) 上的投影即为 D .

若 $z_1(x, y), z_2(x, y)$ 都是 \mathbb{R}^2 上的连续函数,那么

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

上面的情况即外层积分是二重积分的情况.而当外层积分是一元函数的定积分时,就对应如下计算方法.

2.2 直角坐标系下三重积分的计算II

设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续,且 Ω 介于平面 $z = a$ 与 $z = b$ 之间.对于任意 $z_0 \in [a, b]$, Ω 与平面 $z = z_0$ 所交的区域 D_{z_0} 都是有界闭区域,那么

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right] dz$$

与二重积分类似,三重积分也可以通过坐标变换的方式进行简化计算.常用的有柱坐标变换和球坐标变换.

2.3 柱坐标系下三重积分的计算

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续,那么

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

其中 $\Omega' = \{(r, \theta, z) : (r \cos \theta, r \sin \theta, z) \in \Omega\}$.

柱坐标变换适合以下两种类型的区域.

- (1) Ω 是一个正的柱体,在 Oxy 平面上的投影的极坐标区域为 D ,其底曲面和顶曲面用柱坐标表述为 $z = \phi(r, \theta)$ 和 $z = \psi(r, \theta)$.这时我们有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left[\int_{\phi(r, \theta)}^{\psi(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz \right] r dr d\theta$$

- (2) Ω 介于半平面 $\theta = \alpha$ 和 $\theta = \beta$ 之间(其中 $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$),且极角为 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 的任意半平面与 Ω 交于平面闭区域 $D(\theta)$.

这时我们有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\iint_{D(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr dz \right] d\theta$$