

北京大学数学科学学院2023-24高等数学A2期末考试

1.(15分) 回答下列问题并简述理由.

(1) (5分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛 (b) 一定发散 (c) 敛散性不确定

(2) (5分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛 (b) 一定发散 (c) 敛散性不确定

(3) (5分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛 (b) 一定发散 (c) 敛散性不确定

Solution.

(1) 令 $a_n = \frac{1}{n^2}$ 可知级数收敛, 令 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ 可知级数发散. 于是级数的敛散性不确定.

(2) 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 可知级数收敛, 令 $a_n = (-1)^n$ 可知级数发散. 于是级数的敛散性不确定.

(3) 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}}}$ 可知级数收敛, 令 $a_n = 1$ 可知级数发散. 于是级数的敛散性不确定.

2.(10分) 试求幂级数的收敛半径.

(1) (5分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$$

(2) (5分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n$$

Solution.

(1) 令 $u_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{((n+1)!)^2 (2n)!}{(n!)^2 (2n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4}$$

于是收敛半径 $R = 4$.

(2) 令 $u_n = \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{((-1)^{n+1} + (-2)^{n+1} + 3^{n+1}) n(n+1)(n+2)}{((-1)^n + (-2)^n + 3^n) (n+1)(n+2)(n+3)} \right| = \frac{1}{3}$$

于是收敛半径 $R = 3$.

3.(10分) 求微分方程

$$y'' + y' = x^2 + x$$

的通解.

4.(10分) 判断下列级数的敛散性.

(1) (5分)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

(2) (5分)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

Solution.

(1) 注意到

$$\ln \left((\ln n)^{\ln n} \right) = \ln n \cdot \ln \ln n = \ln (n^{\ln \ln n})$$

当 $n > 27 > e^e$ 时就有

$$\sum_{n=27}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \sum_{n=27}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln n}} < \sum_{n=27}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

收敛, 于是原级数收敛.

(2) 我们有

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n \sqrt{n} - 1}{n - 1}$$

于是

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} (-1)^n + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$$

注意到 $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 对 n 单调递减且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}} = 0$$

于是根据 Leibniz 判别法可知第一部分收敛. 又因为级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散, 从而原级数发散.

5.(15分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

Proof.

注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n \right| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n)^n}$$

右边是一个幂级数. 令 $u_n = \frac{1}{(\ln n)^n}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$$

于是收敛半径 $R = +\infty$, 即该幂级数对 $x \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛. 进而原函数在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛, 于是在其上连续.

6.(10分) 计算含参变量 t 的无穷积分

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(tx) dx \quad (-\infty < t < +\infty)$$

已知 $I(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Solution.

令 $f(x, t) = e^{-x^2} \cos(tx)$. 首先有

$$\int_0^{+\infty} |f(x)| dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

于是 $I(t)$ 对 $t \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛.

同样地有

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| dx = \int_0^{+\infty} |x e^{-x^2} \sin(tx)| dx \leq \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 1$$

同样对 $t \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛. 因此 $I(t)$ 可以求导, 并且有

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx = - \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin(tx) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin(tx) d(e^{-x^2}) = \frac{1}{2} \left[\left(\sin(tx) e^{-x^2} \right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t e^{-x^2} \cos(tx) dx \right] \\ &= \frac{t}{2} I(t) \end{aligned}$$

于是即有这一微分方程的通解为

$$I(t) = Ce^{-\frac{x^2}{4}}$$

由于 $I(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 于是

$$I(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} Ce^{-\frac{x^2}{4}}$$

7.(12分) 回答下列问题.

(1) (2分) 写出 Γ 函数的表达式.

(2) (5分) 试证明 $\Gamma(s)$ 在 $s \in (0, +\infty)$ 上连续.

(3) (5分) 用 Γ 函数表示积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$$

并求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$$

8.(13分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的Fourier展开式, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

9.(5分) 试证明

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

Proof.

我们有

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \int_0^1 e^{-x \ln x} dx$$

考虑 e^t 在 $t = 0$ 处的泰勒展开

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$$

代入 $t = -x \ln x$ 可得

$$e^{-x \ln x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!}$$

注意到对任意 $x \in (0, 1)$ 都有 $-\frac{1}{e} < x \ln x < 0$,因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!} \right| < \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{e^n n!}$$

收敛,于是根据强级数判别法可知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!}$$

在 $(0, 1)$ 一致收敛于 $e^{-x \ln x}$.于是,可逐项求积分有

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!} dx$$

做代换 $u = -\ln x$,则有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(n+1)u} u^n}{n!} du \\ &\stackrel{v=(n+1)u}{=} \frac{1}{n!(n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} e^{-v} v^n dv \\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{(n+1)^{n+1} n!} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \end{aligned}$$

从而

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$