

## Hardy-Littlewood引理

函数在无穷远点有极限是否说明导数在无穷远点也有极限?下面我们来看一个相关的命题.

### Hardy-Littlewood引理

对于函数 $f(x)$ ,存在 $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有 $n$ 阶导,且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在有限.那么对于任意 $1 \leq k \leq n$ ,都有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ .

### Proof.

取 $x_0 \in [a, +\infty)$ .将 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处泰勒展开有

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f^{(1)}(x_0) + \cdots + \frac{(x - x_0)^{n-1}f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!} + \frac{(x - x_0)^n f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

即

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(x - x_0)^i f^{(i)}(x_0)}{i!} + \frac{(x - x_0)^n f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

其中 $x_0 < \xi < x$ .现在,分别令 $x = x_0 + 1, \cdots, x_0 + n$ .于是

$$\begin{cases} f(x_0 + 1) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1^i f^{(i)}(x_0)}{i!} + \frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!} \\ \vdots \\ f(x_0 + n) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{n^i f^{(i)}(x_0)}{i!} + \frac{n^n f^{(n)}(\xi_n)}{n!} \end{cases}$$

假定这是关于 $f^{(1)}(x_0), \cdots, f^{(n-1)}(x_0), f^{(n)}(\xi)$ 的线性方程组.(我们暂且将各 $f^{(n)}(\xi_i)$ 视作一项).

由于矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{1^1}{1!} & \cdots & \frac{1^n}{n!} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{n^1}{1!} & \cdots & \frac{n^n}{n!} \end{pmatrix}$ 的各列线性无关,于是上述方程组总能转化成以下形式.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n c_{k,i} (f(x_0 + i) - f(x_0)) = f^{(k)}(x_0) + \sum_{i=1}^n p_{k,i} f^{(n)}(\xi_i), 1 \leq k \leq n-1 \text{ 且 } \sum_{i=1}^n p_{k,i} = 0 \\ \sum_{i=1}^n c_{n,i} (f(x_0 + i) - f(x_0)) = \sum_{i=1}^n p_{n,i} f^{(n)}(\xi_i) \end{cases}$$

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L_0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = L_n$ .

于是对于任意 $1 \leq i \leq n$ 都有 $\lim_{x_0 \rightarrow +\infty} f(x_0 + i) = L_0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\xi_i) = L_n$ .

我们对上面的各个方程组分别取极限,有

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n c_{k,i} (L_0 - L_0) = \lim_{x_0 \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x_0) + \sum_{i=1}^n p_{k,i} L_n, 1 \leq k \leq n-1 \\ \sum_{i=1}^n c_{n,i} (L_0 - L_0) = \sum_{i=1}^n p_{n,i} L_n \end{cases}$$

于是 $\forall 1 \leq k \leq n, \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ .命题得证.

需要注意的是,在各阶导数极限均不明存在性的情况下,只有通过将其约束在一个其余极限已知的等式中才可说明其极限.事实上,如果题设中给出各阶导数极限存在,那么证明难度将大大下降.

另外,通过Lagrange中值定理求得的余项 $\xi$ 仅当整个函数的极限存在时,我们才可通过Heine定理说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(\xi)$ 的极限.反过来,我们不能通过 $\xi$ 所代表的序列求得整个函数的极限,因为 $\xi$ 的取值很有可能是离散的,我们不能从离散的序列极限简单地推知函数极限(这极限有可能不存在).

关于上面的内容,更详细的可见函数极限定理.