

子空间与直和

1. 子空间

通过定义向量空间的子空间,我们可以大大扩充向量空间的例子.

1.1 定义:子空间

如果 V 的子集 U 是与 V 具有相同的加法恒等元,加法和标量乘法运算的向量空间,那么称 U 为 V 的子空间.

下面给出了判断 V 的子集是否为子空间的方法.

1.2 判断子空间的方法

当且仅当 V 的子集 U 满足下面三个条件时, U 是 V 的子空间.

- (1) 加法恒等元 $\mathbf{0} \in U$.
- (2) 对加法封闭:对于任意 $u, v \in U$,都有 $u + v \in U$.
- (3) 对标量乘法封闭:对于任意 $a \in \mathbb{F}, u \in U$,都有 $au \in U$.

1.2 Proof.

如果 U 是 V 的子空间,那么根据向量空间的定义, U 必能满足上述条件.

如果 U 满足上述三个条件,那么(1)保证了 U 有加法恒等元,(2)和(3)保证了 U 上的加法和标量乘法有意义.

对于任意的 $u \in U$,在(3)中取 $a = -1$ 可知 $-u \in U$,于是 U 满足具有加法逆元的条件.

向量空间定义的其余部分,如可交换性和可结合性,既然对于 V 满足,那么对它的子集 U 也一定满足.

进而 U 为向量空间,于是 U 为 V 的子空间.

下面给出了一些子空间的例子.

1.3.1 例:子空间

- (a) 如果 $b \in \mathbb{F}$,那么当且仅当 $b = 0$ 时, $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_3 = 5x_4 + b\}$ 是 \mathbb{F}^4 的子空间.
- (b) 定义在 $[0, 1]$ 上的全体连续实值函数构成的集合是 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 的子空间.
- (c) 定义在 \mathbb{R} 上的全体可微实值函数构成的集合是 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 的子空间.
- (d) 当且仅当 $b = 0$ 时,定义在开区间 $(0, 3)$ 上且满足 $f'(2) = b$ 的全体可微实值函数 f 构成的集合是 $\mathbb{R}^{(0,3)}$ 的子空间.
- (e) 所有满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的实序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成的集合是 \mathbb{R}^{∞} 的子空间.

需要注意的是,向量空间最小的子空间不是空集 \emptyset 而是 $\{\mathbf{0}\}$. 这是因为向量空间必须包含加法恒等元 $\mathbf{0}$.对应的, V 的最大的子空间显然是它本身.

1.3.2 \mathbb{R}^2 和 \mathbb{R}^3 的子空间

(a) \mathbb{R}^2 的子空间有且仅有 $\{\mathbf{0}\}$, \mathbb{R}^2 中所有过原点的直线,以及 \mathbb{R}^2 本身.

(b) \mathbb{R}^3 的子空间有且仅有 $\{\mathbf{0}\}$, \mathbb{R}^3 中所有过原点的直线, \mathbb{R}^3 中所有过原点的平面,以及 \mathbb{R}^3 本身.

证明上述命题是较为困难的.我们将它留待学习更多知识后来证明.

讨论向量空间时,我们通常只对向量空间的子空间而非任意子集感兴趣.这时,子空间的和的概念将会很有用.

1.4 定义:子空间的和

假定 V_1, V_2, \dots, V_m 是 V 的子空间,则 V_1, V_2, \dots, V_m 的和是由 V_1, V_2, \dots, V_m 中元素的所有可能的和构成的集合,记作 $V_1 + V_2 + \dots + V_m$,即

$$V_1 + V_2 + \dots + V_m = \{v_1 + v_2 + \dots + v_m : v_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, m\}$$

我们可以来看一些子空间的和的例子.

1.4.1 例:子空间的和

(a) 假定

$$U = \{(x, 0, 0) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}, W = \{(0, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : y \in \mathbb{F}\}$$

那么

$$U + W = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}$$

(b) 假定

$$U = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}, W = \{(x, x, x, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}$$

那么

$$U + W = \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4 : x, y, z \in \mathbb{F}\}$$

我们来证明上述例子中的(b).

1.4.1(b) Proof.

考虑 U 中的一个元素 (a, a, b, b) 和 W 中的一个元素 (c, c, c, d) ,于是

$$(a, a, b, b) + (c, c, c, d) = (a + c, a + c, b + c, b + d)$$

这表明 $U + W$ 中的每个元素的前两个坐标相等,于是

$$U + W \subseteq \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4, x, y, z \in \mathbb{F}\}$$

而考虑 $\{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4, x, y, z \in \mathbb{F}\}$ 中的元素 (x, x, y, z) ,有

$$(x, x, y, z) = (x, x, y, y) + (0, 0, 0, z - y)$$

又 $(x, x, y, y) \in U, (0, 0, 0, z - y) \in W$,于是 $(x, x, y, z) \in U + W$,从而

$$\{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4, x, y, z \in \mathbb{F}\} \subseteq U + W$$

从而 $U + W = \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4, x, y, z \in \mathbb{F}\}$,证毕.

接下来的结果表明,子空间的和还是子空间.并且,子空间的和是包含这些子空间的最小子空间; 如果一个子空间包含某些子空间,那么它一定包含这些子空间的和.

1.5

假定 V_1, \dots, V_m 是 V 的子空间,那么 $V_1 + \dots + V_m$ 是最小的包含 V_1, \dots, V_m 的子空间.

1.5 Proof.

验证 $V_1 + \dots + V_m$ 是 V 的子空间并不困难.

对于任意 $v \in V_i, 1 \leq i \leq m$,在剩余的子空间中取 $\mathbf{0}$,则有

$$\mathbf{0} + \dots + v + \dots + \mathbf{0} = v + (m - 1)\mathbf{0} = v \in V_1 + \dots + V_m$$

从而 $\forall i \in [1, m] \cap \mathbb{N}, V_i \subseteq V_1 + \dots + V_m$.

考虑所有包含 V_1, \dots, V_m 的子空间,它必然包含 $V_1 + \dots + V_m$.

从而 $V_1 + \dots + V_m$ 是最小的包含 V_1, \dots, V_m 的子空间.证毕.

设 V_1, \dots, V_m 是 V 的子空间,于是 $V_1 + \dots + V_m$ 中的每个元素都可以写成

$$v_1 + \dots + v_m$$

其中每个 $v_i \in V_i$. 那么是否有一些时候, $V_1 + \dots + V_m$ 中的每个向量都能唯一地用上述形式表出? 这种情况十分重要,所以它有专属的名字:直和.

2.直和

2.1 定义:直和

设 V_1, \dots, V_m 是 V 的子空间. 如果 $V_1 + \dots + V_m$ 中的每个元素都能用 $\sum_{i=1}^m v_i, v_i \in V_i$ 的形式进行唯一表出, 那么我们称 $V_1 + \dots + V_m$ 为**直和**, 记作 $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$.

下面给出了一些直和的例子.

2.1.1 例:直和

(a) 假定

$$U = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}, W = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\}$$

那么 $U \oplus W = \mathbb{F}^3$.

(b) 假定

$$\forall i \in [1, n] \cap \mathbb{N}, V_i = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{F}, \text{其余 } x_j = 0\}$$

那么 $V_1 \oplus \dots \oplus V_n = \mathbb{F}^n$.

这两者的证明均不困难. 下面我们给出判断子空间的和是否是直和的条件.

2.2.1 直和的条件

假设 V_1, \dots, V_m 是 V 的子空间, 那么 $V_1 + \dots + V_m$ 是直和当且仅当用 $v_1 + \dots + v_m$ (其中 $v_i \in V_i$) 的方式表示 $\mathbf{0}$ 的唯一方式是将所有 v_i 取 $\mathbf{0}$.

2.2.1 Proof.

首先假定 $V_1 + \dots + V_m$ 是直和, 那么直和的定义就表明 $v_1 + \dots + v_m = \mathbf{0}$ 是唯一的.

又 $\forall V_i, \mathbf{0} \in V_i$, 于是表出 $\mathbf{0}$ 仅当 $v_1 = \dots = v_m = \mathbf{0}$.

现在假定用 $v_1 + \dots + v_m$ (其中 $v_i \in V_i$) 的方式表示 $\mathbf{0}$ 的唯一方式是将所有 v_i 取 $\mathbf{0}$. 取 $v \in V_1 + \dots + V_m$, 不妨假定 v 可以由如下两种方式表出:

$$v = v_1 + \dots + v_i, v_i \in V_i$$

$$v = u_1 + \dots + u_i, u_i \in V_i$$

两式相减可得 $\mathbf{0} = (v_1 - u_1) + \dots + (v_m - u_m)$. 又 $v_i - u_i \in V_i$, 故该等式表明 $v_i - u_i = \mathbf{0}$, 进而 $v_1 = u_1, \dots, v_m = u_m$, 所以表出方式是唯一的, 从而 $V_1 + \dots + V_m$ 为直和.

从这个定理可以很容易推出两个子空间的和为直和的条件.

2.2.2 两个子空间的直和

假定 U 和 W 是 V 的子空间,那么 $U + W$ 是直和当且仅当 $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

2.2.2 Proof.

首先假定 $U + W$ 是直和.如果 $v \in U \cap W$,那么一定有 $-v \in U \cap W$.而 $\mathbf{0} = v + (-v) = (-v) + v$. 由于 $\mathbf{0}$ 被唯一表出,故仅当 $v = \mathbf{0}$ 才可行,于是 $\{\mathbf{0}\} = U \cap W$.

另一方面,假设 $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$,那么 $\forall u \in U \setminus \{\mathbf{0}\}$ 都有 $-u \in U$,从而 $-u \notin W$. 于是表出 $\mathbf{0}$ 的唯一方法是取 $u = \mathbf{0} \in U, w = \mathbf{0} \in W$,从而根据2.7.1可以得知 $U + W$ 为直和.

需要注意的是,上面的定理并不能推广到两个子空间以上的情形.在这些情况下,只检验两两子空间仅交于 $\mathbf{0}$ 是不够的.

下面我们来看一些例题和拓展的定理.

Example 1.

假定 U 是 \mathbb{R}^2 的非空子集,为以下的命题举出反例.

- (a) 若 U 满足对加法封闭和对取加法逆元封闭(即 $\forall u \in U$ 有 $-u \in U$),则 U 是 \mathbb{R}^2 的子空间.
- (b) 若 U 满足对标量乘法封闭,则 U 是 \mathbb{R}^2 的子空间.

Solution.

- (a) 取 $U = \{(x, y) \rightarrow \mathbb{R}^2 : x, y \in \mathbb{Z}\}$,不难验证其符合题设.

然而,对于任意 $u = (x_0, y_0) \in U \setminus \{(0, 0)\}$ 和任意 $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$,都有 $au = (ax_0, ay_0) \notin U$, 于是其对标量乘法不封闭,故 U 不一定是 \mathbb{R}^2 的子空间.

- (b) 取 $U = \{(x, y) \rightarrow \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$,不难验证其符合题设.

然而,取 $u = (0, 1), v = (1, 0) \in U$,有 $u + v = (0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin U$, 进而 U 对加法不封闭,故 U 不一定是 \mathbb{R}^2 的子空间.

上述命题的否定告诉我们, V 的子集 U 必须同时满足对加法和标量乘法封闭才可以得出 U 是 V 的子空间这一结论.

Example 2.1

若 V_1, V_2 是 V 的两个子空间,试证明: $V_1 \cup V_2$ 是 V 的子空间,当且仅当 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.

Proof.

若 $V_1, V_2, V_1 \cup V_2$ 均为 V 的子空间.

假定 $\exists u \in V_1 \setminus V_2, \exists v \in V_2 \setminus V_1$, 那么 $u + v \notin V_1$. 若不然, 根据 $u + v \in V_1$ 可知 $v \in V_1$, 与上述假设不符. 同理也可以知道 $u + v \notin V_2$, 于是 $u + v \notin V_1 \cup V_2$.

这与 $V_1 \cup V_2$ 是 V 的子空间不符, 因为由 $u, v \in V_1 \cup V_2$ 必然能推出 $u + v \in V_1 \cup V_2$.

于是我们知道我们的假设不符, 即 $V_1 \setminus V_2$ 和 $V_2 \setminus V_1$ 中至少有一个为空集, 从而 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.

若 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$, 那么显然有 $V_1 \cup V_2 = V_1$ 或 $V_1 \cup V_2 = V_2$. 既然 V_1, V_2 均为 V 的子空间, 自然有 $V_1 \cup V_2$ 为 V 的子空间.

综上可得原命题成立.

Example 2.2

若 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间, 试证明 $V_1 \cup V_2 \cup V_3$ 为 V 的子空间, 当且仅当其中一个子空间包含另外两个子空间.

注意: 事实上该命题成立要求域 \mathbb{F} 的特征大于2.

Proof.

充分性是显然的. 现在我们来证明其必要性.

即: 若 $V_1 \cup V_2 \cup V_3$ 为 V 的子空间, 则其中一个子空间包含另外两个子空间.

假设命题不成立, 那么必然三个空间互相不包含. 否则如果有 $V_1 \subseteq V_2 \cup V_3$, 则有

$$V_1 \cup V_2 \cup V_3 = V_2 \cup V_3$$

于是 $V_2 \cup V_3$ 为 V 的子空间. 运用**Example 2.1**的结论可知 $V_2 \subseteq V_3$ 或 $V_3 \subseteq V_2$, 这与反证法的假设不成立.

不失一般性地, 假定 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{0\}$, 令 $u \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3), v \in V_2 \setminus (V_1 \cup V_3)$.

考虑 $u + v$, 根据定义, 应当有 $u + v \in V_1 \cup V_2 \cup V_3$, 于是只能有 $u + v \in V_3 \setminus (V_1 \cup V_2)$.

考虑 $u + (u + v)$, 同理可知只能有 $u + (u + v) \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$.

于是我们有 $u + (u + v) + (-u) = 2v \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$, 即 $v \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$. 这与 v 的定义不符.

从而我们的假设不成立, 因此原命题成立.

注: 如果 \mathbb{F} 的特征为2, 那么我们并不能从 $2v \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$ 得出 $v \in V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$, 因为 $2v$ 有可能等于0.

Example 2.3

若 V 是特征大于 n 的域 \mathbb{F} 上的向量空间, U_1, \dots, U_n 是 V 的子空间.

若 $\bigoplus_{i=1}^n U_i = \bigcup_{i=1}^n U_i$, 则 $\exists k \in [1, n]$, s.t. $U_k = \bigcup_{i=1}^n U_i$.

证明过程略.(我不会告诉你因为我不证所以不写的)