

1 二次型

例题 1.1 求实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + tx_1x_2 + 2tx_1x_3 + 4x_2x_3$$

的秩和正惯性指数.

解. 这二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{t}{2} & t \\ \frac{t}{2} & 1 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

它的顺序主子式分别为

$$\begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & \frac{t}{2} \\ \frac{t}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{t^2}{4}, \quad \begin{vmatrix} 1 & \frac{t}{2} & t \\ \frac{t}{2} & 1 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{vmatrix} = t^2 - 4$$

如果 $t^2 = 4$, 则 \mathbf{A} 不满秩. 此时 \mathbf{A} 的 $(1, 1)$ 元的余子式非零, 因此 $\text{rank } \mathbf{A} = 2$, 正惯性指数为 1.

如果 $t^2 \neq 4$, 则矩阵满秩, 只需判断 \mathbf{A} 的特征值的正负. \mathbf{A} 的特征多项式为

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + \left(-\frac{5t^2}{4} - 3\right)\lambda + (4 - t^2)$$

设它的三个实根为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则有

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2, \quad \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = -\frac{5t^2}{4} - 3, \quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = t^2 - 4$$

前两个式子表明三个根中有正数也有负数. 如果 $t^2 > 4$, 则正惯性指数为 1; 如果 $t^2 < 4$, 则正惯性指数为 2.

例题 1.2 判断当参数 a 满足什么条件时, 实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$$

是正定的.

解. 这二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - a)(\lambda - a - 1)(\lambda - a + 1) + (-\lambda + a - 1) - (\lambda - a + 1) \\
 &= (\lambda - a + 1)(\lambda^2 - (2a + 1)\lambda + a^2 + a - 2) \\
 &= (\lambda - a + 1)^2(\lambda - a - 2)
 \end{aligned}$$

上述二次型正定当且仅当 \mathbf{A} 的所有特征值大于零, 即

$$a - 1 > 0, \quad a + 2 > 0$$

从而 $a > 1$.

例题 1.3 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_2x_3 + 2ax_1x_3$$

可以做非退化线性变换成为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$$

求 a 的值和相应的非退化线性变换.

解. 二次型 $g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2$, 其秩和正惯性指数均为 2. 考虑二次型 f 对应的矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$\det \mathbf{A} = (1 - a^2) - a(a - a^2) + a(a^2 - a) = (a - 1)^2(2a + 1)$$

当 $a = 1$ 时, $\text{rank } \mathbf{A} = 1$, 不存在相应的变换, 于是只能有 $a = -\frac{1}{2}$. 现在求相应的非退化线性变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是令

$$C = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

然后令 $\mathbf{x} = C\mathbf{z}$, 就有 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + \frac{3}{4}z_2^2$, 再令

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + y_2 \\ \frac{16}{\sqrt{3}}y_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

即可.

例题 1.4 设 A 是正定矩阵, B 是与 A 阶数相同的实对称矩阵. 证明: 存在可逆矩阵 C 使得 $C^t A C$ 与 $C^t B C$ 都是对角矩阵.

证明. 由于 A 是正定矩阵, 因此它合同于 I_n , 即存在可逆矩阵 P 使得

$$P^t A P = I$$

由于 $P^t B P$ 也是实对称矩阵, 因此存在可逆矩阵 Q 使得

$$Q^t (P^t B P) Q$$

也为对角矩阵. 令 $C = Q^t P^t$ 为可逆矩阵, 则有

$$C^t A C = Q^t P^t A P Q = Q^t I Q = I$$

于是存在可逆的 C 使得 $C^t A C$ 和 $C^t B C$ 均为对角矩阵. □

例题 1.5 设 A, B 是两个半正定矩阵. 证明: $AB = 0$ 当且仅当 $\text{tr}(AB) = 0$.

证明. \Rightarrow : 显然.

\Leftarrow : 现在假设 $\text{tr}(AB) = 0$. 由于 A 是半正定的, 因此存在可逆矩阵 P 使得

$$A = P^t \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_s, 0, \dots, 0\} P$$

令

$$S = P^t \text{diag}\{\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_s}, 0, \dots, 0\} P$$

则

$$S^2 = A$$

同理构造 T 使得 $T^2 = B$. 并且 S, T 都是半正定矩阵. 于是

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(SSB) = \operatorname{tr}(SBS) = \operatorname{tr}(S^t BS)$$

$S^t BS$ 是一个半正定矩阵, 它的迹为 0 说明它的特征值全部为 0; 它又可以对角化, 于是 $SBS = STTS = 0$. 而 $ST(ST)^t = STTS = 0$, 于是 $ST = 0$, 于是 $AB = SSTT = 0$. \square

例题 1.6 设 A 是正定实矩阵. 证明: 存在对角元均为正数的上三角矩阵 L 使得 $A = L^t L$.

证明. 对 A 的阶数 n 做归纳.

当 $n = 1$ 时, 命题显然成立.

当 $n > 1$ 时, 根据归纳假设, 命题对所有阶数小于 n 的矩阵均成立. 将 A 做如下分块:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha^t & a_{nn} \end{bmatrix}$$

由于 A_1 的顺序主子式也是 A 的顺序主子式, 因此 A_1 也是正定矩阵, 于是存在对角元均为正数的上三角矩阵 L_1 使得 $L_1^t L_1 = A_1$. 由于 L_1 的对角元为正数, 于是 $\det L_1 > 0$, 因此 L_1 可逆.

考虑行列变换

$$\begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\alpha^t A_1^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha^t & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^t A_1^{-1} \alpha \end{bmatrix}$$

两边取行列式可得

$$\det A = \det A_1 (a_{nn} - \alpha^t A_1^{-1} \alpha)$$

由于 $\det A > 0, \det A_1 > 0$, 于是

$$a_{nn} - \alpha^t A_1^{-1} \alpha > 0$$

记上式为 b . 而

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1^t & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{bmatrix}$$

于是令

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

即有 $A = L^t L$, 归纳可知命题对所有正定矩阵 A 都成立. \square

例题 1.7 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \begin{bmatrix} A & x \\ x^t & 0 \end{bmatrix}$$

是负定的.

证明. 只需证明对任意 \mathbf{x} 有 $f(\mathbf{x}) < 0$ 即可. 根据前一题的变换方式, 注意到

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \\ -\mathbf{x}^t \mathbf{A}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^t & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_n & -\mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{x}^t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

两边取行列式可得

$$f(\mathbf{x}) = -\det \mathbf{A}(\mathbf{x}^t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x})$$

由于 \mathbf{A} 正定, 因此 $\det \mathbf{A} > 0$, $\mathbf{x}^t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} > 0$, 因此 $f(\mathbf{x}) < 0$, 于是题设二次型负定. \square

例题 1.8 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 级正定矩阵. 证明:

$$\det \mathbf{A} \leq \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

证明. 对 \mathbf{A} 的阶数 n 采用数学归纳法.

当 $n = 1$ 时命题显然成立.

当 $n > 1$ 时对 \mathbf{A} 分块如下:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^t & a_{nn} \end{bmatrix}$$

考虑行列变换

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\boldsymbol{\alpha}^t \mathbf{A}_1^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^t & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{n-1} & -\mathbf{A}_1^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^t \mathbf{A}_1^{-1} \boldsymbol{\alpha} \end{bmatrix}$$

两边取行列式可得

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}_1 (a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^t \mathbf{A}_1^{-1} \boldsymbol{\alpha}) \leq a_{nn} \det \mathbf{A}_1 \leq a_{nn} \prod_{i=1}^{n-1} a_{ii} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

\square

例题 1.9 设 $\mathbf{C} = (c_{ij})$ 是 n 级实可逆矩阵. 证明:

$$(\det \mathbf{C})^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n c_{ji}^2 \right)$$

证明. 首先注意到 $\mathbf{C}^t \mathbf{C}$ 是正定矩阵, 于是利用上一问的结论即可得证. \square

例题 1.10 设 \mathbf{A}, \mathbf{B} 是阶数相同的半正定矩阵. 证明:

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \geq \max\{\det \mathbf{A}, \det \mathbf{B}\}$$

证明. 如果 \mathbf{A}, \mathbf{B} 都不是正定矩阵, 那么 $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B} = 0$, 而 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也是半正定矩阵, 因此其行列式非负, 于是命题得证.

现在不妨假设 \mathbf{A} 是正定矩阵. 由前面题目的结论可知存在可逆矩阵 \mathbf{C} 使得 $\mathbf{C}^t \mathbf{A} \mathbf{C}$ 和 $\mathbf{C}^t \mathbf{B} \mathbf{C}$ 都是对角矩阵, 不妨分别设为 \mathbf{S}, \mathbf{T} , 并且对角元都非负. 于是

$$\det \mathbf{S} = \prod_{i=1}^n s_{ii} = (\det \mathbf{C})^2 \det \mathbf{A}$$

$$\det \mathbf{T} = \prod_{i=1}^n t_{ii} = (\det \mathbf{C})^2 \det \mathbf{B}$$

$$\det(\mathbf{S} + \mathbf{T}) = \prod_{i=1}^n (s_{ii} + t_{ii}) = (\det \mathbf{C})^2 \det(\mathbf{A} + \mathbf{B})$$

而

$$\prod_{i=1}^n (s_{ii} + t_{ii})^2 \geq \max \left\{ \prod_{i=1}^n s_{ii}, \prod_{i=1}^n t_{ii} \right\}$$

并且 $(\det \mathbf{C})^2 > 0$. 于是

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \geq \max\{\det \mathbf{A}, \det \mathbf{B}\}$$

命题得证. □

例题 1.11 设 \mathbf{A}, \mathbf{B} 是半正定矩阵, 满足存在唯一的矩阵 \mathbf{M} 使得 $\mathbf{A}\mathbf{M} + \mathbf{M}\mathbf{A} = \mathbf{B}$. 证明: \mathbf{M} 是半正定矩阵.

证明. 对题设等式两边取转置, 并由 \mathbf{A}, \mathbf{B} 是半正定矩阵可得

$$\mathbf{M}^t \mathbf{A} + \mathbf{A} \mathbf{M}^t = \mathbf{B}$$

由于这样的 \mathbf{M} 是唯一的, 因此 $\mathbf{M}^t = \mathbf{M}$, 于是 \mathbf{M} 是对称矩阵.

首先证明 \mathbf{A} 是正定矩阵. 否则考虑其对应特征值 0 的特征向量 α , 有

$$\mathbf{A} \alpha \alpha^t + \alpha \alpha^t \mathbf{A} = \alpha \alpha^t \mathbf{A} = \alpha \alpha^t \mathbf{A}^t = \mathbf{0}$$

并且 $\alpha \alpha^t \neq \mathbf{0}$. 于是如果 \mathbf{M} 是上述矩阵方程的解, 那么 $\mathbf{M} + \alpha \alpha^t$ 也是上述方程的解, 从而不满足唯一性, 因此 \mathbf{A} 是正定的.

取 \mathbf{M} 的特征值 λ 和它对应的特征向量 β , 则有

$$\beta^t \mathbf{B} \beta = \beta^t \mathbf{A} \mathbf{M} \beta + \beta^t \mathbf{M} \mathbf{A} \beta = 2\lambda \beta^t \mathbf{A} \beta$$

由于 \mathbf{A} 正定, 因此 $\beta^t \mathbf{A} \beta > 0$; 又由于 \mathbf{B} 半正定, 于是 $\beta^t \mathbf{B} \beta \geq 0$, 于是

$$\lambda = \frac{\beta^t \mathbf{B} \beta}{2\beta^t \mathbf{A} \beta} \geq 0$$

从而 \mathbf{M} 是半正定矩阵. □

例题 1.12 设 A 是 n 阶实矩阵, 证明: 如果 A 有 r 个线性无关的特征向量, 则存在正惯性指数为 r 的半正定矩阵 B 使得 $AB = BA^t$.

证明. 考虑 A 的特征向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 将它扩充为 \mathbb{K}^n 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 然后令

$$B = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^t \\ \vdots \\ \alpha_n^t \end{bmatrix}$$

于是 B 是秩为 r 的半正定矩阵. 此时有

$$AB = A \begin{bmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_r & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^t \\ \vdots \\ \alpha_n^t \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^r \lambda_i \alpha_i \alpha_i^t$$

从而 AB 是对称矩阵. 于是

$$AB = (AB)^t = B^t A^t = BA^t$$

□