

1 二次型

例题 1.1 求实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + tx_1x_2 + 2tx_1x_3 + 4x_2x_3$$

的秩和正惯性指数.

解. 这二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{t}{2} & t \\ \frac{t}{2} & 1 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

它的顺序主子式分别为

$$\begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & \frac{t}{2} \\ \frac{t}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{t^2}{4}, \quad \begin{vmatrix} 1 & \frac{t}{2} & t \\ \frac{t}{2} & 1 & 2 \\ t & 2 & 0 \end{vmatrix} = t^2 - 4$$

如果 $t^2 = 4$, 则 \mathbf{A} 不满秩. 此时 \mathbf{A} 的 $(1, 1)$ 元的余子式非零, 因此 $\text{rank } \mathbf{A} = 2$, 正惯性指数为 1.

如果 $t^2 \neq 4$, 则矩阵满秩, 只需判断 \mathbf{A} 的特征值的正负. \mathbf{A} 的特征多项式为

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + \left(-\frac{5t^2}{4} - 3\right)\lambda + (4 - t^2)$$

设它的三个实根为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则有

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2, \quad \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = -\frac{5t^2}{4} - 3, \quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = t^2 - 4$$

前两个式子表明三个根中有正数也有负数. 如果 $t^2 > 4$, 则正惯性指数为 1; 如果 $t^2 < 4$, 则正惯性指数为 2.

例题 1.2 判断当参数 a 满足什么条件时, 实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$$

是正定的.

解. 这二次型的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - a)(\lambda - a - 1)(\lambda - a + 1) + (-\lambda + a - 1) - (\lambda - a + 1) \\
 &= (\lambda - a + 1)(\lambda^2 - (2a + 1)\lambda + a^2 + a - 2) \\
 &= (\lambda - a + 1)^2(\lambda - a - 2)
 \end{aligned}$$

上述二次型正定当且仅当 \mathbf{A} 的所有特征值大于零, 即

$$a - 1 > 0, \quad a + 2 > 0$$

从而 $a > 1$.

例题 1.3 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_2x_3 + 2ax_1x_3$$

可以做非退化线性变换成为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$$

求 a 的值和相应的非退化线性变换.

解. 二次型 f, g 的矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$