

正算子

迄今为止,我们讨论的多项式都是整数次幂的.算子是否有开平方这一操作呢?为此,我们将研究正算子.

1.正算子和平方根

1.1 定义:正算子

算子 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是**正的**,如果 T 是自伴的且对任意 $v \in V$ 有 $\langle Tv, v \rangle \geq 0$.

如果 V 是复向量空间,那么以上定义中“ T 是自伴的”这一条件可以去掉.因为 $\langle Tv, v \rangle \geq 0$ 蕴含 $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$,这在复内积空间上意味着 T 是自伴算子.

1.2 定义:平方根

算子 $R \in \mathcal{L}(V)$ 称为算子 $T \in \mathcal{L}(V)$ 的**平方根**,如果 $R^2 = T$.

于是我们将在下面的叙述中看到,正算子和 \mathbb{C} 中非负数具有许多的相似性.

2.正算子的性质

2.1 正算子的性质I

设 $T \in \mathcal{L}(V)$,那么下列命题等价.

- (a) T 是正算子.
- (b) T 自伴且所有特征值非负.
- (c) T 关于 V 的某个规范正交基有对角矩阵且对角线上元素均非负.
- (d) T 有正平方根.
- (e) T 有自伴平方根.
- (f) 存在 $R \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $T = R^*R$.

Proof.

我们将对上述命题逐一推理.

(a) \Rightarrow (b): T 是正算子蕴含 T 是自伴算子.对于 T 的任意特征值 λ ,不妨设对应的特征向量为 $v \in V$,于是

$$0 \leq \langle Tv, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \|v\|^2$$

于是 $\lambda \geq 0$,因而(b)成立.

(b) \Rightarrow (c):由谱定理可知 T 关于 V 的某个规范正交基有对角矩阵.

又因为 T 的特征值非负,于是这矩阵的对角线元素非负.

(c) \Rightarrow (d):我们假定 T 关于 V 的一组规范正交基 e_1, \dots, e_n 具有对角矩阵

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

令 $R \in \mathcal{L}(V)$ 关于 e_1, \dots, e_n 的矩阵为

$$\mathcal{M}(R) = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

于是 $\mathcal{M}(T) = (\mathcal{M}(R))^2$,即 $T = R^2$.对于任意 $v := a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$ 有

$$\begin{aligned} \langle Rv, v \rangle &= \left\langle \sqrt{\lambda_1} a_1 e_1 + \cdots + \sqrt{\lambda_n} a_n e_n, a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n \right\rangle \\ &= \sqrt{\lambda_1} a_1^2 + \cdots + \sqrt{\lambda_n} a_n^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

因而 R 是正算子,于是 T 有正平方根,(d)成立.

(d) \Rightarrow (e):根据定义,正算子都是自伴的,于是(d)蕴含(e).

(e) \Rightarrow (f):不妨令 $R \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $T = R^2$,因为 R 是自伴的,于是 $R = R^*$,因而 $T = R^* R$.

(f) \Rightarrow (a):我们有

$$T^* = (R^* R)^* = R^* (R^*)^* = R^* R = T$$

于是 T 是自伴算子.对于任意 $v \in V$ 又有

$$\langle Tv, v \rangle = \langle R^* Rv, v \rangle = \langle Rv, Rv \rangle = \|Rv\|^2 \geq 0$$

于是 T 是正算子.

于是我们知道正算子有平方根.那么其正平方根是否和一般的非负实数一样是唯一的呢?接下来的命题表明这是肯定的.

2.2 正算子具有唯一正平方根

V 上的每个正算子都具有唯一的正平方根.

Proof.

设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正算子, $v \in V$ 是 T 的特征向量,对应的特征值为 $\lambda \geq 0$.

令 R 是 T 的正平方根.我们将证明 $Rv = \sqrt{\lambda}v$,从而唯一确定这样的 R .

谱定理指出, V 上存在由 R 的特征向量组成的规范正交基 e_1, \dots, e_n .因为 R 是正算子,于是其所有特征值非负,因而存在非负的 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 使得 $Re_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$ 对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$ 成立.

现在,不妨令 $v = a_1e_1 + \dots + a_ne_n$,于是 $Rv = \sqrt{\lambda_1}a_1e_1 + \dots + \sqrt{\lambda_n}a_ne_n$.于是

$$\lambda v = Tv = R^2v = a_1\lambda_1e_1 + \dots + a_n\lambda_ne_n$$

上式表明

$$a_1\lambda e_1 + \dots + a_n\lambda e_n = a_1\lambda_1e_1 + \dots + a_n\lambda_ne_n$$

于是 $a_k(\lambda - \lambda_k) = 0$ 对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$ 成立.于是

$$v = \sum_{\{k:\lambda_k=\lambda\}} a_ke_k$$

因而

$$Rv = \sum_{\{k:\lambda_k=\lambda\}} a_k\sqrt{\lambda}e_k = \lambda v$$

于是命题得证.

需要注意的是,算子的平方根可以有无穷多个,但是算子的正平方根只能有一个.

基于上面的论述,我们可以做如下定义.

2.3 定义: \sqrt{T}

对于正算子 $T \in \mathcal{L}(V)$, \sqrt{T} 表示其唯一的正平方根.

利用平方根,我们也可以简洁的说明一些问题.

2.4 正算子的性质II

设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正算子且 $v \in V$ 使得 $\langle Tv, v \rangle = 0$,那么 $Tv = \mathbf{0}$.

Proof.

我们有

$$0 = \langle Tv, v \rangle = \langle \sqrt{T}\sqrt{T}v, v \rangle = \langle \sqrt{T}v, \sqrt{T}v \rangle = \|\sqrt{T}v\|^2$$

于是 $\sqrt{T}v = \mathbf{0}$.于是 $Tv = \sqrt{T}(\sqrt{T}v) = \sqrt{T}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.