

Relazione di laboratorio n° 1

Alberini Giacomo
Bassini Luigi
Trevisson Nicola

1 Introduzione

Scopo dell'esperienza è quello di misurare l'andamento della pressione durante la fase di svuotamento di un volume di aria, utilizzando diverse pompe e confrontando i risultati. Successivamente si è cercato di misurare alcune caratteristiche di gas noti e ignoti applicando la legge di stato dei gas ideali.



2 Confronto pompe a vuoto

Inizialmente il gruppo si è preoccupato di misurare il volume del contenitore usato nell'esperienza. Per stimare questa grandezza la bottiglia è stata riempita di acqua e quindi è stato misurato il valore del volume in litri con un cilindro graduato. Il valore ottenuto è il seguente:

$$2.775 \text{ l} \pm 0.009 \text{ l}$$

Il passo successivo consisteva nel creare il vuoto nella camera utilizzando due tipi di pompe: una manuale e l'altra meccanica.

Per la prima i risultati sono stati riassunti in un grafico che mostra l'andamento della pressione (misurata con un manometro differenziale al mercurio) al variare del numero di pompaggi manuali effettuati. Con la seconda si è preferito invece sostituire al numero di pompaggi il tempo misurato in secondi avvalendosi di un cronometro. Sono stati dunque prodotti i due seguenti grafici.



NOTA : Per la loro ridotta dimensione le barre di errore non risultano visibili all'interno della risoluzione del grafico. Si può anche notare un leggero flesso all'interno del secondo grafico legato alla repentina variazione di pressione che ha procurato un'oscillazione della colonnina di mercurio.

Come si può notare, entrambi i grafici mostrano un'andamento esponenziale che tende a un valore particolare di pressione, caratteristico dello strumento utilizzato.

Il valore limite delle due pompe è apprezzabile dai grafici.

Si nota anche che la pompa meccanica (azionata da un motore elettrico) raggiunge un valore di pressione finale minore rispetto a quella manuale.

Calcolo della densità dell'aria

La densità dell'aria a 3 atm è la seguente $d = 3.46 \text{ kg/m}^3 \pm 0.02$

3 Calcolo del peso molare di alcuni gas

Successivamente si sono calcolati i valori molari di alcuni gas, utilizzando la legge di stato dei gas perfetti. Dopo aver calcolato la massa della bottiglia in cui era stato fatto il vuoto utilizzando la pompa meccanica, per differenza sono state calcolate le masse dei diversi gas e quindi, utilizzando la relazione $PV = nRT$ e facendo gli opportuni calcoli, si è giunti ai seguenti risultati:

Gas	Massa[g]	Temperatura[°C]	Massa Molare[g/mol]	M.Mol.Tabulato[g/mol]
Elio	1.3 ± 0.05	22.7 ± 0.1	3.9 ± 0.2	4.002
Azoto	9.2 ± 0.05	22.4 ± 0.1	27.9 ± 0.5	28.034
Ignoto	13.1 ± 0.05	22.3 ± 0.1	39.7 ± 0.7	?
CO ₂	15.2 ± 0.05	22.5 ± 0.1	46.1 ± 0.8	44.010

NOTA: nella tabella non sono stati inseriti i volumi, la pressione e il numero di moli perché a valori costanti.

Notiamo che, per l'Elio e l'Azoto i valori calcolati sono compatibili con i valori presenti sulla Tavola periodica degli Elementi.

Per quanto riguarda il terzo gas, partendo dal presupposto che esso sia effettivamente un *singolo* gas e non un miscuglio di diversi elementi, considerando le condizioni ambientali in cui si è effettuato l'esperimento, l'unico elemento compatibile con i dati tabulati è il gas nobile Argon (39.94 g/mol).

Con i dati in nostro possesso, comunque, non è possibile risalire con certezza al reale contenuto della bottiglia.

Infine si è notato che il valore di massa molare del biossido di carbonio da noi trovato era *incompatibile* rispetto al valore noto.

Evidentemente non è possibile utilizzare la legge di stato dei gas perfetti per approssimare il comportamento di tale gas. Questo perché la molecola di biossido di carbonio non gode di quelle proprietà fisiche (struttura puntiforme, basse interazioni intramolecolari, densità uniforme, ecc) che permettono di utilizzare tale relazione per stimarne il comportamento.